



GIDS voor den TUIN

31^e JAARGANG
1919.

KON. KWEEKERIJ
MOERHEIM
DEDEMSVAART



Voorwaarden en Opmerkingen.

PRIJZEN.

De prijzen in dezen Catalogus genoemd, doen die van vorige opgaven vervallen. Alle artikelen worden aangeboden voor zoover zij bij ontvangst der bestellingen disponibel zijn. Na 1 Augustus kunnen de prijzen worden gewijzigd.

Bij bestelling van zaden geldt de prijs, welke per 5 ons is genoteerd, voor minstens 2½ ons; voor minder dan een half ons wordt de prijs per lood berekend. Bij planten, heestergewassen, enz. geldt de prijs per 100 voor minstens 25 stuks, en per 10 stuks voor minstens 5 st.; waar alleen de prijs per stuk is aangegeven, worden voor 10 stuks 8 en voor 5 stuks 4 stuks in rekening gebracht.

Voor grootere hoeveelheden dan in dezen Catalogus worden aangeboden, gelieve men prijsopgaaf aan te vragen.

BESTELLINGEN.

Alle bestellingen worden zoo spoedig mogelijk uitgevoerd. Eene opeenhooping van bestellingen in het voorjaar maakt het dikwijls onmogelijk om ze alle onmiddellijk uit te voeren, waarom een tijdige inzending niet genoeg kan worden aanbevolen.

Ingeval de uitvoering niet dadelijk kan plaats hebben, ontvangt men eene gedrukte kennisgeving.

Mocht van de gevraagde zaden, planten of heesters soms een enkel artikel niet voorhanden zijn, zoo zal ik dit door de meest nabijkomende soort of kleur vervangen, tenzij men bij de bestelling te kennen geeft, dat men geen vervanging wenscht.

Om abuizen te voorkomen geve men een zeer duidelijke opgave van de verlangde artikelen en gebruike daarvoor de **Bestellijst die hierbij is ingesloten**. Men gelieve echter de **prijzen niet in te vullen en brieven of mededeelingen op een afzonderlijk blaadje te schrijven**, daar deze Bestellijst dan bij de goederen als nota kan worden teruggezonden. Duidelijke opgaaf van naam en woonplaats is zeer gewenscht.

VERPAKKING.

Verpakking wordt zoo billijk mogelijk berekend en alleen dan teruggenomen, wanneer de terugzending franco huis plaats heeft binnen één maand na de levering, met duidelijke vermelding van het adres van den afzender, en mij hiervan schriftelijk mededeeling wordt gedaan. Hiervoor wordt dan de helft van het in rekening gebrachte bedrag van de nota afgetrokken.

VERZENDING EN VRACHT.

De verzending geschiedt voor rekening en risico van den besteller en, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften zijn gegeven, op de mij meest geschikt voorkomende wijze.

Voor zoover niet van den postpakketdienst kan worden gebruik gemaakt, verdient het aanbeveling de locale middelen van vervoer op te geven.

De verzending van zaden en planten kan veelal niet tegelijk geschieden; men gelieve dus de regeling hiervan geheel aan mij over te laten.

Men heeft mij dikwijls verzocht om de bestellingen franco te verzenden, doch ik zou dit niet kunnen doen zonder de prijzen der planten en zaden aanmerkelijk te verhoogen, hergeen natuurlijk ten nadeele der bestellers

zou zijn. Ik ben evenwel bereid om als eene tegemoetkoming in de vracht, bij elke bestelling van zaden gratis eenig bloemzaad, en bij elke bestelling van planten en boomen, gratis eenig bloemzaad of eenige vaste planten of knolgewassen, (alles naar mijne keus) te voegen.

BETALING.

Aan mij onbekende bestellers wordt alleen tegen vooruitbetaling of onder rembours geleverd.

Over het bedrag der facturen wordt gewoonlijk na drie maanden beschikt, tenzij een andere tijd van betaling is overeengekomen. Wegens de belangrijke stijging der inningskosten op kwitantien en wissels, worden deze kosten bij dispositie in rekening gebracht. Voor bedragen boven f 10.— ontvangt men, alvorens daarover gedisponeerd wordt, een gedrukte kennisgeving. *Met overmaking van het bedrag zal men mij echter zeer verplichten.* Men doe dit bij voorkeur door storting of overschrijving op mijn **postrekening: Dedemsvaart No. 5**. Om deze wijze van betaling, welke voor mijne administratie het eenvoudigst is, gemakkelijk te maken, wordt bij de meeste nota's een stortingsformulier ingesloten. Men gebruike dit liever dan de voor den ontvanger zoo omslachtige postwissel.

Ook kan men zijn betalingen doen door middel van de **Twentsche Bank** en de daarbij aangesloten financiële instellingen.

Voor zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

Tenzij men zulks uitdrukkelijk verlangt, worden geen kwitantien of kennisgevingen van ontvangst gezonden.

PROVISIE.

Aan tuinbazen worden de gebruikelijke voordeelen toegekend, mits zij mij hun adres opgeven. Van bloemenmest, raffia, snoeimessen, etiketten, enz. wordt geen provisie gegeven.

VERANDERING VAN WOONPLAATS.

Opdat mijn prijscouranten steeds geregeld kunnen worden toegezonden, wordt men beleefd verzocht mij elke verandering van vaste woonplaats mede te deelen.

BUITENLANDSCHE ORDERS.

Zendingen naar het buitenland worden met de meeste zorg verpakt, in overeenstemming met den duur der reis, en geschieden alleen tegen vooruitbetaling.

Bij bestellingen uit Oost- en West-Indië, Transvaal, enz., gelieve men het bedrag, vermeerderd met emballage- en frankeerkosten, bij de bestelling te voegen.

KLACHTEN.

Wanneer, niettegenstaande de meest nauwlettende zorg, het een of ander door mij geleverd artikel reden tot klagen mocht geven, wordt men vriendelijk verzocht mij daarvan ten spoedigste in kennis te stellen, ten einde zoo mogelijk de oorzaak der klachten weg te nemen.

Men vindt mij ook steeds bereid om, waar door toevallige omstandigheden iets van het gezondene mocht mislukken, dit naar billijkheid te vergoeden, zonder dat dit evenwel recht geeft tot korting op de rekening.


Indien men van dezen Catalogus zelf geen gebruik mocht maken, zoo wordt men beleefd verzocht dien aan anderen ter inzage te verstrekken of af te staan.

Door het mededeelen van adressen van aan mij onbekende belangstellenden, zal men mij bijzonder verplichten.

Telegram-Adres: „MOERHEIM” — DEDEMSVAART.
Telefoon No. 5.

Kassiers: De Twentsche Bank, Amsterdam.
Postrekening No. 5.

B. RUYS.



Hofleverancier van
H. M. de Koningin-Moeder.



Hofleverancier van H. M. de Koningin.



Hofleverancier van Z. K. H.
Prins Hendrik der Nederlanden.

Een woord vooraf.

Bij het samenstellen van den 31^{sten} jaargang mijner prijscourant is er hoofdzakelijk naar gestreefd de indeeling zoo overzichtelijk mogelijk te maken, teneinde de bruikbaarheid er van zoo hoog mogelijk op te voeren.

De catalogus geeft een duidelijk beeld van den omvang der verschillende cultures in mijne kweek-rijen, welke er op zijn ingericht alles wat voor sier- of moestuin noodig is, te kunnen leveren.


Naast uitgestrekte velden met struikrozen en vele Hectaren boomkweekerij, zijn het in hoofdzaak verder vaste planten, die door mij worden gekweekt. Sinds de oprichting mijner zaken hebben deze gewassen mijn bijzondere voorliefde gehad, en heb ik mij beijverd ze hier ten lande meer bekend te doen worden. Door steeds toenemende vraag genoodzaakt de cultuur er van uit te breiden, is mijne kweekerij langzamerhand uitgegroeid tot een der allergrootste op dit gebied. Tot het uitgebreide gebruik, dat in de veelal zeer schilderachtige tuinen in Engeland van vaste planten wordt gemaakt, is het in ons land echter nog niet gekomen. Goeddeels is dit te wijten aan de mindere ervaring, die onze tuinlui omtrent de verzorging van vaste planten hebben, waardoor ze uit vrees voor mislukking er niet aan durven beginnen. Ten einde aan dit bezwaar tegemoet te komen, heb ik in een korte inleiding aan het begin van het hoofdstuk „Vaste Planten” op bladz. 17 van dezen catalogus eenige aanwijzingen omtrent hun gebruik en behandeling gegeven. Bovendien zijn, waar noodig, bij de beschrijving van enkele planten nog cultuuraanwijzingen gegeven.

De talloze aanvragen om hulp en voorlichting bij het in orde brengen van tuinen, hebben mij een tweetal jaren geleden aanleiding gegeven een afdeeling TUINARCHITECTUUR in te stellen. Aan het hoofd hiervan staat een kundig tuinarchitect; waardoor het mogelijk is op ruime schaal adviezen te geven bij het aanleggen of veranderen van tuinen en buitenplaatsen. Alle ontwerpen, begrootingen en adviezen zijn voor hen, die hunne planten uit mijne kweekerij betrekken, gratis. Slechts eventueele reis- en verblijfkosten van den tuinarchitect worden in rekening gebracht.

Tenslotte moge hier nog een overzicht van de inhoud van deze gids volgen :


ROZEN	blz. 3	KNOLBEGONIA'S EN DAHLIA'S	blz. 70
VRUCHTSTRUIKEN	6	GROENTE- EN SPECERIJ-PLANTEN	71
KLIMPLANTEN	7	ZADEN:	
BOOMEN EN HEESTERS	8	GROENTEZADEN	72
CONIFEREN	14	LANDBOUWZADEN	85
VASTE PLANTEN	17	BLOEMZADEN	86
VARENS	69	DIVERSEN	115

Bovendien vindt men op de laatste bladzijden een volledige index van alle in dezen catalogus aangeboden Zaden, Planten en Heestergewassen.



Een veld met Rozen in de Koninklijke Kweekrij „Moerheim.”

Rozen.



Roos Mad. Ed. Herriot.
(Zie blz. 4.)

Het planten geschiedt het best vanaf eind October tot eind November, of van half Maart tot eind April. De bodem moet voor rozen minstens 60 cM. diep omgewerkt zijn, en zwaar, vruchtbaar en vochthoudend wezen.

Vóór het planten late men de rozen vooral niet in zon of wind liggen. Mochten ze onverhoopt zijn uitgedroogd, zoo legge men ze eerst een paar uur in water.

Waar de bodem te vast en te nat is, vermeng men dien met fijn turfstrooisel, verteerd blad en mest; door drogen zandigen grond meng men eenige klei of leem en vooral koemest. Men moet ze niet plaatsen bij groote boomen of in de schaduw. Bij het planten make men vooral ruime gaten, terwijl men zorgt, dat de mest niet aan de wortels raakt en deze laatste goed met den grond vermengd wordt. Stevig met den voet aandrukken is vooral op lichte gronden beslist noodzakelijk. De rozenperken mogen vooral op droge gronden niet te hoog worden aangelegd en zooveel mogelijk vlak. De struikrozen moeten zoo diep worden geplant, dat de plaats van veredeling 3 à 5 cM. onder de oppervlakte komt.

Vóór den winter behandel men de struikrozen als volgt: de struiken worden tot op een voet hoogte rondom aangehoogd met aarde en de daardoor ontstane gaten met verteerde koemest gevuld. Men bedekke daarna het geheele perk met droog blad, waarover men eenige dennentakken kan leggen tegen het opwaaien der bladeren. In plaats van droog blad kan men ook turfstrooisel nemen.

Het snoeien der rozen geschiedt jaarlijks begin April; sterk groeiende soorten moeten lang gesnoeid worden, d. w. z. de takken moeten niet te sterk worden ingekort, want anders zou de struik wel veel nieuwe takken vormen, maar weinig bloeien. Zwak groeiende soorten moeten evenwel sterk worden ingesnoeid, daar men anders spoedig veel zwak hout zou krijgen, terwijl ze toch van nature reeds goed bloeien. Het oude en zwakke hout, alsook waterloten, moeten zooveel mogelijk worden verwijderd en krachtige gezonde eenjarige takken behouden. Men verzuime vooral niet de in 't voorjaar geplante rozen direct na het planten te snoeien, en wel voor de eerste maal alle soorten zeer

kort. Het is meermalen gebeurd, dat men mijn advies vroeg over het slecht groeien van nieuw geplante rozen en meestal bleek mij, dat ze geheel zonder snoeien waren geplant en de struiken dus voorgoed waren bedorven.

In onderstaande soortenlijst beteekent H: hybride-remontant; T: theeroos;
TH: theehybride; P: Pernetiana.

STRUIKROZEN in verschillende soorten naar mijn keus:

10 stuks in 10 soorten	f 3.—
100 „ „ 25 „	- 28.—

STRUIKROZEN.

	Prijs p. stuk.		Prijs p. stuk.
Arnold Janssen TH. Bloeit met welriekende donker karmijnroode bloemen	0.35	Mad. Edmond Rostand P. Sterke groeier, met lange knoppen. De fraaie groote bloemen zijn zacht vleeschkleurig	0.35
Brilliant TH. Met fraaie, donker scharlakenroode bloemen	0.35	Mad. Edouard Herriot P. (zie afbeelding blz 3.) Zonder twijfel een der beste rozen. Zij bloeit zeer rijk met middelgroote halfgevulde bloemen, welke koraalrood zijn, met geel en safranrose. Vooral de knoppen hebben een prachtige nieuwe kleur. Goede trek-, snij- en perkroos, welke herhaaldelijk met hoogste prijzen werd bekroond	0.35
Chateau de Clos Vougeot TH. Fluweelrood met vuurrooden weerschijs, later in donkerkarmijnrood overgaand	0.35	Mad. Marcel Delanney. Met groote gevulde bloemen. Goede groeier	0.50
Clarice Goodacre TH. Chroomgeel, mooie spitse knop	0.80	Mad. Ravary TH. De knoppen zijn goudgeel, overgaand in oranjegeel bij het bloeien; rijkbloeiend. Bloemen groot en gevuld	0.45
Colleen TH. Schitterend rose; rijkbloeiend, groote gevulde bloem	0.55	Mad. Segond Weber TH. Zalmkleurig rose; groote, fraai gevormde bloem	0.35
Comtesse de Rafelis. Lichtrose gevlekt	0.45	Mary Countess of Ilchester TH. Levendig karmijnrood	0.35
Donald Mac Donald. Zeer rijkbloeiende nieuwe roos met prachtig oranje karmijnroode bloemen	0.80	Marquise de Sinety TH. Prachtig oranje-kl. roos	0.50
Edgar W. Burnett TH. Vleeschkleurig rose, sterk geurend. Rijkbloeiend met groote gevulde bloemen	0.45	Melanie Soupert TH. Rose-wit	0.35
Edward Mawley TH. Prachtige roos van een donker karmijnroode kleur; rijkbloeiend	0.35	Mevrouw Dora van Tets TH. Schitterend karmozijnrood, met fluweelachtige weerschijs	0.35
Etoile de France TH. Fluweelachtig donkerrood	0.35	Molly Sharman Crawford T. Roomwit. Groote volle bloem	0.35
Florence Forrester. Wit	0.50	Mrs. Aaron Ward TH. Lichtrose roos met zalmkleurige weerschijs	0.35
Frau Carl Druschki H. Zuiver witte, doorbloeiende roos; een der beste witte rozen	0.35	Mrs. A. Glen Kidston TH. Karmijnrose met oranje; bloemen groot, half gevuld	0.75
Frau Melanie Niedieck. Geel	0.45	Mrs. Andrew Carnegie TH. Met groote zuiverwitte bloemen	0.35
G. Arends H. Rose Frau Carl Druschki	0.35	Mrs. Bryce Allan TH. Prachtige nieuwe roos met groote gevulde karmijnrose bloemen	0.70
General Mc. Arthur TH. Schitterend scharlakenroode bloem	0.35	Mrs. Charles E. Pearson. Helder oranjerood	0.35
George C. Waud TH. Oranje-scharlaken; groote, goed gevulde bloem; zeer geurig	0.40	Mrs. Wallace H. Rowe TH. Nieuwe roos van een bijzondere mooie mauve kleur	0.35
George Dickson H. Zeer welriekend en rijkbloeiend met fluweelachtige, donker karmozijnroode bloemen	0.35	Mrs. Wemyss Queen TH. Donker kanariegeel	0.50
Gorgeous. NIEUW! Bloeit met groote, mooie, kopergele bloemen. Groeit sterk	0.50	National Emblem TH. Rijkbloeiende, laagblijvende roos, met mooie donker karmozijnroode bloemen	0.50
H. V. Machin. NIEUW! Met mooie gevulde, donker purperroode bloemen	0.45	Pharisaër TH. Zeer rijkbloeiend met lichtrose bloemen, welke kleur naar het midden donkerder wordt	0.35
Hugh Dickson H. Schitterend karmijnrood	0.35	Rayon d'Or P. Met prachtige oranje-gele, groote knoppen; de bloemen zijn lichtgeel	0.35
Isobel. Koperkleurig rose	0.80	Red Letter Day. TH. NIEUW! De felst roode kleur; prachtroos	0.35
Jonkheer J. L. Mock TH. Karmijnrood overgaand in rose	0.35	Richmond TH. Met schitterend donker-bloedroode bloemen	0.35
Kaiserin Auguste Victoria TH. Van buiten wit, binnen geel. Bekende snijroos	0.45	Sunburst TH, NIEUW! Bloeit zeer rijk m. prachtige groote, schoongevormde oranje-gele bloemen	0.45
Lady Alice Stanley TH. De kleur is aan de buitenzijde diep koraalrood en aan de binnenzijde dof vleeschkleurig	0.35	Willowmere P. De lange knoppen op krachtige bloemstelen, zijn koraal-karmijnrood. De bloem is groot, lang en kelkvormig, van schitterende kreeftroode kleur met in het midden geel, aan de punten der petalen karmijnrose	0.35
Lady Ashtown TH. Rose met geelachtig hart	0.35		
Lady Hillingdon T. Diep abrikoosgeel, spitse knoppen; zeer rijkbloeiend en krachtige groei; uitstekende trekroos	0.35		
Laurent Carle TH. Schitterend karmozijnrood	0.45		
Liberty TH. Glanzend karmozijnrood. Uitstekende perkroos	0.35		
Louise Catharine Breslau P. Koperachtig rood met oranje en geel	0.35		
Mad. Abel Chatenay TH. Karmijnrose met matrose en zalmkleurige schaduw	0.35		
Mad. Caroline Testout TH. Vleeschkleurig rose, zeer geschikt voor perken	0.40		

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

Vruchtstruiken.

	Prijs p. 100 stuks.	Prijs p. 10 stuks.	Prijs p. stuk.		Prijs p. 100 stuks.	Prijs p. 10 stuks.	Prijs p. stuk.
Aalbes, Comet. Een der vroegste en grootstvruchtige roode Aalbessen			0.35	Aalbes, zwarte Boskoop Giant. Bizonder grootvruchtige nieuwe zwarte bes, welke in Engeland in de laatste jaren zeer veel opgang heeft gemaakt, en daar thans zeer gezocht is, vooral omdat zij minder vatbaar is voor ziekten			0.25
— Fay's Prolific, grootvr. roode. .			0.30	— zwarte Goliath. Voortreffelijke, sterke, gezonde soort; groote trossen met schoone groote vruchten			0.25
— Hollandsche roode dikkop. Dit is een buitengewoon krachtige groeier en gemakkelijk te herkennen aan de donkere, eenigszins gekrulde, forsche bladeren en het dikke lichtgrijze hout, dat in een dikken eindknop eindigt. Zij bloeit later dan andere soorten, waardoor de bloesem zelden bevriest en ook later rijpt dan de meeste andere, zoodat men van deze soort nog vruchten kan plukken, als er overigens geen aalbessen meer zijn. Zij geeft zeer lange trossen met buitengewoon groote, lichtroode doorschijnende bessen, die een heerlijken, frisschen smaak hebben. Deze soort overtreft alle andere in rijkdragendheid			0.30	Framboos Goliath. Door hare sterke vertakkingen, als ze flink ruim geplant is, levert deze nieuwe framboos veel meer op dan vele andere soorten. Bovendien is zij zeer vroeg rijp. De vruchten zijn groot en sterk, zoodat zij bij het verpakken niet licht kneuzen	10.—	1.25	
— Hoornsche roode grootvruchtige			0.25	— Hornet, bekende uitnemende soort	8.—	1.—	
— St. Anna Korfke, (roode geelsteel)			0.30	— Immertragende von Feldbrunnen geeft een enorme opbrengst, daar zij niet alleen gelijk met andere vroege soorten draagt, maar ook in den herfst een rijke opbrengst geeft. Zeer aanbevelenswaardig .	8.—	1.—	
— witte van „Bar-le-Duc," een zeer sterke groeier. De bessen bevatten nagenoeg geen pitten, waarom zij bijzonder voor het bereiden van Jam is aan te bevelen. Voor het bereiden van de in Frankrijk bekende „Confiture de Bar-le-Duc" wordt deze soort uitsluitend gebruikt			0.30	— Queen of England. Vrucht geel en rijkdragend	8.—	1.—	
— witte kromhout.			0.25	— Superlative, rijkdragend en geurig	8.—	1.—	
— witte lang-trossige. Krachtig groeiende soort, welke als een der rijkstdragende kan worden aanbevolen. De grootste trossen zijn vaak 20 cM. lang met vele groote bessen van geelachtig witte kleur en heerlijken smaak			0.30	— The Devon. Voortreffelijke, nieuwe, krachtig groeiende Framboos. De struiken bereiken een hoogte van 2½—3 Meter. De zeer groote vruchten zijn rondachtig kegelvormig, saprijk en frisch. De opbrengst dezer soort is verbazend .	20.—	2.50	
				Japansche Wijnbes, met heerlijke oranjeroode vruchten als kleine frambozen. Rijp in September . .			0.75
				Loganbes. Groote vruchten, het midden houdende tusschen braam en framboos			0.60

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

Klimplanten.

Onderstaande planten zijn alle winterharde, goede klimmers, geschikt om muren, schuttingen, priëlen, enz. mee te doen begroeien. Klimplanten, als *Clematis coccinea*, *Lathyrus latifolius* en *Tropaeolum speciosum*, die ieder najaar tot den grond afsterven, vindt men opgenomen onder „Vaste planten”; Klimrozen onder „Rozen.”

	Prijs p. stuk.		Prijs p. stuk.
Actinidia polygama. Sterke groeier, bloeit met witte welriekende bloemen	0.60	Clematis montana perfecta. Bloemen blauwachtig wit, grooter dan van <i>montana grandiflora</i> . .	0.80
Ampelopsis Henryana. Met zeer mooi blad; zelfhechtend evenals <i>A. Veitchi</i>	0.75	— montana rubens , met mooie groote rose gekleurde bloemen	0.50
— quinquefolia. Algemeen bekende wilde wingerd. In den herfst wordt het blad prachtig rood	0.50	— montana undulata. Blauwachtig wit, gegolfde bloembladeren	0.60
— Veitchi. Zelfklimmende wilde wingerd. Deze moet gedurende den eersten winter na de planting worden gedekt. Zij is bij uitstek geschikt voor bedekking van muren en schuttingen, daar zij zich door zuigworteltjes daaraan vasthecht, en de loten vlak tegen den muur aangroeien, waardoor zij in 't geheel niet behoeft te worden gebonden. Het blad wordt fraai bloedrood in den herfst	0.50	— montana Wilsoni. Bloeit later dan de andere <i>montana</i> -soorten en groeit niet zoo hoog. De witte bloemen zijn grooter dan van de andere variëteiten	0.40
Aristolochia Sipho. <i>Duitsche pijpenboom.</i> Zeer schoone klimplant met groote hartvormige bladeren, die dakpansgewijze over elkaar liggen. De bloemen gelijken veel op een Duitse pijp.	0.75	— nutans. Uit China ingevoerde soort met geelwitte bloemen	0.75
Bignonia radicans , bloeit m. oranje-roode bloemen	0.75	— paniculata. Rijkbloeiend met zuiverwitte bloemen, die een heerlijken geur verspreiden . .	0.60
Clematis in vele soorten op naam	0.60	Glycine sinensis (= <i>Wistaria sin.</i>) met 25 cm. lange violette bloemtrossen	0.90
— flammula. Met trossen welriekende witte bloempjes	0.50	Hedera Helix , gewone klimop	0.60
— Jackmanni. Prachtig donkerblauwe <i>Clematis</i>	0.75	— Helix hibernica. <i>Schotsche klimop.</i> Grootbladerige variëteit	0.50 1.—
— montana grandiflora. Prachtige <i>Clematis</i> , die in April-Mei zeer rijk bloeit met mooie groote witte bloemen	0.50	Jasminum Beesianum , karmijnrood	0.75
— montana lilacina , met azuurachtig lila bloemen	0.75	— nudiflorum. Bloeit vroeg in het voorjaar met gele bloemen	0.75
		Lonicera Caprifolium (<i>Kamperfoeli</i>)	0.60
		Periploca graeca. <i>Touwboom.</i> Het blaad is glanzend groen, terwijl de bloemen, die in Juli en Augustus verschijnen, bruin van kleur en welriekend zijn	0.90
		Polygonum Baldschuanicum. Met sneeuw witte bloemen van Juli tot September	0.90



Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

Boomen en Heesters.

De heesters, die 's winters groen blijven, zijn met een * gemerkt.

	Prijs per 100 stuks.	Prijs per stuk.		Prijs per 100 stuks.	Prijs per stuk.
Acer campestre. Spaansche Aak, zeer geschikt voor onderbeplanting. 1—1.50 M.	20.—	0.30	Berberis vulgaris. Zuurdoorn; draagt in den herfst mooie roode bessen .		0.30
— Negundo arg. varg. Zilverbonte eschdoorn		0.60	— vulgaris atropurpurea , zuurdoorn met bruin blad		0.40
— polymorphum atropurpureum. Japansche Eschdoorn, met bruin- roode bladeren		1.25	Bruckenthalia speculiflora , heide- kruid met spurrieachtig blad en kleine rose bloempjes		0.25
Aesculus parviflora (= Pavia Ma- crostachya), bloeit in Juli en Aug. met witte bloesems		1.—	Buddleia variabilis var. magnifica. Een sierlijke, uit China ingevoerde halfheester met circa 60 cM. lange violetten bloemtrossen, die veel aan seringen doet denken. De plant bereikt een hoogte van c.a. 180—200 cM. Moet in den winter gedekt worden		0.60
Amelanchier botryapium. Krenten- boompje, prachtige heester met witte bloempjes overdekt in den bloeitijd		0.50	* Buxus sempervirens (randpalm.) Zeer aan te bevelen voor randen om perken in stadstuintjes of voor randen om borders. Men plante 10 stuks per strekkende Meter . .	7.—	
Amorpha canescens. Bloeit in den zomer met violetten bloemen, blijft laag		0.40	Calycanthus floridus. Meloen- boompje; bloeit met bruin-roode bloemen, die evenals het hout een sterken geur verspreiden		0.40
— fruticosa , groeit zwaarder dan de voorgaande; ook geschikt voor schrane gronden		0.40	Carpinus Betulus. Haagbeuk . .	18.—	0.25
Amygdalus communis fl. roseo pl. bloeit in het voorjaar met mooie roosroode roosjes; de bloeiende takken worden zeer veel in bou- quetten gebruikt		0.70	Castanea vesca , tamme kastanje . .		1.——1.50
— sinensis alba pl. Bloeit met mooie dubbele witte bloempjes		0.50	Ceanothus azureus , blauw		0.50
* Andromeda Catesbaei. Bloeit vroeg in het voorjaar met witte bloempjes, blad is donker roodbruin, zeer ge- schikt voor snijbloem		0.50	— Gloire de Versailles , donkerblauw		0.60
*— floribunda. Kleinblijvendstruikje, in het voorjaar met witte bloem- trossen bloeiend		1.25	— Marie Simon , lila rose. Sierlijke struikjes, welke in Aug.—Sept. bloeien; verlangen een voedzamen bodem		0.60
*— japonica , bloeit met zeer mooie witte bloemen		0.75	Cercydrphyllum japonicum. Zeer mooie heester, die door haar mooie herfsttinten bijzonder de aandacht trekt. Volkomen winterhard . . .		0.40-0.60
Aralia Cashmeriana , sierlijke half- heester uit Kaschmir afkomstig . .		0.40	Cercis canadensis		0.40
— pentaphylla , met sierlijk, hand- vormig blad		0.45	— siliquastrum. Judasboom, bloeit in Mei met vele roode bloempjes .		0.50
Artemisia Abrotanum. Citroenkruid; de bladeren verspreiden een sterken geur		0.30	Chionanthus virginica. Sneeuwvlok- boom		1.—
* Aucuba japonica	0.60-1.00		Clethra alnifolia , bloeit in Augustus met mooie witte bloemen, het blad is licht groen		0.50
Azalea , zie <i>Rhododendron</i> .			Colutea arborescens. Blaasboom, be- kend om de eigenaardige vruchten		0.35
Berberis corallina. NIEUW! Prach- tige, zeer rijkbloeiende heester, in het voorjaar bedekt met heldergele hangende bloemen. Uitstekend voor rotspartijen		1.75	Cornus mascula. Eetbare Kornoelje, bloeit zeer vroeg		0.45
*— Darwini , laagblijvend struikje, geschikt voor rotspartijen, jonge takjes zijn bruin van kleur		0.60	— sanguinea , sierlijke heester met roode bladstengels en takken . .		0.25
*— stenophylla , blad is donker glim- mend groen, bloemen geel		0.60	— sibirica. De takken zijn prachtig helderrood gekleurd, wat vooral in den winter zeer mooi uitkomt .		0.35
— Thunbergii. Japansche Berberis		0.40	Corylus Avellana. Gewone Hazelaar		0.30-0.50
			— Avellana purpurea. Bruine Ha- zelaar		0.40


Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ” ”

	Bloeitijd.	Prijs p. st.
Corylus colurna. Kurk Hazelaar .		0.90
Cotoneaster Francheti. Sterke groeier met mooi blad; draagt in den herfst roode bessen		0.75
*— horizontalis , zeer geschikt voor rotspartijen; tooit zich in den herfst met een menigte helder- roode bessen		0.60
— pyrenaica . Nog tamelijk nieuw, met kleine grijsgrauwe blaadjes. Prachtige heester voor rotspartijen, daar de takken ombuigen en over den grond groeien. Volkomen win- terhard		0.75
*— Simonsi , sierlijke heester, die in den herfst overladen is met mooie roode bessen		0.30
Crataegus Paul's Scarlet , met dub- belroode bloemen. Zeer mooi. Hoogstam		1.20
Struiken		0.75
Cydonia jap. Aurora. Bloeit met oranjeroode bloemen.		0.60
— Maulei , koperkleurig		0.60
Cytisus Adami , bloeit soms in 3 kleuren, over het algemeen rood- bloeiend. Hoogstam		1.25
— Laburnum (<i>Laburnum vulgare</i>) Gouden regen		0.30
* Daphne cneorum . Groenblijvend heestertje, met klein blad en schit- terend roode bloemen		0.60
*— cneorum maximum , bloemen grooter dan van voorgaande		0.70
— Mezereum album . Peperboompje, bloeit zeer vroeg met witte bloempjes		0.50
— Mezereum rubrum , als vorige, met roode bloempjes		0.75
Desmodium penduliflorum , sierlijke halfheester, bloeit in Augustus met violet-blauwe vlinderbloemen		0.60
Deutzia crenata		0.35
— crenata candidissima plena , zui- verwitte bloemen		0.35
— crenata fl. roseo pl.		0.30
— gracilis , laagblijvende heester, tijdens den bloei overdekt met witte bloempjes		0.30
— Pride of Rochester , met dubbele witte bloemen		0.30
— Vilmorinae , met zeer mooi blad		0.50
Elaeagnus argentea , met zilverachtig blad		0.75
— edulis . Mooie heester met olijf- bruine takken en eetbare, roode vruchten in het najaar		0.50

* ERICA. (HEIDE.)

Voor beplanting van Rotspartijen kunnen de verschillende soorten van Heide niet genoeg worden aanbevolen. Het is wen chelijk den grond met wat heidegrond of turfstroo- sel te vermengen. Ook verdient het aanbe- velling, om bij strenge koude eene lichte be- dekking van dennentakken aan te brengen.

*Erica herbacea carnea.*

	Bloeitijd.	Prijs p. st.
* Erica cinerea . Laaggroeiend, met purperrose klokjes		0.25
*— herbacea alba , wit	2-3	0.25
*— herbacea carnea , rose. Deze beide laatste bloeien reeds volop Februari of Maart, zoodra vorst of sneeuw voorbij is	2-3	0.25
*— Mackayana plena . Met fijne, dubbele, schitterend rose bloempjes.	8	0.25
*— mediterranea hybrida , met don- kerrose bloempjes	4-5	0.25
*— tetralix alba , witte dopheide		0.25
*— vagans alba , wit	8	0.25
*— rubra , donkerrose	8	0.25
Deze beide laatste vormen gedron- gen polletjes, die zeer rijk bloeien.		
*— (Calluna) vulgaris Alporti . Met lange, slanke, grijsgroene takjes en donkerroode bloemen		0.25
*— vulgaris elata , lange takken, wit- bloeiend		0.25

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "


	Hoogte in cM.	Prijs per stuk.		Hoogte in cM. 70 90	Prijs per stuk. 1.—
* <i>Erica vulgaris fl. pleno</i> , dubb. heide, een der mooiste heidesoorten, met tallooze kleine dubb. lila bloempjes		0.30	* <i>Ilex aquifolium Zilverbont</i> . . .		
* <i>Escallonia organiensis</i> . Sierlijke, lage, sterkvertakte struiken . . .		0.40	<i>Itea virginica</i> . Deze mooie heester bloeit in Augustus met witte bloe- men, het blad is glanzend groen		0.50
<i>Evonymus alata</i> , met kurkachtige takken en mooie roode vruchtjes — <i>europaea</i> , Kardinaalsmuts . . .		0.50 0.35	* <i>Kalmia latifolia</i> . Een der dank- baarste heesters, welke in Mei en Juni overdekt zijn met vleeschkleu- rige bloemen, die fraai afsteken tegen de donkergroene bladeren .		0.75-1.25
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , bruine beuk	1.50/2.50		<i>Kerria jap. fl. pl.</i> Met dubbele goud- gele bloemen		0.35
<i>Forsythia suspensa</i> . Bloeit in het voorjaar met goudgele bloemen .	0.40		* <i>Ledum latifolium compactum</i> , laagblijvend, bloeit in Mei met witte bloemen		0.50
— <i>viridissima</i> . Bloeit vroeg met mooie gele klokjes	0.30		* <i>Ligustrum Ibota</i> . Mooie heester, met olijfgroen blad; bloeit met witte bloemen		0.45 0.35
* <i>Gaultheria Shallon</i> . Uitstekende rotsplant, met bruin gekleurde bladeren; blauwe bessen	0.75		*— <i>Italicum</i> , draagt zwarte bessen		
<i>Genista Andreana</i> . Brem, bloeit met bruin gevlekte bloemen	0.75		*— <i>ovalifolium</i> . Zeer geschikt voor het maken van heggen, ook solitair geplant zeer mooi	Prijs per 100 stuks. 30.—	0.40
— <i>praecox</i> , bloeit met mooie witte bloemen	0.60		— <i>Regelianum</i> . Breed groeiende heester; groeit goed in de schaduw		0.60
<i>Hedysarum multijugum</i> , met lange trossen helder violette bloemen .	0.35		*— <i>sinense</i> , met kleine bladeren, bloeit in Juli met witte bloemen .		0.50 0.75
<i>Hibiscus syriacus hybriden</i> , in soorten	0.70		<i>Liquidambar styraciflua</i>		
<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Duindoorn	0.45		Amberboom.		
<i>Hydrangea pan. gr. fl.</i> Bloeit in Augustus met groote witte bloem- trossen	0.30		<i>Lonicera Ledebouri</i> . Met bruin-roode bloemen		0.45
*ILEX AQUIFOLIUM. (HULST.)			— <i>tartarica rubra</i> . Bloeit met rose bloemen		0.45
* <i>Ilex aquifolium Camelliaefolia</i> , { Camellia-blad	70—80 90 110 120—130	1.— 1.20 1.50	<i>Magnolia alexandrina</i> , met karmijn- roode bloemen		2.—
*— <i>aquifol. Golden King</i> (NIEUW) Prachtige nieuwe Hulst met don- kergroene, goudgerande, groote bladeren van eenen onberispelij- ken vorm. Deze aanbevelens- waardige soort verwierf te Londen een 1 ^{ste} klas Certificaat.	80—90 90—100 120—140	1.50 1.75 2.25	— <i>Soulangeana</i> . Beverboom, bloeit reeds vroeg in het voorjaar . . .		1.75
*— <i>aquifolium Golden Queen</i> . . .	100—120	1.50	— <i>Halleana stellata</i> , vroegbloeiend, met zuiver witte bloemen		2.50
*— „ <i>Goudbont</i>	80 90 90—100 120—140	1.20 1.50 1.80	* <i>Mahonia Aquifolium</i> . Hulst Berberis, groeit overal, bloeit met gele tros- sen; de bladeren worden in het najaar rood-bruin		0.50
*— „ <i>Hodginsi</i>	70—80 90 110	1.— 1.50	<i>Malus floribunda</i> . Fraaie heester; in den voorzomer vele rose bloemen		0.75
*— <i>aquifolium Mad. Briot</i> , zilver- bont, grootbl., extra	90—100 100—120 120—130	1.50 1.80 2.25	— <i>Scheideckeri</i> . Sierappel met groote donkerrose bloesem		0.70 0.70
*— <i>aquifolium Perado</i>	80—90 100—120	0.90 1.20	— <i>spectabilis</i> , dubbel wit		
*— „ <i>Pernyi</i> . Prachtige nieuwe soort met kleine bladeren; iets geheel eigenaardigs. Abso- luut winterhard	60—75 75—90	2.— 2.50	* <i>Muehlenbeckia nana</i> . Groenblij- vende kruipende plant met donker- kergroene bladeren		0.30 0.50
*— <i>aquifolium pyramidalis</i> (Bes- hulst). Deze variëteit brengt in het najaar een menigte vuurroode bessen voort	60—80	0.90	* <i>Myrica cerifera</i> . Wasgagel . . .		
*— <i>aquifolium Silver Queen</i> . Zil- verbont, grootbl.	60—70 80—90 90—100	0.90 1.20 1.50	<i>Pavia macrostachya</i> . (Zie <i>Aesculus</i>)		
			* <i>Pernettya speciosa</i> , bloeit m. kleine witte bloempjes en is in het najaar bezet m. mooie roode of witte bessen		0.75
			<i>Philadelphus coronarius</i> , boeren- jasmijn		0.40
			— <i>grandiflorus</i> , grootbloemige witte jasmijn		0.50
			— <i>inodorus</i> , reuklooze jasmijn . .		0.50

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoogte in M.	Prijs p. stuk.
* Polygala Chamaebuxus purpurea. Kruipende struik, welke in Mei-Juni bloeit met purperen bloempjes . .		0.40
Potentilla Friedrichseni , bloeit van Mei tot Sept. m. lichtgele bloempjes		0.35
* Prinos glabra. Volkomen winter- hard, klein-blijvend groen struikje		0.90
* Prunus Laurocerasus , Laurierkers.	± 1½	2.—
*— Laurocerasus Schipkaënsis , breed uitgroeiende soort, bladeren zijn veel kleiner dan van de gewone Laurierkers, volkomen winterhard.	" 1½	1.50
*— Laurocerasus Schipkaënsis Reynvani , volkomen winterhard, pracht. pyramiden m. donkergr. blad	" 1½	1.50
— padus. Vogelkers		0.35
— Pissardi. Sierpruim met bijzonder mooi bruin blad, bloeit wit		0.60
— triloba , bloeit vroeg met dubbele rose bloemen		0.60
— virginiana , met kleine witte bloempjes		0.45

RHODODENDRONS en AZALEA'S.



Pink Pearl.

*RHODODENDRON.

Van dit schoone plantengeslacht met donkergroene glanzige bladeren, welke ook gedurende den winter het oog aangenaam aandoen, kan ik een zeer schoone collectie aanbieden, welke de meest mogelijke variatie van rijkgekleurde bloemen oplevert. Op kleiachtige gronden moet de aarde met turfstrooisel worden vermengd, indien men de planten flink wil laten groeien en bloeien. Zij teelen het weligst in zwarte, liefst veenachtige tuinaarde. Een flinke bemesting met zuivere k mest kan in alle gevallen worden aanbevolen.
De prijs hangt af van de grootte der planten en het aantal knoppen.

Nieuwe RHODODENDRON HYBRIDEN.

	Prijs p. stuk.
Alice , prachtige nieuwigheid, met groote trossen, groote, zuiver rose bloemen, iets gelijkende op „Pink Pearl,” doch donkerder van kleur . . .	2.25
Mrs. E. C. Stirling. Prachtige, nieuwe variëteit met glanzende bladeren en rose bloemen; enorm groote tros. Sterke planten met zeer veel knoppen.	2.—

Pink Pearl , de schoonste vleeschkleurig rose Rhododendron met enorm groote trossen en bloemen. Waardevolle nieuwigheid, welke zonder twijfel eene der schoonste is, die thans in cultuur is. Om te vervroegen zoo- wel als voor perken is zij bijzonder geschikt. Sterke planten met knoppen	1.50 tot 3.50
---	---------------------

White Pearl, witbloeiende variëteit der voorgaande, moet zoo mogelijk 's winters gedekt worden, daar deze niet tegen strenge vorst bestand is.

Sterke planten met knoppen 2.—

RHODODENDRON-HYBRIDEN.

Zware planten in bovenstaande soorten met veel knoppen
p. st. f 0.60, f 0.80, f 1.— en f 1.25

Extra zware planten met veel knoppen,
p. st. f 1.50 à f 2.50

De prijzen worden geregeld naar het aantal knoppen en naar de grootte in verband met de soorten. Wegens den enormen voorraad kan ik deze planten zóó billijk aanbieden.

Bij afname van groote hoeveelheden voor perken of onderbeplanting onder hooge boomen, prijs per correspondentie.

Abraham Lincoln, violetrood, donkere vlek.
Album elegans, wit.
Album grandiflorum, wit.
Bertha Parson, lila rose.
Caractacus, zacht violetrood.
Carl Mette, vurig donkerrood.
Catawbiense grandiflorum, lila paars.
Catawbiense grandiflorum album, wit, met zacht lila weerschijn.
Celestum, rose lila.
Charles Dickens, donkerrood.
Charlie Waterer, scharlakenrood, licht midden.
Cunningham White, wit.
Doncaster, schitterend donker karmijn.
Duc. de Montpensier, licht, in dof steenrood overgaand.
Duke of Connaught, karmozijnrood, licht midden.
Edw. S. Rand, helder scharlakenrood.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”



Azalea Balsaminaeflora.

RHODODENDRON-HYBRIDEN (Vervolg).

Elfride, karmijnrose.
 Everestianum, rose lila, groote tros.
 F. D. Godman, karmijnrood.
 Fastuosum fl. pl., dubbelbloemig, licht lila.
 General Grant, roserood.
 Giganteum, zacht karmijn.
 Gloriosum, vleeschkleur.
 Gomer Waterer, wit met zachten blos, grootbloemig.
 H. H. Hunnewell, donkerrood.
 H. W. Sargent, karmijnrood.
 J. H. Agnew, rose-lila getint met groengele vlek.
 John Walter, helderrood.
 Kettledrum, donkerrood.
 Lady Clermont, zachtrood, donkere vlek.
 Lady Eleonora Cathcart, wit, violet getint.
 Lee's dark purple, donkerpaars.
 Lord Roberts, donkerrood met zwarte vlek.
 Madame A. Moser, rose met gele vlek.
 Miss Milner, karmijnrood.
 Monsieur Thiers, helder karmijnrood.
 Mrs. John Waterer, zacht rood.
 Mrs. R. S. Holford, helderrood.
 Mrs. Tom Agnew, zuiver wit, bronzen vlek.
 Parson's Gloriosum, rose wit, gele vlek.
 Parson's grandiflorum rubrum, rood.
 Prince Camille de Rohan, wit met rose, donkere purperen vlek.
 Princess Mary of Cambridge, centrum wit, lila rand.
 Princesse de Wagram, karmijnrood.
 Robert Croux, donkerrood.
 Sir Charles Buttler, zacht rose.
 Sir Henry Havelock, bloedrood.
 Stephan Davies, karmijnrood, donkere vlek.
 The Strategist, licht rose in rood overgaand.

	Prijs p. stuk.
Rhododendron ponticum	0.70
— praecox . Alpenroos, welke zeer vroeg en rijk bloeit met schoone rozeroode bloemen	0.60

AZALEA.

Prachtige grootbloemige heesters, welke in Juni en Juli in vele kleuren bloeien. Uitstekend geschikt voor het beplanten van perken of om te worden geforceerd. Zij laten in den winter het blad vallen.

Azalea's in soorten op naam	0.60 à 1.— à 1.50
— mollis chinensis hybriden	0.50 à 0.60
— mollis op stam , hoog 60—80 cM.	1.50
— pontica , in kleuren	1.25
— Amoena , glanzend klein blad en met lila rose bloemen, in Juni; winterhard	0.55

Azalea Balsaminaeflora (= -rosaeflora). Een der schoonste Azalea's met groote dubbele, zalmkleurig roode bloemen, die aan Balsaminen doen denken. Zeer rijkbloeiend. Wegens den lagen, eenigszins kruipenden groei, is dit een prachtige plant voor rotspartijen. Zij laat zich ook zeer goed in de kamer in bloei trekken

0.85

Azalea Benigiri , steenrood, rijkbloeiend; een krachtige groeier, moet 's winters gedekt	0.75
— Illuminator , helder purperen bloemen; winterhard	0.75
— Hinodigiri . Zeer rijkbloeiend met vuurroode bloemen; moet 's winters gedekt. Ook als kamerplant zeer geschikt en gemakkelijk in bloei te trekken	0.85
— Kaempferi , met rose bloemen; volkomen winterhard	0.75
— Ledifolia alba . Buitengewoon rijkbloeiend met prachtige, groote, zuiverwitte bloemen. Volkomen winterhard en een goede groeier	0.75
— Macrantha , lilarood; moet 's winters gedekt	0.75
— Maxwelli , zeer groote enkele, rose bloemen, volkomen winterhard	0.75
— Occidentalis , met witte bloemen, die aan de buitenkant rood gestreept zijn. Zeer welriekend. Volkomen winterhard	1.15
— Princess Maud , roodpurperen bloemen; moet 's winters gedekt	0.80

Rhodotypus kerrioides. Bloeit gedurende den geheelen zomer met groote witte bloemen; het blad gelijkt op dat van Kerria. De mooie zwarte vruchten geven aan de struik in het najaar een eigenaardig voorkomen

0.40

Rhus Cotinus. Pruikenboom, met groengele bloemen

0.40

— **thyphina laciniata**. Fluweelboom met ingesneden blad

0.60

Ribes alpinum. Kleinblijvend, zeer geschikt voor onderhoud, de takken zijn witachtig

0.40

— **pensylvanicum**. Het blad heeft in het najaar een mooie herfsttint

0.50

— **sanguineum**. Roode Ribes, zeer vroegbloeiend

0.35

Robinia hispida rosea. De roode bloemtrossen verschijnen van Juni tot September. De scheuten en bloemstelen zijn met roodachtige haren bezet

0.60

Salix rosmarinifolia. Rozemarijn wilg, met blauwachtig blad

0.35

Sambucus nigra. Gewone vlier

0.30

— **nigra laciniata**, forschgroeiende heester met ingesneden blad

0.30

— **racemosa plumosa**. Bloemen groengeel, gevolgd door mooie roode bessen

0.45

Shepherdia argentea (= *Elaeagnus argentea*)

0.60

***Skimmia oblata**. Zeer mooi struikje, in den winter roode bessen dragend

1.—

Spiraea Bumalda Ant. Waterer. Laagblijvend heestertje; bloeit mooi rood

0.45

— **opulifolia**. Sierlijke heester

0.35

— **van Houttei**

0.40

Staphylea colchica, met witte bloemen

0.50

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

	Prijs p. stuk.		Prijs p. stuk.
Stephanandra flexuosa	0.40	Viburnum Lantana. Deze heester heeft licht-grijze wolachtige bladeren en witte bloemen. Zij geeft bessen, die eerst groen, daarna rood en eindelijk zwart worden	0.45
— Tanakaë. Zeer sierlijke forsch groeiende heester. Het ingesneden blad kleurt zich in het najaar mooi rood	0.50	— molle. Uitmuntende heester; houdt lang haar blad in het najaar	0.40
Symphoricarpus glomerata. In het najaar met aardige roode vruchtjes	0.40	— Opulus sterile. Echte Sneeuwbal, algemeen bekende heester met witte bloemen	0.50
— racemosa. Radijsboompje, met mooie ronde witte vruchtjes	0.30	— rhytidophyllum. NIEUW! Een nog zeldzame soort, met prachtig blad en geel-witte bloemen. Een der mooiste. Absoluut winterhard	1.—
Syringa vulgaris. Gewone sering, paars	0.60	— tomentosum. Bloeit met groote platte bloemschermen	0.45
— vulgaris Charles X, violet, enkel	0.90	Weigelia amabilis. Flinke groeier met groot blad en rose bloemen	0.35
— vulgaris Marie Legraye, wit, enkel	0.80	— Eva Rathke, donkerroode Weigelia	0.45
Viburnum Carlesii. NIEUW! Met geurige witte bloemen; uit Korea ingevoerd	1.25	— Lavalleï, karmijnrood	0.45

*Picea pungens Moerheimi.*

Coniferen.

Bijna alle soorten van Coniferen blijven ook des winters groen. Ze worden veelvuldig geplant zoowel in groepen of in perken en als alleenstaande boomen. Wil men schuren, muren of schuttingen aan het oog onttrekken, zoo zijn daarvoor de Coniferen bij uitstek geschikt. Op kleigronden is het aanbevelenswaardig om den grond met turfstrooisel te vermengen. In alle geval moet vóór de planting de grond flink diep worden losgewerkt.

De door mij gekweekte Coniferen zijn dikwijls verplant en hebben daardoor vaste kluiten, hetgeen de kans op goed aangroeien aanmerkelijk verhoogt. Men vraagt mij dikwijls hoeveel stuks benodigd zijn voor een perk. Dit kan men echter zelf gemakkelijk uitrekenen, wanneer men nagaat, dat het aantal vierkante meters van de oppervlakte van het perk ook nagenoeg het aantal der benodigde Coniferen aanwijst.


De meest geschikte tijd om Coniferen te verplanten, is van begin April tot einde Mei, en half Augustus tot half October. Ze worden in verschillende grootten geleverd en hoofdzakelijk in de volgende soorten.

Meestal worden de kluiten ingepakt in gaaslinnen, hetwelk bij het planten vooral niet mag worden verwijderd. Indien de grond droog is, maakt men de kluit vóór het planten wat vochtig.

N. B. Mijne Coniferen zijn met bijzondere zorg gesnoeid, van onderen tot boven goed gevuld, en daardoor in één woord pracht-exemplaren te noemen.

	Hoogte in cM.	Prijs p. stuk.
Abies arizonica , zeldzame den waarvan de bast wit wordt als de berk. Vormt prachtige boomen met zilverblauwe naalden	60—70 80—100 100—120	f 1.50 - 2.— - 2.50
„ concolor violacea , met lange blauwgroene naalden	90—100 100—120 130—150 150—170	- 1.50 - 2.— - 3.— - 5.—
„ Nordmanniana , welbekende schoone Nordman Spar	50—70 80—90 90—100	- 0.80 - 1.25 - 1.75
Cedrus atlantica glauca . Prachtige conifeer, met zeer mooie blauwe naalden. Solitairplant	120—150 150—175 250—260	- 2.— - 2.50 - 4.—
„ Deodora , zeer schoone conifeer met mooie, lange overhangende takken, dicht bezet met prachtige, lange, blauw-groene naalden	125—140	- 2.—
Cryptomeria Lobbi compacta . Groeit compact; kleurt zich in den winter mooi bruin-rood. Volkomen winterhard	100—110 110—120 120—130	- 1.— - 1.25 - 1.50
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoni , gewone snelgroeiende donkergroene Cypres.	120—140 140—160 160—180	- 1.20 - 1.50 - 1.75
„ „ „ Allumi , mooi donker blauwgroen loof	60—70 70—90 90—110	- 0.80 - 1.— - 1.25
„ „ „ Fraseri , zuilvormig, blauwgroen	70—80	- 1.—
„ „ „ Silver Queen , met zilverwitte uiteinden aan alle takken; de schoonste van alle zilverbonte	130—140 140—150	- 1.20 - 1.50
„ „ „ Triomf van Boskoop , een der schoonste met blauw-groen loof	120—130 130—140 140—150 150—170	- 1.25 - 1.60 - 2.— - 2.25
Juniperus japonica aurea , met lange takken en geel loof	80—90 90—100 100—120 120—140 140—160	- 0.80 - 1.— - 1.25 - 1.50 - 2.—
„ Pfitzeriana , met losse neerhangende takken	90—100 100—120	- 1.60 - 2.—
„ tamaricifolia , kruipend, zeer mooi voor rotspartijen, 40—60 cM. breed		- 1.50
„ virginiana elegantissima	70—80 80—90 90—100	- 0.80 - 1.— - 1.25
„ „ glauca , blauwgroen	110—120 130—140	- 1.20 - 1.50
Picea excelsa inverta , prachtige treurspar met neerhangende takken	150—170	- 2.—
„ pungens glauca Kosteri . Bekende blauwe spar, behoudt ook des winters haar prachtige blauwe kleur	50—60 60—70 70—80 80—100 120—140	- 0.80 - 1.— - 1.20 - 1.50 - 2.50
„ PUNGENS MOERHEIMI , belangrijke verbetering van de voorgaande. De kleur der naalden is zeer helder blauw. (Zie afbeelding op bladz. 14.)	50—60 60—70 70—80 80—90	- 1.70 - 2.— - 2.40 - 3.—
Pseudotsuga Douglasi glauca elegans , Douglas-Den, mooie blauwgroene soort met lange naalden	120—140 140—150 160—180	- 1.50 - 2.— - 2.50
„ „ „ Moerheimi , komt in vorm overeen met de vorige, maar groeit meer gedrongen en de kleur is helderblauw	110—130 140—160	- 2.— - 3.—
Retinospora squarrosa Veitchi	60—70 80—90 120—130 140—160	- 0.75 - 1.— - 1.40 - 2.—
„ obtusa aurea	60—80 90—100	- 1.— - 1.25

	Hoogte in cM.	Prijs p. stuk.
Retinospora obtusa aurea Youngi }	110—120	f 1.20
	130—140	- 1.50
	150—160	- 2.—
„ „ gracilis }	60—70	- 1.25
	80—90	- 1.50
	100—120	- 2.—
Retinospora Crippsi , schoon heldergeel. Volkomen winterhard }	60—70	- 0.90
	80—90	- 1.20
	100—110	- 1.50
	120—130	- 1.80
„ pisifera filifera , met ijle neerhangende takken }	80—100	- 1.50
	110—130	- 2.—
„ „ plumosa }	60—70	- 0.60
	80—90	- 0.80
	120—140	- 1.—
	140—160	- 1.25
„ „ „ aurea , mooie goudgele Conifeer }	60—70	- 0.80
	80—90	- 1.—
Sciadopitys verticillata , Japansche parasol-den, prachtig, vooral als alleenstaande plant . }	120—140	- 12.—
	180—210	- 20.—
Taxodium distichum , Conifeer met zeer fijn blad, dat 's winters afvalt }	150—160	- 1.75
Taxus baccata , bekende Taxus, mooie breede planten. Deze Conifeer leent zich bijzonder goed tot het vormen van hagen }	60—80	- 0.75
	90—110	- 1.25
	120—130	- 2.—
„ „ aurea variegata , gedrongen groeiende goudbonte variëteit der voorgaande	70—90	- 1.—
„ „ semperaurea }	70—90	- 1.—
	60—70	- 0.80
„ fastigiata (hibernica) , zuilvormige Taxus }	70—80	- 1.—
	90—100	- 1.50
„ „ aurea variegata , zuilvormige goudbonte Taxus }	60—70	- 1.—
	80—90	- 1.25
	90—110	- 1.50
„ „ nova }	70—80	- 1.—
	90—100	- 1.25
„ pyramidalis Overeinderi , piramidevormig }	70—80	- 1.—
	90—100	- 1.50
	110—130	- 2.—
Thuja occidentalis , bekende Conifeer, die veel gebruikt wordt voor het planten van heg- gen, waarvoor ze dan ook meer dan eenige andere plant geschikt is, daar zij, naar verhouding, weinig onderhoud vordert en prachtig ondoordringbare hagen vormt }	70—80	- 0.80
	100—120	- 1.—
	130—150	- 1.20
	160—180	- 1.50
„ „ Lobbi semperaurea , goudgeel }	70—80	- 0.80
	140—150	- 1.75
„ „ lutea , goudgeel }	80—90	- 1.—
	90—100	- 1.50
„ „ Standishi }	150—160	- 2.25
„ „ Vervaeneana }	110—120	- 1.25
„ „ Wareana aurea , geel }	80—100	- 1.—
	100—120	- 1.25
	120—140	- 1.50
Thuyopsis borealis glauca }	120—140	- 1.60
„ dolobrata }	70—80	- 1.—
	80—90	- 1.25
	90—100	- 1.50



Vaste Planten.

Gebruik en behandeling van Vaste Planten.



Border in de Kweekkerij.

I. Gebruik.

Hoewel het gebruik van vaste planten in de laatste jaren in ons land beslist toenemende is, zijn ze toch nog niet zoo algemeen bekend, dat enkele technische aanwijzingen in mijn catalogus overbodig zouden zijn.

In de eerste plaats zij er op gewezen, dat vaste planten zich in den regel niet leenen tot het vormen van bloemperken, zooals men dat met potculturen en bolgewassen gewend is. Eerste eisch bij het gebruik van vaste planten is dat men zich aan het terrein aanpasse. Men zette ze langs heggen, tusschen of aan den voet van heestergroepen, of wel in kleine groepjes van eenige van één soort bij elkaar in het gazon.

Hun groote verscheidenheid in hoogte, bloeitijd, kleur, enz. verhoogt in niet geringe mate hun bruikbaarheid in tuinen en parken. Vanaf de twee en een halve meter hooge Eremurus-soorten tot de kleine kruipende rotsplantjes toe, vindt men ze in nagenoeg iedere hoogte, waardoor ze zoowel kale stammen en leelijke schuttingen, als lage steengroepen kunnen maskeeren. Er is geen tijd van het jaar, waarin men niet vaste planten in bloei kan treffen; zelfs in sneeuw en vorst zullen planten als Adonis en Kerstroos nog bloemen dragen. En er is geen zoo ongunstige plaats te vinden of de een of andere vaste plant houdt het er nog wel uit; een heele reeks van rotsplanten gedijt het best op schralen grond in felle zon; een plant als Funkia verdraagt de donkerste schaduwplaatsen; verschillende planten groeien slechts in moeras of wel geheel of gedeeltelijk in het water. Ten dienste mijner lezers geef ik op bladzijde 18 eenige lijstjes van planten voor zoo'n speciale standplaats geschikt. Hun beschrijving en prijs vindt men verderop in den catalogus.

Nog een voordeel bieden de vaste planten: men kan ze vereenigen tot zoogenaamde „borders,” de vroolijke altijd bloeiende vasteplanten-randen. Achteraan langs een heg of schutting komen de hoogste, meer naar voren

toe geleidelijk lagere; die planten zijn tevens zoo geschikt, dat vroeg- en laatbloeiende gelijkelijk zijn gemengd, zoodat het geheel den indruk maakt doorlopend in bloei te zijn; terwijl aan de combinatie van kleuren natuurlijk bijzondere aandacht is gewijd. Men is zeker den geheelen zomer tot laat in den herfst vanuit de serre op frischbloeiende planten het uitzicht te hebben. Het spreekt vanzelf dat de samenstelling van een border groote kennis der planten vereischt. Sinds jaren belast ik mij hiermede gaarne ten dienste mijner cliëntèle, zonder eenige extra-kosten. Wil men een border samengesteld hebben, dan bedenke men echter, dat de meeste zomerbloemen volop zon noodig hebben, en dat ook vaste planten ruimte innemen. Een verzoek om een border te tooveren aan den noordkant van een huis, of een verzoek om een border te ontwerpen, waarvoor niet minstens een breedte van drie meter beschikbaar is, moet op teleurstelling uitloopen.

Tenslotte nog een laatste opmerking omtrent de vaste planten als snijbloemen. De border toch levert ook in dit opzicht al wat men wenschen kan. De meeste vaste planten zijn uitermate geschikt voor versiering binnenshuis en uit een tuin met vaste planten kan men het geheele jaar snijbloemen hebben, zooals de prachtige Delphiniums voor groote vazen, of de teere Anemonen voor taferversiering. Die planten, die voor snijbloemen gebruikt kunnen worden, zijn in dezen catalogus met † voor den naam gemerkt. Bij enkele buitengewoon goede is het buitendien nog eens uitdrukkelijk vermeld.

II. Behandeling.

Hoewel vaste planten niet veel eischen stellen, wat de cultuur betreft, is het raadzaam den grond voor het planten flink diep om te spitten en van meststoffen te voorzien. Indien men vóór den winter plant, moet men ze met een weinig stroo of ruigte voor de felle koude of voor het opvriezen bedekken, met uitzondering van die soorten, welke in den winter het blad behouden, zooals b.v. *Arabis*, *Aubrietia*, *Campanula persicifolia*, enz., daar deze onder de bedekking zouden verrotten. Wil men veel bloemen hebben, dan moet men na een paar jaren weer mesten. Ook vergete men niet, dat daar waar ze in de nabijheid van hoge boomen staan, deze altijd min of meer den grond uitputten.

Behalve eenige uitzonderingen, waarbij dit vermeld is, en waarvan hieronder bovendien nog een lijstje volgt, kunnen alle hieronder aangeboden planten zonder de minste bedekking in den vollen grond overwinteren. Voor den rijkeren bloei van vele soorten, vooral die waarvan de bladeren in 't najaar afsterven, is het goed ze gedurende den winter met een dun laagje blad of stroo te bedekken.

De verzending der vaste planten geschiedt bij open weder in Maart, April en de eerste helft van Mei; voorts in de maanden Augustus en September. De beste tijd van planten is ongetwijfeld in het voorjaar, met uitzondering evenwel van de zeer vroeg bloeiende soorten, die bij voorjaarsplanting het eerste jaar niet zoo rijk zullen bloeien; het tweede jaar zal echter de bloei des te rijker zijn. Ook van deze soorten volgt hier een lijst.

Planten, die 's winters moeten worden gedekt.

Agapanthus.
Antholyza.
Chrysanthemum indicum.
Cyclamen.
Montbretia.
Pentstemon.
Polygala chamaebuxus purp.
Romneya Coulteri.

Planten, die het best in Aug. en Sept. worden verplant.

Adonis.
Anchusa myosotidiflora.
Anemone appenina.
— *nemorosa*.
— *Pulsatilla*.
— *ranunculoides*.
— *sylvestris*.
Arabis alpina.
Aubrietia.
Caltha.
Chrysanthemum
Leucanthemum plenum.
Doronicum.
Epimedium.
Eremurus.
Erica herbacea.
Geranium.
Geum Heldreichi.
Hepatica.
Houstonia serpyllifolia.
Hutchinsia alpina.
Iberis.
Megasia.
Omphalodes.
Papaver.
Phlox amoena rosea.
— *divaricata*.
— *setacea*.
— *verna*.
Pioenen.
Podophyllum Emodi maj.
Polemonium.
Potentilla nitida.
Primula.
Pulmonaria.
Ranunculus aconitifolius fl. pl.
Saxifraga.
Synthyris reniformis.
Tiarella.
Trillium.
Trollius.
Veronica repens.

Rotsplanten.

Acaena Buchanani.
Adonis.
Ajuga reptans.
Alchemilla major.
Alyssum saxatile.
Anchusa myosotidiflora.
Anemone appenina.
— *baicalensis*.
— *dichotoma*.
— *nemorosa*.
— *pulsatilla*.
— *sylvestris*.
Antennaria.
Arabis.
Arenaria.
Armeria alpina.
— *Cephalotes*.
— *Lauchiana*.
Arnica sachalinensis.
Aubrietia.
Campanula carpatica.
— *garganica*.
Centaurea montana.
Cotula squallida.
Cyclamen.
Dianthus.
Genista.
Gentiana.
Geranium gr. fl.
— *nepalense*.
— *sanguineum*.
Geum bulgaricum.
— *Heldreichi*.
— *montanum*.
Gnaphalium.
Gypsophila prostr. rosea.
— *repens*.
Helianthemum.
Hieracium.
Houstonia.
Hutchinsia.
Hypericum fragile.
— *olympicum*.
Iberis.
Inula ensifolia.
Lithospermum prostr.
Mertensia.
Nepeta Mussini.
Nierembergia rivularis.
Omphalodes verna.
Orobus alatus.
— *albus roseus*.
— *varius*.
Oxalis enneaphylla.
Phlox amoena rosea.
— *divaric. Violet Queen*.
— *ovata caroliniana*.

Phlox setacea.
Potentilla nitida.
Primula acaulis.
— *Auricula*.
— *Bulleyana*.
— *Cashmeriana*.
— *rosea gr. fl.*
Saponaria.
Saxifraga.
Sedum.
Sempervivum.
Silene.
Soldanella alpina.
Stachys.
Synthyris reniformis.
Thymus.
Veronica gentianoides.
— *rupestris*.
Vinca minor.
Viola gracilis.

Schaduwplanten.

(Die met * verdragen de donkerste schaduw.)

Anemone nemorosa.
— *sylvestris*.
**Asarum europaeum*.
**Asperula odorata*.
Campanula latifolia.
Convallaria.
Cyclamen.
Dodecatheon.
**Epimedium*.
**Funkia*.
**Helleborus*.
Hepatica.
Lysimachia.
Maianthemum.
Orobus vernus.
Podophyllum.
Polemonium reptans.
Primula acaulis.
— *elatior*.
— *japonica*.
Pulmonaria.
Ranunculus aconitif. fl. pl.
Rodgersia.
Soldanella montana.
Spiraea Aruncus.
Tricyrtus.
Trillium.
Uvularia.
**Vinca*.

Moeras- en Waterplanten.


Planttijd April tot einde Mei.

Die met * plaatse men geheel in het water ter diepte van plm. 50 cm.

Acorus Calamus.
Alisma.
Butomus.
Calla.
Caltha.
Eriophorum.
Glyceria.
**Hottonia*.
**Hydrocharis*.
Iris Pseudacorus.
**Menyanthes*.
**Nuphar*.
**Nymphaea*.
Parnassia.
Ranunculus Lingua.
Sagittaria.
Scirpus.
**Stratiotes*.
Typha.
**Utricularia*.
**Villarsia*.

Gazonplanten- en Siergrassen.

Agapanthus.
Arrhenaterum.
Bambusa.
Bocconia.
Cassia marylandica.
Carex.
Cimicifuga.
Crambe cordifolia.
Echinacea.
Elymus.
Erythrochaete palmatifida.
Eulalia.
Eupatoria purpurea.
Gunnera.
Gyneryum.
Harpalum.
Helianthus.
Heracleum.
Imperata saccharifera.
Inula macrocephala.
Paeonia.
Papaver orientale.
Phalaris.
Polygonum amplex. oxyphyllum.
Rudbeckia lac. Gold. Glow.
Spiraea Aruncus.
— *venusta*.
Stipa.
Telekia speciosa.
Tritoma.



Een kijkje in de Vaste Plantenkweekerij.

In de volgende lijst zijn de nieuwe en meest aanbevelenswaardige soorten onderstreept.

Om de keuze der soorten gemakkelijk te maken, hebben we bovendien bij de meeste planten behalve een beschrijving, bloeitijd en hoogte aangegeven. De hoogte is echter alléén maar bij benadering op te geven, daar dit zeer veel afhangt van den grond waarin de planten komen, terwijl er ook verscheidene planten zijn, die eerst in het 2^{de} of 3^{de} jaar na de planting hun hoogte bereiken. De hoogte is aangegeven in cM. en de maanden waarin de bloeitijd valt door cijfers.

De soorten, welke met een † gemerkt zijn, zijn geschikt voor snijbloemen.

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd	Prijs p. stuk.
Acaena Buchananii , varenachtig, groenblijvend, zodevormend plantje, dat den grond met een mosachtig tapijt bedekt			0.30	† Achillea Ptarmica grandifl. fl. pl. , buitengewoon rijkbloeiend met dubbele witte bloemen, die grooter zijn dan van de vorige	75	7—8	0.20
Acanthus latifolius , met groote bladeren en lange lichtroze bloemaren. Als gazonplant aan te bevelen. Vereischt een lichte bedekking van droog blad in den winter	150	6—8	0.25	† Aconitum autumnale , Herfst-Aconitum met prachtige donker paarsachtig blauwe bloemen	90	9—10	0.15
— spinosus , met groote bladeren en van stekels voorziene stelen	70	7—8	0.30	† — Californicum , bleekblauw	80	7 8	0.15
Achillea Eupatorium , met goudgele vlakke bloemschermen op stevige stengels	85	7—8	0.25	† — Fisheri , met donkergroen blad, dat zoo glanzig is, alsof het steeds met een doorschijnende vloeistof overgoten is. Zij brengt laat in den herfst een korte bloemstengel voort met groote helderblauwe bloemen	50	9—10	0.25
— Eupatorium Parker's var. , de bloemschermen zijn eveneens goudgeel, maar eenigszins gebogen	85	7—8	0.25	† — japonicum , lichtblauw met purper	80	7—9	0.20
† — Millefolium Cerise Queen , met fijn ingesneden bladeren en fraaie kersroode bloemen	50	7—8	0.30	— lycoctonum pyrenaicum , met zwavelgele bloemen	90	8—10	0.25
† — Millefolium Kelwayi , met schitterend donker karmijnroode bloemen	50	7—8	0.30	† — Napellus , met helderblauwe bloemen	100	7—8	0.15
† — Ptarmica fl. pl. , met een menigte dubbele sneeuw witte bloempjes op stevige stengels	60	7—8	0.20	† — Napellus album , wit. Deze en voorgaande schoone sierplanten worden ook „Monnikskap” genoemd	90	7—8	0.15
				† — Napellus bicolor (variegatum), blauw met wit	90	7—8	0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Anemone japonica Honorine Jobert (alba) wit. Gewone witte Japan- sche Anemone. Zeer losse en ele- gante groeiwijze		9—10	0.20	Anemone ranunculoides. Goudgeel	20	4—5	0.20
— japonica Königin Charlotte. Met grootte halfdubbele bloemen, die op lange stengels zijn gezeten en aan de achterzijde lila-rood gekleurd zijn		9—10	0.20	— rivularis. Witte bloemen, buiten- kant lila	30	7—8	0.30
— japonica Kriemhilde. De schaal- vormige halfdubbele bloemen zijn van een opvallend helder roode kleur		9—10	0.45	— sylvestris. Wit	40	4—5	0.25
— japonica Lady Ardilaun. Groot- bloemig wit met stevige bloem- bladeren		9—10	0.20	† — sylvestris fl. pl., prachtige dub- bele zuiver witte bloemen op lange stengels	45	5—6	0.35
— japonica Lord Ardilaun. De bloemen zijn groot, stevig en half- dubbel, van binnen sneeuwwit en aan de buitenzijde violetachtig. Zij bloeit rijk, heeft een gedrongen groeiwijze en donkergroene bla- deren		9—10	0.25	Anemonopsis macrophylla. Uit Japan ingevoerde vaste plant, met kom- vormige bloemen van een violette kleur. Deze prachtige plant verlangt een beschaduwde standplaats . . .	75	8	0.75
— japonica Loreley. Nieuwe va- riëteit met halfdubbele, schaalvor- mige bloemen van een lila-rose kleur, iets donkerder dan Königin Charlotte		9—10	0.25	Antennaria tomentosa candida. Kruipend plantje met glanzend wit blad, dat vooral in mozaïekvakken een schoon effect maakt		9	0.15
— japonica Mont Rose. De bloemen dezer variëteit zijn goed gevuld en bereiken een middellijn van 9 cm. De kleur is zacht-rose, terwijl de uiteinden der bloembladeren even- als die der bloemknoppen karmijn- rose zijn		9—10	0.25	Anthemis cupiana, m. witte bloemen			0.25
— japonica Prinz Heinrich. Deze heeft een lage, gedrongen groei- wijze en geeft grootte halfdubbele, donkerroode bloemen. De don- kerste der Herfst-Anemonen . . .		9—10	0.25	† — Kelwayi, met goudgele bloemen en fijn groen	50	6—9	0.30
— japonica rosea superba, grootbl. rose		9—10	0.25	† Anthericum liliastrum giganteum. Met lange stengels, waarop mooie grootte zuiverw. lelieachtige bloemen	90	6—7	0.30
— japonica rubra. Oorspronkelijke soort met donkerroode bloemen, waaruit de variëteiten zijn ontstaan		9—10	0.25	† — liliastrum major. De prachtige zuiverwitte bloemen dezer plant doen veel denken aan die der be- kende witte Lelies. Zij groeit het best in een eenigszins zandigen, humusrijken grond	80	5—6	0.15
— japonica Whirlwind. Deze ver- scheidenheid kenmerkt zich door grootte zuiver witte ingesneden bloemen, welker bloembladeren eenigszins gedraaid zijn		9—10	0.20	† Antholyza paniculata major. De bloemen en bladeren dezer plant hebben veel overeenkomst met de Montbretia's, maar de groeiwijze is forscher. Heeft eenige bedekking noodig.		6—7	0.20
Anemone nemorosa Robinsoniana. Prachtige grootbloemige voorjaars- Anemoon, met helder lilakleurige bloemen. Men plante deze liefst in het najaar. (Zie afb. blz. 22.) .	15	4—5	0.25	† Aquilegia Helenae. Aanbevelens- waardige Akelei, welke zich krach- tig ontwikkelt en rijk bloeit. Bloem donkerblauw met wit hart . . .	60	6—7	0.30
— Pulsatilla. De grootte paars- blauwe bloemen verschijnen reeds voor de bladeren	20	3—5	0.20	† — hybriden. De Aquilegia's be- hooren tot de schoonste voorjaars- bloemen. Zij komen in verschil- lende kleuren-nuances voor . . .	60	5—6	0.25
— Pulsatilla alba. Witte variëteit. Zij komt het best tot haar recht op een zonnige standplaats en op eenigszins kalkachtigen grond . .	20	3—4	0.20	† — nivea grandiflora, deze is zuiver wit en bloeit iets later dan de andere Aquilegia-soorten	60	6—8	0.20
— Pulsatilla rubra. Nieuwe zeld- zame, bruin-roode variëteit . . .	20	3—4	0.25	† Arabis alpina, lief alpenplantje met fraaie witte bloemen	15	4—5	0.15
				† — alpina fl. pl. De dubbele zuiverwitte bloemen zijn op stevige losse stengels gezeten en gelijken veel op zomerviolieren. Deze plant bloeit reeds in April en is daardoor onschatbaar voor bouquetwerk. Het is eigenaardig, dat deze dubbele variëteit veel langer en steviger bloemstengels geeft dan de be- kende enkele	25	4—5	0.20
				† — alpina fol. var. Variëteit met zilverbonte bladeren, die ook dik- wijls gedurende den winter haar kleur behouden.	15	4—5	0.20
				— alpina nanacompacta grandiflora. Deze variëteit onderscheidt zich door een lage gedrongen groeiwijze en de zeer grootte sneeuwwitte bloemen	15	4—5	0.25

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Anemone Pulsatilla.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Arabis aubrietoides , met purperen bloemen	20	4—5	0.50
— caucasica , laaggroeiend met witte bloempjes	10	4	0.50
— Sturii , laagblijvende plant met witte bloemen	10	5—8	0.25
Arenaria caespitosa , helder groene zoden vormend; dit kruipende plantje is zeer geschikt voor mozaïekvakken		6—8	0.25
— rotundifolia , aardig witbloeiend kruipend rotsplantje		7—8	0.35
Armeria alpina , alpenplantje met roode bloemhoofdjes, welke op stevige stengels zijn gezeten. Dichte zoden vormend, kan het zeer goed voor randen worden gebruikt . .	15	6—7	0.20

† Armeria Bees' Ruby . NIEUW! Prachtige verbetering van de A. Cephalotes, met groote helderroze bloemhoofdjes. Als snijbloem voor kleine vaasjes bijzonder aan te bevelen	60 70	6—7	0.45
--	----------	-----	------

Armeria Cephalotes splendens , helderroze	40	6—7	0.25
— Lauchena alba , wit	20	6—7	0.20
— „ rosea , mauve	20	6—7	0.20
— „ splendens , helrose	20	6—7	0.20
Arnebia echioides . De in menigte verschijnende heldergele bloemen, vertoonen bij het ontluiken donkerbruine vlekken, die later weer verdwijnen	20	5—9	0.85
Arnica sachalinensis . Nieuwe uit China ingevoerde plant met groote heldergele bloemen	40	5—6	0.35
Arrhenaterum bulbosum fol. var. Bont siergras. Zoowel geschikt voor potcultuur als voor den vollen grond	25		0.25
† Artemisia lactiflora . Zeer schoone plant met rechtopstaande bloemstengels met een menigte fijne welriekende roomwitte bloemen. Bloeit in een tijd, dat bloemen schaarsch worden	150	9—10	0.25
Asarum europaeum . Bizonder geschikt voor beschaduwde plaatsen			0.15
† Asclepias incarnata . De bloemen van deze plant zitten in schermen bijeen en hebben een donkerroze-roode kleur	75	8—9	0.20
†— tuberosa , prachtig oranjekleurig	60	8—9	0.25
Asperula odorata , Lieve Vrouwen-bedstroo. Bloeit met witte bloemen. Goede schaduwplant	20	6	0.20
Asphodelus tauricus . Met fijn blad en lichtgele bloemen	75	6—7	0.30

VOORJAARS-ASTERS.

Aster alpinus , lilablauw	20	5—6	0.15
— alpinus albus , zuiver wit	20	5—6	0.15
— „ Gloire d'Orleans , grootbloemig lilablauw	20	5—6	0.40
— „ himalaicus . Bloeit zeer vroeg met groote zuiver blauwe bloemen	20	5	0.35
— alpinus Nancy Perry , NIEUW! Laagblijvende Aster met zeer mooie lila bloemen	20	5—6	0.55
— alpinus Nixe . Variëteit met fraaie, violetblauwe bloemen en klein geel hart	20	6—7	0.25
†— alpinus superbus . Zeerrijk bloeiende lichtblauwe variëteit	20	5—6	0.35

†HERFST-ASTERS.

(8—10)


Het is zeer aan te bevelen de Herfst-Asters te planten langs opgaand hout of heesterparken, of in de voorste regels er tusschen. Niet alleen vroolijken ze op deze wijze den tuin laat in het najaar op, maar leveren ook een uitmuntend materiaal voor bouquets.

Aster acris . Met stervormige, lila-roode bloemen	75	8—9	0.25
— Amellus Beauté parfaite . Met donkerviolette bloemen	70	8—9	0.45
— Amellus cassubicus . Een der mooiste Amellus-soorten, laaggroeiend en bizonder rijkbloeiend met fraaie paarse bloemen . . .	40 à 50	8—9	0.30
— Amellus Gruppenkönigin . De plant is sterk vertakt en geeft een menigte lavendelblauwe bloemen .	35	8—9	0.45
— Amellus King George . Nieuw. Extra grootbloemige variëteit met groote trossen blauwachtig violette bloemen, centrum goudgeel . . .		8—9	1.20
— Amellus Madame E. Gauguin . Nieuwigheid met rechtop groeiende, goed vertakte bloemstengels en schoone roode bloemen	45	8—9	0.75
— Amellus Mad. Polchauvin . Prachtige groote roode bloemen; zeer rijkbloeiend	60 80	8—9	1.—
— Amellus Mrs. Perry		8—9	0.35
— Amellus Perry's Favourite . Met mooie rose-lila bloemen, verdient aanbeveling		8—9	0.25
— Amellus Preciosa . Met schoon gevormde bloemen van donkerpaarse kleur		8—9	0.30
— Amellus rubellus . De rijkvertakte planten bloeien met schitterend lila-rose bloemen	60	8—9	0.25
— Amellus Rud. Goethe . Zonder twijfel een van de mooiste Amellus-soorten. Bloeit bijzonder rijk met groote lavendelblauwe bloemen. De bloemen bereiken een doorsnede van circa 6 cm.		8—9	0.65

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Aster Amellus Schöne von Ronsdorf.				Aster Blanca. Nieuw! kleinbl. wit .	120	9—10	0.50
De groote bloemen zijn ongeveer 6 cM. in doorsnee en van een mooien vorm. De kleur is prachtig lila-rose	45	9—10	0.45	— Climax. Deze Aster bloeit zeer laat en tevens zeer rijk met groote lavendelblauwe bloemen en stroogeel hart	150	10	0.25
— Amellus Wienholtzi. Fraaie variëteit met lichtrose bloemen. Van de rose Amellus-soorten is deze nieuwe variëteit de lichtst gekleurde. . .	50 60	8	0.55	— cordifolius Ideal, licht mauve .	100	9—11	0.30
— Beauty of Colwall. Deze opvallende nieuwe Aster heeft zuiver dubbele bloemen van een schoone lavendelkleur; zeer rijkbloeiend. Eén stengel levert reeds een bouquet op zichzelf op. Deze bekroonde nieuwigheid is de eerste volkomen dubbele Aster	120	8—9	0.25	— cordifolius magnificus, donker lila	120	9—11	0.35
				— cordifolius Photograph. Met groote trossen kleine helderlila bloempjes. Bijzonder geschikt voor bouquets	80	9—11	0.50
				— diffusus Datchi. Bloeit zeer laat met kleine witte bloempjes . . .	100	10—11	0.25
				— ericoides Ophir. Met zacht rose bloemen	90	10	0.30



Aster Beauty of Colwall.

— Glory of Colwall, prachtige nieuwe soort met een massa groote dubbele zacht lila-kleurige bloemen op stevige stengels	140	9—10	0.30
— hybridus Lavendel, met lavendelblauwe bloemen . .	150	9—10	0.30
— hybridus Lutetia, rijkbloeiende Aster met groote losgevormde bloemen van een zacht lila rose kleur . . .	80	9—10	0.30
— hybr. Mr. S. A. de Graaff, een rijkbloeiende nieuwe variëteit met witte bloemen .	120	9—10	0.35
— ibericus Ultramarin. Bizonder schoone nieuwe Aster, met een menigte schitterend donkerpaars gekleurde bloemen. Een der beste voor snijbloemen	60	8—9	0.30
— laevis pulcherrimus, lila .	200	9—10	0.30
— Lustre. Groote halfdubbele helderrose bloemen; rijkbloeiend	100	9—10	0.35
— Maidenhoud. Witte vorm van ericoides	120	9—10	0.50
— Mesa grande speciosus grandiflorus, zie <i>Erigeron</i> .			
— Miss Willmott. Halfdubbele variëteit met helderblauwe bloemen	90	9—10	0.40
— Mrs. Berkeley, zeer laag-groeiend, wit, kleinbloemig .	30	9—10	1.50
— Mrs. Perry improved. NIEUW!		9—10	0.55
— Mrs. Frank Brazier. Helderblauw op lange stelen . .	120	9—10	0.30
— Nancy Ballard. Bloeit zeer lang vanaf eind September met een menigte groote dubbele purper-lila bloemen . .	90	9—10	0.35
— Novae-Angliae Lill Fardell, grootbloemig rose	125	9—10	0.25
— Novae-Angliae Mrs. S. T. Wright. De bloemen zijn fraai rose-purper	150	9—10	0.40

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Aster Novae-Angliae Ryecroft Pink. Een der beste Asters met groote bloemen van een mooie rose kleur	130	9—10	0.30
— Novae-Angliae Ryecroft Purple. Grootbloemig met prachtig purper- blauwe bloemen	130	9—10	0.30
— Novae-Belgii Edna Mercia, helderrood	120	9	0.25
— Novae-Belgii Feltham Blue. Zeer rijkbloeiend met geel centrum. De stevige, rechtopstaande stengels vertakken zich vanaf den grond. De plant is een en al bloem van boven naar beneden	120	9	0.35
— Novae-Belgii Finchley White. Een der beste witte Herfst-Asters.	120	9	0.30
— Novae-Belgii Well's White. Grootbloemig wit		9	0.50
— Novae-Belgii White Queen, zuiver wit	100	9	0.30
— paniculatus W. J. Grant. Groote takken met kleine lichtlila bloemen	100	9—10	0.30
— Peggy Ballard. Een „Beauty of Colwall” in het klein. De stevige stengels dragen een groote menigte lila-rose bloemen die eerst geheel dubbel zijn, doch langzamerhand halfdubbel worden. In Sept. 1910 te Londen bekroond	90	9—10	0.35
— Perry's Blue	100	9—10	0.40
— „ Mauve	100	9—10	0.40
— „ Pink Improved, rose	100	9—10	0.50
— Shorti, lila	100	9—10	0.25
— St. Egwin. Deze nieuwe sterk vertakte Aster heeft roseroode platte bloemen, welke 3½ cM. in door- snede zijn	100	9—10	0.35
— Thomsoni. Zeer aanbevelens- waardige soort, die reeds in Juli begint te bloeien en onafgebroken tot in Nov. doorbloeit met groote zachtblauwe bloemen op lange stelen. Een der beste zomerbloeiende Asters	50	7—10	0.55



Aster Thomsoni nanus.

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Astilbe Grandis. De stengels dragen 60—75 cM. lange witte bloem- pluimen	180	7—8	0.25

† **Astilbe Grandis rosea magnifica**


Nieuw. De geheele habitus der
plant komt veel overeen met de
bekende A. Grandis, die een 10-
tal jaren geleden uit China is
ingevoerd, waarvan echter het
wit der bloem niet helder genoeg
uitkomt. Van deze nieuwe door
mij gewonnen variëteit, hebben
de bloemen, die ook groter zijn
dan die der A. Grandis, een prach-
tige zuiver rose kleur. Getuig-
schrift v. Verdienste Aug. 1916.

Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
130	7—8	0.55

Aster Thomsoni nanus, groeit lager en bloeit rijker dan de vo- rige. Zeer geschikt voor rots- partijen en steengroepen . . .	30	7 10	0.55
Aster tradescantia, wit	100	9—10	0.30
— vimineus, wit	100	9—10	0.30
† Astilbe Davidii, zeer decoratieve plant, afkomstig uit China. De ko- lossale bloemtrossen hebben een donker purperroode kleur	180	8—10	0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

*Astilbe Betsy Cuperus.*

† ASTILBE HYBRIDA.

Vele van onderstaande Astilben zijn in de laatste jaren in mijne kweekery ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten met Davidii-Astilben. Uit 20.000 zaailingen zijn een 20-tal afgezonderd en doorgekweekt, waarvan er 4 een Certificaat eerste klasse en 7 een Getuigschrift van Verdienste verworven hebben. Deze Astilben munten niet alleen door hun kleur maar vooral ook door hunne bloeiwijze uit. Sommige hebben rechtopstaande meterlange stengels, andere weer losse overhangende trossen. Op deze collectie moet voor tuinversiering en snijbloemen bijzonder de aandacht worden gevestigd.

†Astilbe hybr. Anneke Schimmelpenninck, met lage gedrongen tros.

De bloemen zijn wijnrood. Een zeer aparte tint	100	7—8	0 85
† — hybr. <u>Avanlanche</u> , met een overvloed van sneeuwwitte bloemtrossen op lange stengels			0.30

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
†Astilbe hybrida <u>Betsy Cuperus</u> . De fraai afhangende tros, die minstens 50 cM. lang wordt, prijkt des zomers gedurende eenige weken met een schat van witte bloemen met rose hart. De helderrose kleur heeft echter de overhand	150	7 8	0.65
†Astilbe hybr. <u>Brunhilde</u> . De vederachtige bloemtrossen hebben een crème rose kleur	120	7—8	0.30
† — hybr. <u>Ceres</u> , met lila bloemtrossen aan rijkvertakte stengels	100	7—8	0.35
† — hybr. <u>Freule H. van den Bosch</u> , met fijn loof en rechtopstaande stengels. De talloze bloemen hebben een schitterend roode kleur, tot dusver geheel onbekend onder de Astilben. Getuigschrift v. Verdienste, 24 Aug. 1916	100	7—8	0.65
— hybr. <u>Gloria</u> , met dichte vederachtige donkerrose bloemtrossen. Getuigschrift 1e klasse, Amsterdam 8 Juni 1915	60	7—8	0.35
† — hybr. <u>Gruno</u> . Een van de mooiste snijbloemen. Losse tros met zachtrose bloemen	120	7—8	0.35

†Astilbe hybr. <u>Jo Ophorst</u> . Hoogst elegante lange tros met donker purperroode bloemen. Certif. 1e Klasse. Aug. 1916	150	7 8	0.65
--	-----	-----	------

†Astilbe hybr. <u>Koning Albert</u> . Deze Astilbe, die men waarlijk een koning onder de Astilben kan noemen, bezit meer dan 2 M. lange rood aangelopen stengels, waarvan de tros alleen reeds een lengte van 1 M. bedraagt. De bloemen zijn groot en zuiver wit. Wij hebben deze plant zoo genoemd uit sympathie voor de heldhaftige figuur van Koning Albert van België. Certif. 1e Klasse Aug. 1916	200	7—8	0.85
--	-----	-----	------

†Astilbe hybr. <u>Lachskönigin</u> , licht zalmkleurig		7—8	0.35
† — hybr. <u>Lumineux</u> . Met groote karmijnroode bloemtrossen	100	7—8	0.45

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Astilbe hybr. Marguérite Gravin van Regteren Limpurg. Het blad dezer nieuwe soort doet eenigszins denken aan dat van A. Grandis. De bloemstengels zijn buitengewoon krachtig en beginnen zich reeds dicht boven den grond te vertakken en bloemtrossen te vormen, zoodat de tros zelf ruim 1 M. lang is. De zeer fijne franjeachtige bloemen zijn helderrood met donker lila getint. Zeer decoratieve plant . . .	150	7-8	0.55	† Astilbe hybr. Rutillans , karmijn-kleurige vederachtige bloemtrossen		7-8	0.35
† - hybr. Maria van Leeuwen. Vrij hoog groeiende variëteit met buitengewoon lange trossen, welke kleur rose is met een mat lila weerschijn	180	7-8	0.85	† - hybr. Salland. Ontstaan uit een kruising met A. Davidii. Zij heeft denzelfden groei als deze laatste, echter zijn de stengels veel krachtiger en geven losse roode bloemtrossen. Een voortreffelijke snijbloem	180	7-8	0.45
† - hybr. Marie Gravin van Limburg Stirum. De bloem heeft dezelfde kleur als die van A. hybr. Moerheimi, maar de trossen zijn langer	190	7-8	0.80	† - hybr. Solférino. Bloemtrossen zijn schitterend purper	120	8	0.35
				† - hybr. Tamarix , met ijle donkerroode stengels en roode bloempjes, waardoor de trossen aan takken van Tamarix doen denken	60	7-8	1.15
				† - hybr. Venus , vroegbloeiend; komt in groeiwijze met „Ceres” overeen, doch is wat hooger. Ze heeft echter schitterend purperrose bloemtrossen	75	7-8	0.35
				† - hybr. Vesta , licht lilarose bloemtrossen	75	7-8	0.35
				† - hybr. Walküre , helderroose met zalmkleurige weerschijn	75	7-8	0.35
				† - hybr. W. E. Gladstone , munt uit door losse stevige bloemstengels en buitengewoon forsche groeiwijze. De witte bloemen zijn zeer mooi		7-8	0.30
				† - rivularis. De bloem lijkt veel op die van Spiraea's, doch is grooter. Ze groeit het liefst in vochtigen bodem	100	7-9	0.25
				† - rivularis major gigantea . . .	150	7-9	0.50
				† - Thunbergii delicata , nieuwigheid met lange trossen en zuiver zacht-rose bloemen	150	7-9	0.55
				† - Thunbergii Moerheimi. Deze in mijne kweekerij ontstane Nieuwigheid is een belangrijke verbetering der A. Thunbergii. Zij is een der schoonste Astilbes en bloeit met zeer groote trossen van kleine zuiverwitte bloemen	80	7-9	0.30
				Astrantia carniolica rosea , bloeit met mooie helderroose bloemen . .	60	7	0.35
				AUBRIETIA.			
				Deze kunnen tot de mooiste en dankbaarste rotsplanten worden gerekend. Ze nemen elken grond voor lief en vroeg in April en Mei zijn de lage kruipende plantjes met een massa bloemen overdekt, in de meest verschillende kleuren-nuances tusschen rose en paars.			
				Aubrietia Crimson King , levendig karmijnrose		4-5	0.35
				— deltoidea , bloeit zeer vroeg met helderblauwe bloemen. Laaggroeiend.		4-5	0.35
				— Dr. Mules. Schitterend violet gekleurde bloemen		4-5	0.35
				— Fire King , diep karmozijn . . .		4-5	0.35
				— graeca , heeft veel overeenkomst met A. deltoidea, alleen zijn de bladeren en bloemen iets grooter; de laatste hebben een violetblauwe kleur		4-5	0.30
† Astilbe hybr. Meta Immink. Met dichte rose bloemtrossen. Zeer aanbevelenswaardig. Getuigschr. v. Verdienste Aug. 1916 . . .	150	7-8	0.65				
† Astilbe hybr. Mevrouw Annie van Laren. Lage gedrongen planten met groote dichte lilarose pluimen	60	7-8	0.85				
† - hybr. Moerheimi. Enkele jaren geleden in mijne kweekerij ontstaan uit een kruising van A. Davidii met een andere hybride; met denzelfden krachtigen groei als eerstgenoemde. De elegante rechte bloemstengels bereiken een hoogte van 70 cm., de kleur der bloemen is roomkleurig wit. Zonder twijfel een der beste en fraaiste nieuwigheden der laatste jaren	150	7-8	0.35				
† hybr. Peach Blossom. Zeer fijne perzik-bloesem kleur, dicht gevulde trossen; een der beste soorten om te trekken	50	6-7	0.30				
† - hybr. Prinses Juliana. De lange stengels vormen losse en sierlijke trossen, welke helder karmozijn-rose gekleurd zijn	100	7-8	0.35				
† Astilbe hybr. Prof. van der Wielen. De reusachtige sterk-vertakte stengels dragen tallooze fijne zuiverwitte bloempjes . .	180	7-8	1.20				
† Astilbe hybr. Pyramidal. Met sterke zuiverwitte bloemtrossen .		7-8	0.30				
† - hybr. Queen Alexandra. Zacht-rose met dicht gevulde bloemtrossen. Deze soort is bijzonder geschikt om te trekken	50	6-7	0.30				
† - hybr. Rosa Perle. Dicht pyramide vormige stengels met zacht-rose bloemen	60	8	0.30				

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.			
Aubrietia Hendersoni , paarsrood		4—5	0.35	Calamintha grandiflora , blauw		6—7	0.55			
— H. Marshall , donker purper-violet		4—5	0.35	Calimeris incisaefolia alba	50	5—8	0.40			
— Lavender . Deze nieuwe Aubrietia onderscheidt zich door prachtig lavendel-blauwe bloemen. Eén van de mooiste		4—5	0.35	— incisaefolia rosea	50	5—8	0.30			
— Moerheimi . Deze prachtige nieuwe variëteit, in mijne kweekerij ontstaan, onderscheidt zich van de voorgaande niet alleen door de grootte van bloemen, maar ook door de mooi zacht mauve kleur		4—5	0.35	Calla palustris , Oeverplant, met witte bloemen als een Aäronskelk	30	5—6	0.15			
— Mrs. E. M. Crosfield		4—5	0.35	Calluna , zie onder „Boomen en Heesters."						
— Mrs. Lloyd Edwards . Grootbloemig met schitterend donker purperblauwe bloemen		4—5	0.45	Caltha palustris , Dotterbloem. Vroegbloeiende gele moerasplant	25	4—5	0.15			
— Prichard's A 1 , donker violet		4—5	0.35	— palustris fl. pl. Dubbele dotterbloem; moerasplant met groote dubbele goudgele bloemen	25	4—5	0.15			
— Purper Teppich , purper		4—5	0.35	<div>Caltha palustris Hortulanus Budde NIEUW. Eenige jaren geleden ontving ik van den Heer J. K. Budde, hortulanus te Utrecht, een pakje zaad van een half dubbele Caltha palustris, die ik toen in den handel gebracht heb onder den naam van C. palustris semiplena. Onder de zaailingen bevond zich een enkele plant die uitmuntte door enorme bloemen, gelijkende op een Cactus Dahlia welke door mij onder bovenstaanden naam werd doorgekweekt</div>				25	4—5	1.—
— Purple robe , purperrood		4—5	0.35							
— tauricola . Zeer laaggroeiend met donkerblauwe bloempjes		4—5	0.35	Caltha palustris monstrosa plena . Zeer grootbloemig	25	4—5	0.35			
— Wallacei , mauve		4—5	0.35	— palustris nana plena . Laaggroeiende dubbele Dotterbloem.	25	4—5	0.20			
Bambusa Metake . Prachtige winterharde bamboeplant met groote donkergroene ingesn. bladeren. Ze heeft een oostersch aanzien	180		0.85	— palustris semiplena , halfdubbele Dotterbloem; eene groote verbetering van de enkele variëteit. De vorm is sierlijker dan die der dubbele.	25	4—5	0.50			
— nana	60		0.50	— polypetala , NIEUW! Met reusachtige bladeren en groote bloemen; bloeit vroeg in het voorjaar	25	4	0.25			
— scriptoria	100		0.55	Calystegia pubescens fl. pl. , met mooie gevulde rose bloemen	200	5—8	0.15			
— viridi striata	120		0.55	CAMPANULA. Van de honderde soorten en variëteiten der Campanula's of Klokbloemen heb ik alleen diegenen opgenomen, die werkelijk voor onze Hollandsche tuinen geschikt zijn.						
Baptisia australis . Met violet-blauwe vlinderbloemen	100	5—7	0.30	Campanula Burghalti , licht blauw	30	7—8	0.30			
† Barbarea vulgaris fl. pl. Met sterkvertakte trossen, waaraan een menigte kleine dubbele goudgele bloemen	40	6	0.35	— carpatica compacta , met blauwe bloemen	20	7—8	0.30			
Betonica grandiflora superba . Deze vaste plant heeft lange stengels met schoone roode bloemen.	30	6—7	0.25	† carpatica Isabel , bloeit zeer rijk met groote platte levendig donkerblauw gekleurde bloemen	30	7—9	0.35			
Bidens dahlioides . De bladeren zitten in een rozet bijeen; de lila bloemen gelijken op enkelbloemige Dahlia's	60	6—9	0.35	— carpatica Riverslea , met groote donkerblauwe bloemen	25	7—8	0.35			
† Bocconia jap. (cordata) . Zeer schoone decoratieplant met grijs-groene bladeren, waarboven de sierlijke stengels met licht rose bloempluimen zeer schoon uitkomen. Alleen of in een groep van 3 of meer planten bij elkaar in een gazon geplaatst, maakt deze plant zeer veel effect. Zij verlangt een lichte bedekking in den winter.	150	7—9	0.20	† — carpatica White-Star , eene prachtige nieuwigheid met groote schaalvormige, zuiverwitte bloemen	30	7—9	0.30			
† — microcarpa . De bladeren zijn aan de onderkant geheel wit	180	7—9	0.25	— garganica , kruipende soort met blauwe bloemen met wit oog		5—7	0.35			
Buddleia variabilis var. magnifica , zie onder „Boomen en Heesters."				— glomerata acaulis , met donker-violette bloemen	25	7—8	0.25			
Bupthalmum salicifolium . Bloeit zeer rijk met een menigte goudgele bloemen. Het blad is smal als van een wilg	40	6—10	0.50							
Butomus umbellatus , „Zwanebloem" oeverplant met prachtig purperroode bloemschermen			0.15							

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Campanula macrantha alba.

Campanula lactiflora.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Campanula glomerata alba. Nieuwe zeldzame variëteit met groote sneeuw witte bloemen	80	7—9	0.40
† — glomerata dahurica , deze heeft stevige bloemstengels met violet-blauwe bloemen	50	7—9	0.30
† — glomerata lilacina , lila	50	7—8	0.40
† — glomerata superba , donkerviolet, laatbloeiend	40	7—8	0.30
— (Platycodon) grandiflora . Met groote blauwe bloemen	45	7—9	0.20
— (Platycodon) grandifl. Mariesi . Deze variëteit kenmerkt zich door een gedrongen groeiwijze, terwijl de bloemen grootter zijn dan van <i>C. grandiflora</i>	20	7—9	0.20
— Kewensis . Rijkbloeiend met kleine bloemen; laag	15	6—7	0.55
† — lactiflora . Kolossale bloemtrossen in verschillende nuances van lichtblauw. Wanneer men deze plant een paar jaren op dezelfde plaats laat staan, bereiken de bloemstengels dikwijls een hoogte van 1½ à 2 Meter	120	6—8	0.25
† — macrantha . Een der schoonste Campanula's met groote violet-blauwe bloemen. Deze plant heeft bovendien het voordeel, dat zij goed in de schaduw groeit, zelfs onder hooge boomen, waar andere bloemen gewoonlijk mislukken	75	6—7	0.25

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Campanula macrantha alba. Buitengewoon rijkbloeiend met een menigte groote sneeuw witte klokken; prachtige snijbloem	80	6—7	0.30
† — persicifolia , bloeit van Juni-Sept. met groote wijde klokken	80	7—8	0.20



Campanula persicifolia „Moerheimi.”

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Campanula persicifolia fl. albo pl. , met gevulde, witte bloemen . . .	60	7—8	0.30	Centaurea macrocephala , met groote gele kogelvormige bloemen op dikke stijve stengels. Prachtige vreemde decoratieplant	90	7—8	0.25
† — persicifolia „Moerheimi.” Deze prachtige Campanula, in mijne kweekerij ontstaan, is een der schoonste vaste planten.				— montana alba , wit	50	5—6	0.20
De stengels zijn dicht met bloemen bezet, die loodrecht op de stengels staan, zoodat men de volle bloem zien kan. De enorm groote dubbele bloemen, die een middellijn van 7 à 8½ cM. hebben, zijn plat gevormd als een roos, en de kleur is zoo prachtig sneeuwwit als men zelden bij bloemen aantreft. Zoo- wel voor decoratiedoeleinden als voor snijbloemen kan deze plant dus ten zeerste worden aanbevolen. De afgesneden bloemen blijven 8 dagen goed	50	6—7	0.30	— „ carnea , lila	50	5—6	0.25
† — persicifolia Sperling , blauwachtig wit	60	7—8	0.30	— „ grandiflora , grootbl.	50	5—6	0.30
— Portenschlageana , dichte pollen met donkerblauwe bloemen	30	7	0.30	— „ Lady Florence Hastings , wit	50	5—6	0.30
— turbinata . Rijkbloeiende laag- groeiende soort met groote licht- en donkerblauwe bloemen	25	6—9	0.40	— „ lilacina	50	5—6	0.30
— van Houttei . Zeer schoone hy- bride met buitengewoon groote donkerblauwe bloemen	60	7—9	0.35	— „ rosea , rose	50	5—6	0.30
				— „ violetta , violet	50	5—6	0.30
				Deze zijn variëteiten van de over- blijvende alpen-korenbloemen. Zij bloeien nagenoeg den geheelen zomer			
Cardamine pratensis fl. pl. Dub- bele Pinksterbloem met zacht lila bloemen. Groeit het best op vocht- ige of halfbeschaduwde plaatsen	30	6—7	0.35	— pulchra major , met purper-rose bloemen	40	8—9	0.40
Carex japonica fol. var. , bont sier- gras	25		0.40	— ruthenica . Eene uit Rusland in- gevoerde hooggroeiende soort. Ze heeft diep ingesneden bladeren, en bloemen van een zwavelgele kleur	120	5—7	0.25
— plantaginea , breedbladig siergras, ook geschikt voor droge en be- schaduwde plaatsen	30		0.30	Cerastium tomentosum album , krui- pende plant met zilverwitte vilt- achtige bladeren en fijne zuiverwitte bloempjes. Zeer geschikt voor ran- den of mozaïekvakken	15	5—6	0.20
Cassia marylandica	120	8—9	0.40	† Chelone barbata . Met schoone scharlakenroode bloemen, welke eenigszins leeuwenbekachtig zijn gevormd	60	7—10	0.25
Catananche alba plena . Lange sten- gels met witte bloemen in den vorm van korenbloemen	60	6—9	0.30	† — glabra alba , met witte bloemen	80	8	0.20
— coerulea . De bloemen hebben eenige overeenkomst met de koren- bloemen en zijn purperblauw ge- kleurd	60	6—9	0.40	— Lyoni , met rose bloemen	50	6—7	0.30
				— obliqua fl. albo , m. witte bloemen	80	7—8	0.30
				† CHRYSANTHEMUM			
				INDICUM.			
				Vroegbl. winterharde Chrysanthemums.			
				Op verzoek van vele mijner afnemers heb ik dit artikel weer in mijn catalogus opge- nomen en zij verdienen ook ten volle de aandacht. Zij beginnen reeds te bloeien in Juli en bloeien door tot October, ja zelfs Nov., indien het niet te hard vriest, en de bloemen komen voor in prachtige nuanceeringen van geel, bruinrood, rose en wit. Daar het wel eens gebeurt, dat enkele soorten niet goed door den winter komen. doet men goed de keus der soorten geheel aan mij over te laten zal zoo veel mogelijk voor een goede variatie worden gezorgd.			
				Het verdient aanbeveling ze in den winter te bedekken met een flinke laag droge turf- strooisel, die langzamerhand moet verwijderd worden, wanneer de planten in het voorjaar beginnen te werken. Nog beter is het om ze in den kouden bak te overwinteren. Enkele jaren overwinteren ze zelfs zonder bedekking, maar men kan er toch niet op rekenen, want vooral bij afwisselend vriezend en dooi weder, sterven ze dikwijls geheel af.			
				Prijs in de volgende soorten . . .	60 120	7—11	0.40
				Champagne , helder wijnrood.			
				Diana , bronsachtig oranje.			
				Eden , helder rose.			
				Gascogne , zwavelgeel.			
				Harriet Cole , licht rose.			
				H. H. Crane , kastanjebr. m. goudkleur			

Wanneer men van eene soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Cimicifuga (Actaea) Simplex. Zeer decoratieve plant, welker bloemstengels in dichte trossen zuiver witte bloemen eindigen; zij bloeit op een tijd, dat mooie bloemen schaarsch zijn	90	7—9	0.25	† Clematis erecta	100	7—8	0.25
† Clematis Davidiana Azur. Fraaie pyramidaal-vormige plant. De bloemen zijn lichtblauw met wit centrum, waarbij de crème-witte meeldraden fraai afsteken	100	7—9	0.35	† — erecta flore pleno. Rijkbloeiend met mooie roomkleurige bloemen .	80	9—10	0.55
† — Davidiana Colombine. Met slanke stengels, waarvan de bloemtrossen met groote violet-kleurige bloemen, flink boven het loof uitkomen			0.45	† — erecta grandiflora. Verkregen door kruising van C. erecta en angustifolia. De stengels zijn van boven bedekt met groote bloemen van tenminste 3 cM. middellijn, met 4, 5 of 6 bloembladeren van zuiverwitte kleur en crème meeldraden	100	7—8	1.—
† — Davidiana Cypris. Met groote, welriekende, zachtblauwe bloemen, welke in dichte bossen verschijnen	120	8—9	0.30	† — grata. Schoone vaste plant, met een groote menigte witte bloemen. met blauwachtige tint op zeer losse stengels	150	8—10	0.30
† — Davidiana Profusion. De bloemen hebben een prachtig zacht asch-blauwe kleur	100	9—10	0.35	Codonopsis ovata. Mooie klokvormige lichtblauwe hangende bloemen	30	7—8	0.25
				† Convallaria majalis Fortin. Grootbloemige variëteit van de bekende Lelietjes-van-dalen	20	4—5	0.20




Clematis erecta grandiflora.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

† Coreopsis lanceolata Golden Queen. Beter winterhard dan de oorspronkelijke soort met helder goudgele bloemen.	60	7—9	0.65
† — lanceolata oculata. Geel met bruin midden	50	7—8	0.40
— rosea, met rose bloemen.	25	7—8	0.30
— verticillata. De menigte goudgele bloemen steken zeer mooi af tegen het fijne lichtgroene loof. Zeer sterke plant	50	7—8	0.25
Coriaria terminalis. Deze plant is meer merkwaardig door hare schoone vruchten, dan door de bloemen. De lange, een weinig hangende takken, dragen aan het uiteinde eene menigte doorschijnende gele bessen	60		0.40
Corydalis nobilis. Zeer mooie voorjaarsplant, met goudgele bloemen	50	4	0.25*
Cotula squallida. Uit Nieuw-Zeeland ingevoerd zodenvormend plantje met fijne bladeren, die ook 's winters groen blijven. Zeer geschikt voor bekleeding van rotspartijen			0.25
† Crinum Powellii, donker rose	100	8—9	0.40
† — Powellii album, sneeuwwit	100	8—9	0.50
† — ” intermedium, lichtrose. Deze Crinums zijn ontstaan uit kruising tusschen C. longifolium (Amaryllus longifolia) en C. Moorei. Ze kunnen met succes in den vollen grond worden gekweekt. De schoone, op lelies gelijkende bloemen, zijn op lange stengels gezeten en komen prachtig uit boven de lange glanzend groene bladeren. Des winters moet men ze opnemen of met stroo of bladeren dekken	60	8—9	0.55

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Cyclamen europaeum. De beste van de Cyclamen-soorten voor den vollen grond. Zij bloeit in den herfst; de bloemen zijn van een violetroode kleur en komen veel overeen met die van de gewone kas-Cyclamen. Zij vereischt niet veel zorg, maar moet niet te diep geplant worden; des winters moet ze met een weinig blad of eenige dennetakken worden gedekt. Het blad heeft veel overeenkomst met de klimop	10	8—9	0.45	waarvan ze echter in elk opzicht een verbetering kan genoemd worden; de bloemen zijn grooter en de stengels langer en meer vertakt. Ik beschouw deze als de beste hemelsblauwe enkele <i>Delphinium</i>	150	7—8	0.45
— hederaefolium. Prachtige soort met fraaie bladeren en rose bloempjes; verlangt des winters een lichte bedekking	10	7—9	0.35	Delphinium hybr. Col. Douglas. Zuiver blauwe bloemen met zwart hart.	130	7—8	0.50
Cynoglossum appenninum . . .	40	6	0.30				
Cypripedium calceolus. Bloemen zijn roodbruin, de slippen goudgeel met rood getint	50	5—6	0.50				
† — spectabile. Bizonder mooie vollegronds-Orchidee met groote eigenaardig gevormde bloemen, die wit met helderrose gekleurd zijn. Gewoonlijk 2 bloemen bij elkaar op een lange stevige fraai bebladerde stengel. Een der schoonste snijbloemen. Zij is volkomen winterhard	40	6—7	1.70				
† Delphinium atropurpureum. Deze is de vroegstbloeiende <i>Delphinium</i> . De groote enkele bloemen zijn paarsblauw met zwart hart . . .	100	6—7	0.35				
— Brunonianum. Zeldzame soort van de Himalaya. Komt veel overeen met de vorige, de bloemen zijn echter helderder	90	6—8	0.50				
† DELPHINIUM HYBRIDUM. (RIDDErsporen.)							
De overblijvende Riddersporen kunnen tot de schoonste sierplanten worden gerekend. Zij vormen forsche bossige planten met talrijke stevige bloemstengels, die tot 6 voet hoog worden en van onderen tot boven dicht met bloemen zijn bezet. De kleur der bloemen komt voor in nuances van blauw, violet, paars en wit.							
De afgesneden bloemen van <i>Delphiniums</i> blijven zeer lang frisch en zijn uiterst geschikt voor bouquetten tot het vullen van groote vazen. Ook voor borders of vaste planten rabatten zijn ze zeer geschikt. De bloeitijd is Juli-Aug., maar gewoonlijk bloeien de zijtrossen door tot eind September.							
Enkelbloemige Variëteiten.							
Delphinium hybr. Belladonna. Bekende oude soort, met hemelsblauwe bloemen. Snijbloem bij uitnemendheid, daar zij gedurende den geheelen zomer bloeit	60	7—8	0.30				
— hybr. Belladonna grandiflorum. Deze heeft een sterker gewas dan de gewone <i>Belladonna</i> en ook grooter bloemen	100	7—8	0.35				
— hybr. Capri. Eigengewonnen Nieuwigheid met denzelfden sterken groei als „ <i>Moerheimi</i> ,” waarvan ze een pendant is. De kleur komt overeen met die van „ <i>Persimmon</i> ,”							




Delphinium hybriden.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Delphinium hybridum Duke of Connaught. Grootbloemig, donkerblauw, iets violet met wit midden			0.45
— hybr. Fanny Stormonth, zeer zacht lichtblauw	110	7—8	0.55
— hybr. Koningin Wilhelmina, met hemelsblauwe, iets rose getinte bloemen	110	7 8	0.50
— hybr. K. Th. Caron. Zuiver blauwe bloemen met wit hart	150	7—8	0.55
— hybr. Lady Ravensworth. Zeer lange ijle trossen met groote symmetrisch geplaatste zuiver blauwe bloemen, met bruin hart	120	7—8	0.45
Delphinium hybr. Lamartine, donkerblauw	100	7 8	0.35



Delphinium hybr. Moerheimi.

Wanneer men van eene soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.


” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Delphinium hybr. Lize. Talrijke bloemstengels met opvallend hemelsblauwe bloemen, met wit hart	110	7—8	0.35
— hybr. Lize van Veen. Met zeer groote lichtblauwe bloemen . . .	130	7—8	0.45
— hybr. Moerheimi. NIEUW! <i>De eerste en eenige zuiverwitte Delphinium.</i> De beste, winterharde, vaste plant, in de laatste jaren ingevoerd. Deze nieuwe variëteit is eenige jaren geleden in mijne kweekerij ontstaan. De lange stengels zijn sterk vertakt. De zijstengels worden gevormd gedurende den geheelen zomer en deze dragen nog bloemen wanneer de hoofdstengels reeds lang zijn uitgebloeid. Hierdoor wordt de bloeitijd verlengd tot laat in den zomer. De bloemen zijn geheel zuiver wit en hebben niet die blauw-, geel- of groenachtig vuilwitte tint van sommige vroeger als wit in den handel gebrachte soorten. De planten zijn buitengewoon krachtig en gezond en vrij van meeldauw. Deze aanwinst kan tot de allerbeste snijbloemen gerekend worden.			
Juli 1909 te Londen bekroond .	150	7—8	0.45
— hybr. Mr. J. S. Brunton. Door mij gewonnen nieuwe Delphinium. Hare schoone bloemen zijn prachtig hemelsblauw gekleurd. Zij bloeit buitengewoon rijk. Geen andere variëteit overtreft haar in overvloedig bloeien en zij kan als snijbloem extra worden aanbevolen. Getuigschrift van Verdienste. Wisley, Juni 1912	100	7—8	0.65
— hybr. Mrs. Thomson. De bloemen dezer door mij gewonnen variëteit hebben een helderblauwe kleur en zijn op stevige sterk vertakte lange stengels gezeten. Weinig andere soorten bloeien zoo rijk en zoo lang als deze. De plant is zeer krachtig en niet vatbaar voor ziekte . . .	110	7—8	0.35
— hybr. Persimmon. Zeer lichtblauwe bloemen, met lila hart . .	120	7—8	0.40
— hybr. Salland. Eene door mij gewonnen nieuwigheid, met donkerblauwe bloemen aan stevige stengels	130	7—8	0.45
— hybr. Theodora. Met losse, sierlijke bloemstengels, welke groote zuiverblauwe bloemen— als van een korenbloem — dragen met een lichtbruin hart De plant is niet zeer vatbaar voor meeldauw	120	7—8	0.35
— hybr. True blue, zeer lichtblauw met zwart hart	110	7—8	0.40
— hybr. Yvette Guilbert, hemelsblauwe bloemen met lila hart . .	160	7—8	0.35

Dubbelbloemige variëteiten.	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Delphinium hybr. Aeroplane (Francis F. Fox), grootbloemig, kleur blauw tot paars en wit hart	120	7—8	0.35	Delphinium hybr. Lilacina , lila . . .			0.65
— hybr. Amos Perry , bloemen $\pm 5\frac{1}{2}$ cm. in doorsnee, helder lichtblauw met zwart hart	160	7—8	0.45	— hybr. Lord Curzon , paars met violet en wit oog	110	7—8	0.45
— hybr. Andrew Carnegie , bloemen lichtblauw tot zacht-lila met een wit met lila hart	160	7—8	0.55	— hybr. Lorenzo de Medici , zeer fraaie variëteit. De dubbele bloemen zijn lila tot zacht blauw, <i>extra</i>	150	7—8	0.45
— hybr. Baldershage , NIEUW. Lichtblauwe bloemen met wit hart, aan enorm lange trossen. Bijna alle bloemen van een tros bloeien tegelijk			0.65	— hybr. Lovely , lichtblauw, naar het midden in lila overgaand, groot wit hart	120	7—8	2.—
— hybr. Beauty of Langport , Crêmewit met licht geel oog	100	7—8	0.85	— hybr. Marie Closon , prachtige, in mijne kweekerij gewonnen nieuwigheid. De buitengewoon groote bloemen zijn opvallend lila en hemelsblauw. Eene der allerschoonste Riddersporen	120	7—8	1.—
— hybr. Belladonna semiplenum , zuiver hemelsblauwe bloemen met grijs hart	100	7—8	0.30	— hybr. Mevrouw Horstman , donkere blauwe, in paars overgaande bloemen, met zwart en wit hart	130	7—8	2.40
— hybr. Boerhave , een der mooiste en grootstbloemige met hemelsblauwe bloemen die naar het midden in lila overgaan	120	7—8	0.80	— hybr. Miss Nelly Weyman , helderblauw met lila bloemen, met wit hart	160	7—8	0.65
— hybr. Chamud , met donker violette bloemen	120	7—8	0.35	— hybr. Novelty , zeer lange trossen, bloemen zuiver rond, paarsblauw met zwart hart	150	7—8	0.35
— hybr. Corry , bloemen blauw, naar het midden overgaand in paars. De tros is gewoonlijk over haar geheele lengte tegelijk in bloei en daardoor munt deze variëteit uit boven vele	120	7—8	0.45	— hybr. Polar Star . Een laag-groeiende variëteit met ivoorwitte bloemen		7—8	0.55
— hybr. C. W. Matthes , NIEUW. Zuiver blauwe bloemen en lichte donker hart. Hooggroeiend en laatbloeiend		7—8	0.50	— hybr. Prins Gustav . NIEUW! Eigen gewonnen nieuwe variëteit met zeer groote donkerblauwe bloemen, naar het midden overgaand in violet, met grijs hart. Zeer aparte en schitterende kleur, welke reeds van verre de aandacht trekt	120	7—8	0.85
— hybr. De Ruyter , met donker-violetblauwe bloemen. Zeer rijkbloeiend; losse bloeiwijze	130	7—8	0.45	— hybr. Prins Hendrik . Zeer aanbevelenswaardige nieuwigheid. De bloemen zijn donkerviolet met een klein wit oog	140	7—8	0.45
— hybr. Dusky Monarch , donkerblauw, naar het midden overgaand in violet, met zwart hart	120	7—8	0.65	— hybr. Prinses Juliana . Met groote trossen donkerviolette bloemen; een der donkerste Delphiniums	130	7—8	0.50
— hybr. Francis F. Fox (Aeroplane)	120	7—8	0.35	— hybr. Progression . Eene nieuwe geelwitte variëteit, waarvan het hart lichtgeel gekleurd is	110	7—8	0.45
— „ Fröken Scheltema , crêmewit			0.85	— hybr. Queen of the Lilacs , donkerlila en grootbloemig			1.—
— „ Goliath , paarsche bloemen met zwart hart	140	7—8	0.55	— hybr. Queen of Spain lichtblauw met lila	130	7—8	0.45
— „ Harry Smetham , licht lila-geintje blauwe bloemen	120	7—8	0.45				
— „ Hugo Poortman , welgevormde stengels met mooie lichtblauwe bloemen. Een door mij gewonnen nieuwigheid	130	7—8	0.55				
— hybr. Humosa . Eigengewonnen variëteit met prachtige donker violette bloemen	130	7—8	0.50				
— hybr. Ida R. Elliot . Extra grootbloemige variëteit met lichtblauwe bloemen en amethyst-kleurige binnenbloemen. Prachtige tros	120	7—8	1.—				
— hybr. J. B. Blackmore . groote hemelsbl. bloemen; sterke groeier	110	7—8	0.40				
Delphinium hybr. King of Delphiniums . Van de donkerkleurige soorten is deze een der allermooiste. De bloemen zijn $\pm 5\frac{1}{2}$ cm. in doorsnede, prachtig paars, met een groot wit hart	110	7—8	0.50				
				Delphinium hybr. Rev. E. Lascelles , NIEUW! Van de dubbelbloemige soorten is deze een der mooiste. De groote blauwe bloemen zijn op stevige stengels gezeten en trekken door het groote witte hart reeds van verre de aandacht	100	7—8	0.50
				Delphinium hybr. Rosalare . Zeer lichtblauw met lila tint, grootbloemig	110	7—8	0.55
				— hybr. Rozenlust , lichtblauw tot zachtlila	120	7—8	0.45

Wanneer men van eene soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

Delphinium hybr. Statuaire Rude. Een der mooiste met groote lilakleurige bloemen	Hoog cm	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Prijs p. stuk.
— hybr. Sven Ridder. NIEUW! Rijkbloeiend, donkerpaars met wit en blauw hart		7—8	2.40		
— hybr. The Alake, met enorm groote bloemen, bijna 7 cm. in doorsnee, los geplaatst op de reusachtige stengels. Kleur der bloemen diep donkerblauw, naar het midden violetblauw	150	7—8	0.65		
— hybr. Walter T. Ware, donkerpaarse bloemen met groot wit hart	110	7—8	0.65		
— hybr. Willy Obreen, groote lichtblauwe bloemen met wit hart . .	160	7—8	0.45		
— hybr. Zuster Lugten. Nieuwe, door mij gewonnen variëteit. Ze is van een sterken groei en heeft donkerpaarsche bloemen	130	7—8	0.55		
<hr/>					
† Delphinium sinense, deze soort heeft een gedrongen groeiwijze en sierlijke bloemtrossen van helder blauwe kleur	50	7—9	0.20		
† — sinense cineraria coeruleum, deze variëteit met helder blauwe bloemen, heeft geen sporen waardoor de bloemen aan Cineraria's doen denken. Zij bloeit zeer lang door	50	7—9	0.35		
† — sinense flore albo, met witte bloemen	50	7—9	0.20		
Dianthus caesius, zodenvormend rotsplantje met roseroode bloempjes	10	5—6	0.35		
— fimbriatus, aardig rotsplantje met kleine gefranjete witte bloemen .	20	6—7	0.30		
— graniticus, zeldzaam rotsplantje met een menigte lichtrose bloempjes	20	6—8	0.45		
— hybridus roseus, zachtrose anjelier	20	6—7	0.25		
† — plumarius Artis (Sneeuwbal). Deze prachtige grasanjelier is buitengewoon rijkbloeiend, met zuiverwitte bloemen	30		0.25		
† — plumarius Duchess of Fife, deze bij uitstek geschikte rotsplant, bloeit m. een menigte sierl. rose bloempjes	30	6—7	0.45		
— suavis, met kleine helder lilakleurige bloemen	30	6—7	0.15		
† Diclytra eximia, rose	30	5—6	0.20		
† — formosa. Boven het fijn ingesneden loof verheffen zich de kleine hangende roode bloemen	30	6—7	0.20		
† — spectabilis. (<i>Gebroken hart</i> .) Zoowel de elegante bladeren als de fijne roode hartvormige losse bloemen geven de plant een bevallig aanzien	60	5—7	0.30		
† Dictamnus caucasicus. Deze nieuwe en zeldzame soort is veel schooner dan de bekende <i>D. Fraxinella</i> , daar de bloemen op hooger stengels zijn gezeten en geheel boven de bladeren uitkomen. Bloemen lichtrose. . .	110	6—7	0.30		

Dictamnus caucasicus.	Hoog cm.	Bloei- tijd.	
† Dictamnus Fraxinella, rood . . .	60	6—7	0.25
† — Fraxinella albus, wit . . .		6—7	0.20
Bovenstaande planten worden ook wel <i>Esschenkruid</i> of <i>Vuurwerkplant</i> genoemd. Het blad komt veel overeen met dat van den Esch; de schoone bloemen komen er flink boven uit. De vruchten bevatten een vluchtige olie, zoodat zij ontploffen, wanneer men er een brandende lucifer bij houdt. Ze verdienen ten volle een plaatsje in den tuin en winnen er bij, wanneer ze eenige jaren blijven staan zonder te worden verplant. Zeer geschikt voor borders.			
† Diplostephium amygdalinum, (<i>Boltonia latisquama</i>). De bloemstengels vertakken zich van boven sterk en dragen zeer vele witte bloemen die gelijken op herfst-Asters . .	120	9—11	0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”



Doronicum plantagineum excelsum.

(Zie beschrijving blz. 38.)


	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Doronicum Clusii. Donker gele bloemen met donkerder hart . . .	25	4—5	0.25
†— magnificum. Groeit eenigszins gedrongen, doch levert ook schoone bloemen van zuiver gele kleur . .		3—5	0.20
†— plantagineum excelsum, (Harper Crewe). Bloeit zeer lang met een overvloed van schoone goudgele bloemen. Zij kan zoowel in de schaduw als in de volle zon gekweekt worden. Een der vroegst-bloeiende planten	90	3 en 8	0.15
† Echinacea (Rudbeckia) purpurea. Een van de meest opvallende herfst-bloeiërs met groote bloemhoofdjes op lange stevige stengels. Kleur purperrood met kegelvormig donkerbruin midden	100	8—10	0.20
†— purpurea Ernest T. Anderton, donkere variëteit	80	7—9	0.30
†— purpurea Mme. L. Gonnet, met groote lichtere bloemen . . .	100	7—8	0.45
†— purpurea Winchmore Hill, donker wijnrood	80	7—9	0.30
†— (Rudbeckia) tubiflora. Met buisvormige bloemen	100	8—10	0.40
† Echinops humilis. Een der beste soorten van de blauwe Kogeldistel .	90	7—8	0.25
†— nivalis, witte Kogeldistel . . .	100	7—8	0.25
† Ritro. Kogeldistel met van stekels voorzien, groene bladeren en fraaie hemelsblauwe bloemhoofdjes. Gedroogd blijven zij langen tijd goed	60	7—8	0.25
Elymus glaucus, siergras met blauw-groen loof	120		0.25

† EPIMEDIUM. (30 cM.)

Onder de vroegbloeiende planten nemen de *Epimedium's* een voornamende plaats in. De bloemen doen eenigszins denken aan kleine Orchideeën en komen reeds in Mei te voorschijn. Ook de bladeren zijn zeer fraai gevormd en kunnen even goed als de bloemen voor bindwerk worden gebruikt. Zij kunnen ook in de schaduw worden geplant en gedijen in bijna elken grond. Voor het beplanten van rotspartijen zijn zij zeer aan te bevelen.

Epimedium bicolorum	30	5	0.30
— coccineum, rood en wit	30	5	0.30
— erectum	30	5	0.30
— grandifl. album	30	5	0.30
— illicium	30	5	0.30
— macranthum. Zoowel de bevalige blaadjes als de fijne melkwitte losse bloemen leveren een uitmuntend materiaal voor bouquetten .	30	5	0.40
— niveum. De bloemen dezer soort zijn zuiver wit en zeer schoon . .	30	5	0.25
— pinnatum elegans. Dit is zonder twijfel een der mooiste <i>Epimedium's</i> . Zij bloeit bijzonder rijk met prachtige, groote, goudgele bloemen. Een der beste voorjaarsbloeiërs .	30	5	0.50
— rubrum, rood	30	5	0.30
— sulphureum, met zwavelgele bloemen	30	5	0.30

† EREMURUS.



Eremurus robustus.

Deze eigenaardige plantengroep verheugt zich in een toenemende belangstelling. De *Eremurus*, afkomstig uit de Himalaya, is geen plant voor kleine tuintjes. De zeer krachtige planten, met reusachtige bladeren en tot 3 Meter hooge bloemstengels, sterven reeds in den zomer geheel af, waarmee men dus bij het plaatsen rekening moet houden.

Men lette er bij het planten op, dat alle wortels in bijna horizontale richting in den grond worden uitgespreid, terwijl de neus slechts weinig onder de oppervlakte komt. Men vermijdt, vooral ook gedurende den winter, te groote vochtigheid en zorg voor losgewerkten goed gedraineerden, en liefst flink met oude koemest bemesten grond.

Voor zeer vochtige gronden acht ik het het beste de planten na het afsterven in Augustus op te nemen, ze droog te bewaren en dan in October weer uit te planten.

De planttijd is van October tot uiterlijk half November; desnoods in Februari of begin Maart.

Alle soorten worden in bloeibare planten geleverd.

Eremurus Elwesianus. Bloemen zacht rose. De mooiste van alle .	3	6	1.70
— himalaicus, zuiver witte bloemen	2½	6	0.85
— robustus, groote zacht rose bloemen	3	6	1.15


Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „ „ „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Eremurus robustus superbus. Sterk- groeiende variëteit met groote lichtrose bloemen	250 300	6	1.70	Eryngium giganteum. Deze wordt ook Ivoordistel genoemd. In vorm komt zij veel overeen met E. Olive- rianum, maar de kleur is zilverwit	60	6—7	0.25
Erica, zie onder „ <i>Boomen en Heesters.</i> ”				— Juwel. Deze nieuwe variëteit munt uit door haar donkerblauwe stengels, bladeren en bloemen, die zich vroeger kleuren als alle andere Eryngiums. Zeer mooie snijbloem	60	6	0.40
† Erigeron Amos Perry. Rijkbloeiend met schitterend violette bloemen .	50	7—9	0.65	Oliverianum. Deze soort moet niet verward worden met Eryngium amethystinum, onder welken naam ze dikwijls verkocht wordt. De kleur is staalblauw.			
† — Asa Gray. Nieuw, met abrikoos- kleurige bloemen	30	7—8	0.30	Om de takken lang goed te houden, moet men ze, zoodra ze afgesneden zijn, een paar weken onderstboven op een droge, donkere, luchtige plaats ophangen. (<i>Zie afb. blz. 40.</i>)	60	7—9	0.25
† — B. Ladhams. Met mooie zacht- rose bloemen	40	7—8	0.55	— planum, met kleine helderblauwe bloemen, welker stengels ook blauw worden	90	7—10	0.25
† — elatioer Antverpia. Rijk en lang bloeiende nieuwe variëteit, met zeer groote lila-kleurige bloemen .	80	7—9	0.35	— planum coelestinum, belangrijke verbetering der voorgaande, met donkerder blauw gekleurde bloemen en stengels	90	6—10	0.25
† — Mesagrande speciosus grandiflorus. Een der rijkstbloeiende planten, die onder den naam van Aster enkele jaren geleden is in- gevoerd. De groote donkerlila bloemen zijn goed gevormd en op stevige stengels gezeten	80	6—8	0.20	— Springhill Seedling, schitterende nieuwe variëteit. De bloemen en stengels hebben een donkerblauwe kleur	70	8	0.30
† — Pink Pearl, licht rose	60	7—8	0.55	— Violetta, Nieuw. Heeft dezelfde eigenschappen als Eryngium Juwel, doch heeft een roodachtige violette kleur	60	6	0.40
† — Quakeress. De lange bloem- stengels zijn bezet met fijne lilarose bloemen	60	7—9	0.35	Erythrochaete palmatifida, zeer de- coratieve plant met groote grillig gevormde ingesneden bladeren en groote gele bloemen. Zeer goed als solitairplant te gebruiken . .	90	7—8	0.30
† — speciosus grandiflorus.	60	7—10	0.30	Eulalia japonica gracillima univittata, zeer decoratieve plant met lange, uiterst smalle, sierlijk aan den top neerhangende bladeren .	150		0.35
† — „ semiplenus, met zeer mooie, halfdubbele lavendelblauwe bloemen	60	7—9	0.35	— japonica fol. var. De smalle, lange bonte bladeren buigen zich naar alle kanten met een sierlijke ron- ding naar buiten	150		0.65
† — speciosus superbus. Boven- staande soorten zijn buitengewoon rijkbloeiend, met prachtige lila- bloemen met geel hart. Zij bloeien tot in den winter en verdienen aan- beveling als snijbloem en voor perken	60	7—10	0.25	— japonica zebrina, de overhangen- de bladeren zijn <i>dwars</i> gestreept, als de huid van een Zebra, met sterk geteekende geelachtige lijnen	180		0.40
Eriophorum angustifolium. Moeras- plant met zilverwitte wolachtige pluimen.			0.20	— japonica zebrina stricta, gelijkt op de vorige, doch staat rechtop .	180		0.35
† Erodium manescavi. Buitengewoon dankbaar bloeiende plant met lange stevige bloemstengels. De bloemen zijn paarsrood en de plant bloeit den geheelen zomer tot laat in den herfst. Zij moet des winters iets gedekt worden. Zeer geschikt voor rotsplant	30	6—9	0.35	— Saccharifolia, rietachtig gewas; zeer geschikt voor dekking langs slootkanten	300		0.50
† ERYNGIUM. (Edeldistels).				Eupatorium purpureum, decoratieve plant met groote paarsroode bloem- schermen	200	9—10	0.35
De eigenaardig gevormde bloeiwijze en de mooi staalblauwe kleur die de stengels der meeste soorten aannemen, maken de Edel- distels tot de meest gezochte planten voor vulling van groote vazen. De afgesneden stengels blijven eenige maanden goed, het- geen slechts van weinig planten kan gezegd worden.				Euphorbia cyparissias	30	5—6	0.30
				— polycroma. De bloemtrossen zijn heldergeel. Ook de schutbladeren zijn goudkleurig	30	4—5	0.35
				Evonymus radicans fol. var. Bont- bladerige Evonymus	30		0.25
Eryngium alpinum. Wel een der schoonste van dit geslacht; de groote, sierlijk gevormde bloem- hoofdjes zijn evenals de bloem- stengels van een heldere, staal- blauwe kleur. De bovenste bla- deren zijn zeer fijn ingesneden .	75	7—8	0.20				
Eryngium Bourgati, met donker- blauwe bloemen. De blauwe bloem- stengels zijn evenals de stevige, grijs-groene bladeren wit geaderd	50	8	0.30				

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



<i>Eryngium Oliverianum.</i> (Zie blz. 39.)	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Fuchsia americana. Sterke rood- bloeiende variëteit	60	7—9	0.25
— americana elegans , een winter- harde Fuchsia met karmijnroode bloemen. Zij bloeit zeer lang . .	60	7—9	0.25
— corallina , m. koraalroode bloemen	60	7—9	0.25
— Enfant Prodigue	60	7—9	0.25
— gracilis , met iets fijnere bloemen	60	7—9	0.25

Fuchsia longipedunculata	60	7—9	0.25
— Mad. Cornelissen	60	7—9	0.25
— Profusion	60	7—9	0.25
— Ricartoni , grootbl. variëteit met fraai blad	60	7—9	0.25
— Thompsoni	60	7—9	0.25

FUNKIA.

De Funkia's worden meer geplant terwille van hun groote fraaie bladeren dan om de bloemen, die meestentijds vaal-lila, op lange stelen boven de bladeren uitgroeien.

Als bladplant is de Funkia dikwijls onvervangbaar, daar zij zelfs op donkere schaduwplaatsen nog krachtig groeit.

Funkia aurea var., m. goudbont blad	50	7—8	0.20
— Fortunei , blauwgroen blad . . .	50	7—8	0.35
— „ fol. var. Het blauw- groene blad is donkergr. gevlekt.	50	7—8	0.50
— Fortunei robusta . Een variëteit met enorm groote bladeren en bloemen	50	7—8	0.50
— glauca . Met fraai blauwgroen blad	50	7—8	0.25
— japonica gigantea . Met zeer groote bladeren	50	7—8	0.30
† — minor alba . Met zuiverwitte bloemen, zeer rijkbloeiend. Het blad dezer soort is klein	50 70	7—8	0.30
— robusta elegans fol. var. , met goudbont blad	50	7—8	0.20
† — subcordata grandifl. (liliflora) . Met groot blad en groote witte bloemen op lange stevige stelen .	30 40	7—8	0.25
— Thos. Hogg . Variëteit met groote lichtgroene bladeren, welke aan den rand zuiver wit zijn	50	7—8	0.30
— undulata medio var. De mooiste van de witbonte Funkia's; ze wordt zeer veel gebruikt voor randen. Zeer aan te bevelen	50	7—8	0.25

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

†GAILLARDIA.

De *Gaillardia*'s kunnen tot de schoonste en dankbaarste planten worden gerekend, zoowel door haar langdurigen bloei als door de eidelooze kleurschakeeringen tusschen geel, rood en purper waarin haar prachtige bloemen worden aangetroffen. Voor perken maken zij een uitmuntend effect, terwijl zij in afgesneden toestand zeer lang goed blijven.

Gaillardia maxima, gem. 75 7—10 0.25

10 stuks in 10 soorten op naam f 3.—

5 " " 5 " " " f 2.—

50 " " 10 " " " f 12.—

50 " " 5 " " " f 10.—

†— **maxima Lady Rolleston**. Deze heeft zeer groote bloemen, 10 cM. in doorsnee, van een helder effen gele kleur met geel hart. De bloemen staan op lange stevige stengels; voortreffelijke snijbloem 80 7—10 0.35

†— **maxima The King**. Met groote purperroode bloemen, de uiteinden der bloembladeren geel 80 7—8 0.35

Galega bicolor Hartlandi. Vormt groote struiken, die den geheelen zomer met een menigte lila en witte bloemen bloeien 120 7—9 0.25

†— **Duchess of Bedford**, met gedrongen groei; lavendelblauwe en witte bloemen; zeer mooi. 90 7—9 0.35

†— **His Majesty**. Hooggroeiend, iets donkerder dan *G. Hartlandi* 100 7—9 0.35

†— **Niobe**, met lange trossen zuiver witte bloemen 80 7—9 0.40

†— **officinalis carnea plena**, met vleeschkleurige, dubbele bloemen 100 7—8 0.30

†— **officinalis fl. albo**. Zeer rijkbloeiend met zuiverwitte vlinderbloemen 100 7—8 0.30

Genista sagittalis. Kruipende rotsplant met een groote menigte heldergele bloemen; neemt zelfs de droogste en schraalste standplaats voor lief 6—7 0.40

†**Gentiana asclepiadea**. Rijkbloeiend met donkerblauwe bloemen 60 7—8 0.75

†— **asclepiadea alba**. Slanke stengels met 2 en 3 bloemen in de oksels der bladeren, soms in een tros verschijnend. De kleur is zuiver wit 60 7—8 0.50

— **thibetica**. Met groote bladeren en geelachtig witte bloemen. 30 7—8 0.50

†**Geranium grandiflorum**. Met helder violetblauwe bloemen. 40 6—7 0.20

— **nepalense**, met roode bloemen 30 6—7 0.30

— **platypetalum**. Ouderwetsche sierplant met groote paarse bloemen 60 7 0.30

— **sanguineum**. Zeer schoone plant, geschikt voor randen en rotspartijen. De bloemen zijn groot en diep roodpurper-kleurig; zij bloeit den geheelen zomer 20 5—8 0.30

— **sanguineum album**. Deze variëteit heeft zuiverwitte bloemen van een lossen, eleganten vorm. Ze bloeit den geheelen zomer en is zeer geschikt voor randen en perken 20 5—8 0.30

†**Gerbera Jamesonii**, oranjegele Composiet, niet volkomen winterhard 50 7—8 1.50

†**Geum atro-sanguineum fl. pl.** Bloeit den geheelen zomer met een menigte vuurroode bloemen 50 6—9 0.25

— **bulgaricum**. Nieuwe soort met groote oranjegele bloemen en groot donkergroen blad 20 7—9 0.25

†— **coccineum Mrs. J. Bradshaw**. Zeer rijkbloeiende nieuwigheid met groote dubbele, schitterend scharlakenroode bloemen. Prachtsnijbloem; te Londen bekroond 50 7—8 0.25

†— **Heldreichi**, met heldere, oranje bloemen en zeer rijkbloeiend 45 4—6 0.30

†— **Heldreichi luteum**, zuiver geel 45 4 6 0.35

†— " **magnificum** 45 4—6 0.25




Geum cocc. Mrs. Bradshaw.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "


	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† <i>Geum Heldreichi splendens</i> (superbus). Belangrijke verbetering der bekende <i>G. Heldreichi</i> met groote bloemen van het zuiverste oranje	45	5—8	0.20	<i>Gnaphallium Leontopodium</i> , Edelweiss. Dit is het bekende Alpenplantje. De bladeren zoowel als de witte stervormige bloemen zijn geheel wolachtig en de plant heeft daardoor een zeer eigenaardig aanzien. Uitstekend voor rotspartijen. Het groeit best in lichten zandgrond met steenen vermengd	15	6—7	0.25
— <i>miniaturum</i> Perry's var., geel met oranje	30	5—7	0.50	<i>Gunnera manicata</i> . Prachtige, zeldzame gazonplant, waarvan de bladeren een reusachtige afmeting krijgen. Moet in den winter gedekt worden.	350		1.80
† — <i>montanum aurantiacum</i> . Nieuwe variëteit met glanzige, groote, donkergroene bladeren en groote gele bloemen	30	5—6	0.35	— <i>scabra</i> , extra zware planten	300		0.55
† — <i>montanum maximum</i> . Met groote zuivergele bloemen	30	5—6	0.25	— „ kleinere planten			0.45
— <i>pyrenaicum</i> . Met gele bloemen	30	6—9	0.30	De bladeren hebben eenigszins den vorm van Rabarber, doch zijn veel grooter en hebben een tropisch aanzien. Moet in den winter gedekt worden.			
† <i>Gillenia trifoliata</i> . Deze plant vormt zeer losse bloemtrossen met fijne witte franjeachtige bloemen. Prachtig voor bouquets	60	7—8	0.20	<i>Gynerium argenteum elegans</i> . Een siergras dat veel in Frankrijk wordt gekweekt en daar als een der schoonste aanbevolen. Zeer rijkbloeiend.	200		0.75
<i>Glechoma hederacaea florentina</i> , kruipend	40	4—5	0.30	† <i>Gypsophila paniculata</i> , Gipskruid, met zeer talrijke, kleine, lichtroze bloempjes, welke op fijne dunne stengels zijn gezeten. Uitmuntend voor bouquets	60	7—8	0.15
— <i>hederacaea fol. var.</i> , bonte variëteit	40	4—5	0.20				
<i>Globularia cordifolia</i> , liggende halfheester met kleine bladeren en kleine blauwe bloempjes	10	5—6	0.40				
<i>Glyceria spectabilis fol. var.</i> , oevergras met prachtig wit en groen gestreepte omgebogen bladeren. Uitstekend voor vijverranden	90		0.15				
<i>Gnaphallium margaritaceum</i>	40	7—9	0.30				



Gunnera manicata in de Kon. Kweekerij „Moerheim.” Deze plant is breed 6½ Meter, hoog 3½ Meter.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Gypsophila paniculata flore pleno.

† **Gypsophila paniculata flore pleno.**

Bizonder schoone vaste plant, zoo-
wel voor snijbloem als voor alleen-
staande plant aan te bevelen.

De bekende enkele variëteit was
reeds onmisbaar bij het vervaar-
digen van bloemwerken, doch deze
nieuwe Gypsophila bezit in ieder
opzicht nog grooter waarde. De
bloempjes aan de sterk vertakte
tot een Meter lange stengels zijn
gevuld en helderwit. De plant is
hierdoor met een wit waas over-
trokken. Wanneer de bloemen,
voordat ze geheel zijn uitgebloeid,
worden afgesneden, blijven ze
eenige maanden goed. Men moet
ze dan in vazen zonder water
zetten

— **prostrata rosea.** Kruipende va-
riëteit met rose bloempjes

† — **repens monstrosa.** Deze heeft
grootere bloemen dan de andere
Gypsophila's, begint ruim een
maand vroeger te bloeien en heeft
daarbij een uiterst losse groeiwijze.
Bloeit den geheelen zomer met
elegante witte bloemen.

† — **repens rosea.** Kruipende Gyp-
sophila met tamelijk groote rose
bloempjes

† **Harpallium rigidum, zie Helianthus**
rigidus.

† **HELENIUM.**

Helenium Aurantiacum. Nieuwe
variëteit met fraaie goudgele bloe-
men

— **autumnale Gartensonne.** De
goudgele bloemen dezer nieuwe
variëteit hebben een fluweelachtig
hart

Hoog- cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
100	7—9	0.45
	7—8	0.35
15	6—8	0.30
15	6—8	0.30
200	8—11	0.30

**Helenium autumnale super-
bum.** Hooggroeiend met sterk
vertakte stengels en goudgele
bloemen

— **autumnale superbum ru-
brum.** Nieuwe variëteit met
vlammend bruin-roode bloe-
men. Door den hoogen, stevi-
gen groei en de felle kleur der
bloemen is deze plant bizon-
der geschikt om tusschen
heesters te worden geplant .

— **Bigelowi.** Met heldergele
bloemen, die een donkerbruin
hart hebben

— **grandicephalum comp. bi-
color**

— **grandicephalum Julisone.**
Prachtige nieuwigheid met
grootte donkergele bloemen,
die aan den rand lichtbruin
geschaduwd zijn

— **grandicephalum striatum.**
Met donker-oranjegele bloemen,
welke onregelmatig karmijnrood ge-
vlekt en gestreept zijn

— **Hoopesi.** Deze heeft veel over-
eenkomst met H. Bigelowi, maar
de bloemen zijn helder oranje . .

— **pumilum magnificum.** Munt uit
door zeer rijken bloei; de bloemen
zijn heldergeel

— **Riverton Beauty.** Zeer rijkbloei-
ende nieuwe Helenium met krach-
tigen groei en bloemen van een
fijne citroengele kleur, fraai af-
stekend bij het zwart purperen
centrum

— **Riverton Gem.** Eene sterk groei-
ende zaailing der reeds oude va-
riëteit „*Striatum*” die zeer rijk bloeit
met goudgele bloemen en een
terracotta weerschijn

† **Helianthella quinquenervis.** Fraaie
snijbloem, met slanke, sterke sten-
gels. Zeer rijkbloeiend met groote
gele bloemen van 12 cm. doorsnee

Helianthemum amabile fl. pl. De
groei is compact en gedrongen;
des zomers is de plant steeds be-
dekt met een menigte gevulde
scharlakenroode bloemen. Bloeit
zeer lang door

— **amabile Orange double,** met
helder oranje bloemen

† **HELIANTHUS.**

(Overblijvende Zonnebloem.)

Deze behoort met zijne soorten en varië-
teiten tot de dankbaarste planten, daar zij in
elken grond slagen en weinig eischen stellen
aan de behandeling. Zij leveren een prachtig
materiaal voor groote bouquets.

Helianthus doronicoides, kleinbloei-
mige Zonnebloem

Hoog- cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
200	8—11	0.30
150	7—10	0.25
60	7—9	0.30
100	7—9	0.25
100	7—8	0.30
120	6—9	0.25
60	6—9	0.25
75	7—9	0.30
150	8—10	0.25
150	8—10	0.25
100	6—7	0.35
20	6—8	0.30
20	6—8	0.30
120	8—9	0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ” ”

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Hellanthus microcephalus , met kleine zwavelgele bloemen op lange stengels	120	9—10	0.25	† HEMEROCALLIS.			
— multiflorus flore pleno	150	9—10	0.25				
— „ maximus	200	9—10	0.35	Hemerocallis Ajax . Nieuwe variëteit met oranjegele bloemen . . .	60	7—8	0.55
— Nuttall , laagblijvende, zeer vroegbloeiende Zonnebloem. Gele bloemen met zwart hart	100	9—10	0.25	— aurantiaca . Oude, doch aanbevelenswaardige soort. Komt veel overeen met de H. aur. major doch bloeit rijker en is sterker	60	7—8	0.45
— rigidus , sierlijke, rijkbloeiende, gele Zonnebloem	120	7—9	0.15	— aurantiaca major . Deze plant werd voor eenige jaren uit Japan ingevoerd. De bloemen zijn zeer groot en hebben een prachtige, oranje kleur. Een der schoonste	60	7—8	0.35
— rigidus D. Dewar . Donkergele bloemen met spits toeloopende bloembladen	120	7—9	0.15	— Aureole . Uit Japan ingevoerde, nieuwe soort, die dichte planten vormt. Zij draagt eene menigte vertakte bloemstengels met talrijke glanzend donker oranje bloemen, die aan de buitenzijde roodachtig getint zijn	60	7—8	0.35
— rigidus H. G. Moon , met groote gele bloemen	130	8—10	0.20	— citrina . Zeldzame, uit China ingevoerde variëteit met langwerpige trechtervormige bloemen van licht citroengele kleur	80	7—8	0.65
— rigidus Ligeri , een der schoonste overblijvende Zonnebloemen met groote heldergele bloemen	150	7—9	0.20	— flava	70	6—7	0.20
— rigidus Miss Mellish . Deze onderscheidt zich van de voorgaande door grootere en halfdubbele bloemen, die op de wijze der Cactus-Dahlia's eenigszins omgebogen zijn.	180	7—9	0.15	— flava major , zuiver gele, welriekende bloemen	60	7—8	0.25
— rigidus Miss Willmott , m. groote, halfdubbele gele bloemen	150	8—10	0.20	— fulva fl. pl. , met dubbele bloemen	60	5—6	0.25
— rigidus praecox , vroeg bloeiende soort, iets kleiner dan de voorgaande, doch dezelfde kleur van bloemen. Evenals de vorige zeer geschikt voor snijbloemen	120	6—8	0.20	— hybrida Apricot . Met oranje-kleurige bloemen	60	5—6	0.20
— rigidus semiplenum . De halfdubbele bloemen zijn van een mooie oranjegele kleur	120	8—10	0.15	— hybrida Dr. Regel . Met groote citroengele bloemen	70	6—7	0.45
— strumosus , laatbloeiende variëteit met tamelijk groote goudgele bloemen in trossen	150	9—10	0.30	— hybrida Sovereign . Met licht oranjegele, schoon gevormde bloemen. De bloembladen zijn breed	70	6—8	0.25
				— luteola . Prachtige, rijkbloeiende oranjegeel gekleurde hybride tusschen Hemerocallis aurant. major en H. Middendorffiana	70	7—8	0.30
† Heliopsis scabra zinniaeflora . De goudgele bloemen hebben een doorsnede van 7 à 8 cM. en doen aan dubbele Zinnia's denken. Weinige planten overtreffen deze aan rijkbloeiendheid	60	7—9	0.25	— luteola major	70	6—8	0.55
† Helleborus niger angustifolius (<i>Mad. Fourcade</i>). Rijkbloeiende Kerstroos, met zuiverwitte bloemen. Deze soort munt uit door krachtigen, gezonden groei en is minder dan de andere Kerstrozen vatbaar voor ziekte	30	11—3	1.—	— Middendorffiana . Met lelieachtige, oranjegele bloemen	50	7—8	0.30
† niger grandiflorus . Grootbloemige Kerstroos. Daar de Kerstrozen bloeien op een tijd dat men tevergeefs andere bloemen van den open grond zou zoeken, kunnen zij niet genoeg worden gewaardeerd. De schoone, zuiver witte bloemen steken fraai af bij de donkergroene handvormige, glanzige bladeren. Opdat de bloemen in den winter niet te veel van den wind en regen-vlagen te lijden hebben, geve men de planten een beschutte en half beschaduwde standplaats	20	11—3	0.50	— Queen of May . Een der vroegste bloeiers	75	5—6	0.65
— niger major groote bloemen, iets rose getint	20	11—3	0.50	— Shirley	80	7—8	0.65
				— Sir Michael Foster . Nieuwe variëteit met enorm groote, zuivergele bloemen	90	7—8	0.40
				HEPATICA.			
				De Hepatica's of Leverbloemen moet men een half beschaduwde niet te droge standplaats geven. Zij behooren tot de vroegste voorjaarsbloemen.			
				Hepatica angulosa , helder blauw	20	2—4	0.35
				— triloba , blauw	20	2—4	0.35
				— „ fl. pleno , dubbel blauw	20	2—4	0.85
				— „ alba , wit	20	2—4	0.40
				— „ rubra , rood	20	2—4	0.40
				— „ „ fl. pl. , dubb. rood	20	2—4	0.35
				Heracleum Mantegazzianum.			
				Gazonplant met reusachtige bladeren en witte bloemschermen . . .			
					150	7	0.35

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† HEUCHERA.				† Hypericum olympicum gracile. Zeer geschikte kleine rotsplant met gele bloemen			
Heuchera alba , witbloeiende variëteit	60	5—6	0.25		15	7—8	0.30
— brizoides Flambeau , aanbevelenswaardige variëteit, welke rijk bloeit met schitterend rose bloemen . .	60	7—8	0.30	† Iberis coraefolia	20	4—6	0.20
— brizoides gracillima . De bloempjes dezer nieuwe variëteit zijn zeer fijn, zacht-rose gekleurd en op lange stengels met draadvormige steeltjes gezeten	60	7—8	0.25	— sempervirens Little Gem . Een dwergachtige plant met sneeuw-witte bloempjes	10	4—6	0.20
— gracillima Perry's var. Met karmijnroode bloemen	60	7—8	0.40	— sempervirens Snowflake . Met groote sneeuw-witte bloemen. . .	20	4—6	0.20
— Pluie de feu , zeer mooie nieuwigheid met vuurroode bloemen; rijkbloeiend. Door de felroode kleur trekken de bloemen reeds van verre de aandacht. Uitstekend als snijbloem voor kleine vaasjes . . .	50	7—8	0.25	† — sempervirens superbus . Bovenstaande Iberis-soorten zijn langen tijd overdekt met zuiverwitte bloemen en bij uitstek geschikt voor rotspartijen en borders	30	4—6	0.20
— purpurea , met mooi donker blad	50	7—8	0.30	Imperata saccharifera (= Miscanthus sacchar.) Siergras. Met lange elegante zilveren pluimen en roodgeaderde bladeren. Bijzonder mooi	100		0.40
— rosea grandiflora , zeer lange bloemstengels met groote rose bloemen	60	6—7	0.25	† Incarvillea Delavayi . Schoone, uit China afkomstige plant, welke aan lange stengels groote op Gloxinia's gelijkende rose bloemen draagt. .	60	6	0.15
— sanguinea Shirley , met koraalroode bloemen	50	6—7	0.55	— grandiflora . De bloemen zijn veel grooter, fraaier en donkerder gekleurd dan van I. Delavayi . . .	30	5	0.15
— sanguinea splendens	50	6—7	0.25	Incarvillea grandifl. brevipes Nieuwe nog zeldzame variëteit met langere stengels dan de voorgaande			
— Walkers var.	50	5—6	0.30				
Bovenstaande variëteiten van Heuchera sanguinea hebben ijle trossen prachtig roode bloemen, op zeer dunne bloemstengels.							
				† Inula ensifolia . Vormt dichte polletjes, in den zomer overdekt met een massa goudgele bloemen . .	30	7—8	0.30
Hieracium aurantiacum , Alpenplant met levendig gekleurde, van goudgeel naar oranje en purper overgaande bloemhoofdjes	40	6—9	0.20	† — glandulosa grandiflora . Met zeer groote oranjegele straalbloemen	50	5—6	0.25
— rubrum , rood	40	6—9	0.20	† — grandiflora , met lange stengels en groote bloemen	70	6	0.30
Hottonia palustris , losdrijvende waterplant m. rozeroode bloemtrossen	40	5—6	0,15	† — macrocephala . Prachtige sierplant met zeer groote bladeren. De bloemstengels dragen aan het uiteinde groote, oranje-gele bloemen	120	6—8	0.25
Houstonia serpyllifolia , klein alpenplantje met hemelsblauwe bloemen	10	4—7	0.35	† Iris aurea , hooggroeiende soort met smalle bladeren en zuiver goudgele bloemen	100	8	0.30
Humulus lupulus aureus . Goudgele Hop, snelgroeiende klimplant die met hare heldergele bladeren een fraai effect maakt	600		0.50	— Forrestii , nieuwe uit China afkomstige soort met zwavelgele bloemen	60	6—7	0.40
Hutchinsia alpina . Alpenplantje met schitterend groene bladeren en zuiver witte bloemen. Groeit het best op droge plaatsen . . .	10	4—5	0.25				
Hydrocharis Morsus Ranae , waterplant		7—8	0.10	† IRIS GERMANICA.			
† Hypericum calycinum . Heesterachtige plant, met een groote menigte zuiver gele bloemen . . .	50	7—10	0.25	Deze Irissen zijn verbazend gemakkelijk te kweken, daar zij na het planten niet de minste zorg vereischen en bijna elke grondsoort voor lief nemen. Op een droge en zonnige standplaats zullen zij echter het rijkst bloeien. Zij bloeien Mei-Juni en de prachtige bloemen komen in de meest verschillende kleurnuances voor. Vooral als zij een jaar op dezelfde plaats hebben gestaan, bloeien zij bijzonder rijk. Om ze den eersten zomer na de planting volop in bloei te hebben, moet men ze reeds in Aug. of Sept. planten, ofschoon ze ook wel in 't voorjaar kunnen worden verplant.			
— fragile . De draadvormige stengels met kleine blaadjes kruipen over den grond en dragen een groote menigte goudgele bloemen . . .		7—8	0.30				
† — Moserianum . Met groote, gele bloemen, die met hare talrijke goudgele meeldraden een schoon effect opleveren	30	7—10	0.25				

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

*Iris aurea.*

†IRIS GERMANICA VARIËTEITEN

Onder deze rubriek worden door mij ook gerangschikt de verschillende variëteiten van *Iris*: *amoena*, *neglecta*, *orientalis*, *pallida*, *plicata*, *squalens* en *variegata*.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Annie Grey , zacht rose	5—6	0.30	
Aurea , goudgeel	5—6	0.25	
Bergiana , geel met donker violet	5—6	0.15	

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk
Bridesmaid , opstaande bloembladeren van matte lavendel-kleur; hangende bladeren wit, lavendel-kleurig geaderd		5—6	0.20
Darius , geel met lila, grootbloemig		5—6	0.15
Emilie , licht en donker purper		5—6	0.15
Emma , wit, lila getint		5—6	0.20
Florentina alba , wit, zacht lila gestr.		5—6	0.15
Fontarable , donker purper met lila, grootbloemig		5—6	0.15
Gajus , opstaande bloembladeren zuiver lichtgeel, hangende geel, rood gestreept		5—6	0.20
Gracchus , citroengeel, purper gestr.		5—6	0.20
Innocenza , sneeuw wit		5—6	0.20
Iriskönig . Deze prachtige nieuwigheid, een kruising tusschen <i>Iris pallida dalmatica</i> en <i>Iris germ. Maori King</i> , komt in groeiwijze overeen met de eerste en heeft ongeveer de kleur van de laatste. De bloem heeft citroengele opstaande bladeren, terwijl de breede hangende bladeren fluweelachtig donkerbruin zijn met een breeden, goudkleurigen rand		5—6	0.65
Kharput , (<i>asiatica</i>) licht en donker purper		5—6	0.15
Kochi , (<i>atro-purpurea</i>) grootbloemig donkerpaars		5—6	0.15
La Beauté , grootbloemig, prachtig hemelsblauw		5—6	0.25
Lohengrin . Met reusachtige bladeren en opvallend groote bloemen, die zacht zijdeachtig rose gekleurd zijn.		5—6	0.65
Loreley . Hangende bloembladeren, diep ultramarijnblauw, crème geaderd en met lichtgelen rand. Staande bloembladeren lichtgeel		5—6	0.30
Macrantha , grootbloemig paars		5—6	0.15
Mad. Chéreau , wit, lila gerand		5—6	0.15
Maori King , donker bruingeel met purper		5—6	0.15
Maritana , grootbl. zacht lila met wit		5—6	0.15
Miss E. Eardley , helder goudgeel met violet, prachtige nieuwe variëteit		5—6	0.75
Mrs. Allan Grey , helderroze, laatbl.		5—6	0.25
Mrs. Gladstone , wit purper geaderd		5—6	0.15
Mrs. H. Darwin , sneeuw wit, purper geaderd		5—6	0.15
Mrs. Neubronner , goudgeel extra		5—6	0.30
Mrs. Reuthe , zuiver wit en zacht lila, extra		5—6	0.15
Orientalis (<i>sanguinea</i>)		5—6	0.15
„ Snow Queen . Met groote mooigevormde sneeuw witte bloemen. Zeer rijkbloeiend		5—6	0.15
Pallida , lila		5—6	0.15
„ dalmatica , helder lila, extra grootbloemig. Zeer schoon		5—6	0.65

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Pallida Her Majesty , grootbl. lilarose		5—6	0.20	Joroshima , paarsrood, lila gestreept.		7—8	0.30
„ Khedive , licht en donker lila		5—6	0.30	Mrs. Stanley , paars met donkere aderen.		7—8	0.30
„ Queen of May , rose		5—6	0.25	Nagasaki , rosa-lila, violet gevlekt.		7—8	0.30
Pfaeuenaue , de opstaande bloem- bladeren zijn zuiver olijfgel, de onderste daarentegen bruinachtig met scherp afstekenden olijfgelen rand. Een opvallend kleurencontrast		5—6	0.65	Nippon , wit grootbloemig.		7—8	0.30
Princess Victoria Louise . Nieuwe variëteit; de staande bloembladeren zijn zwavelgeel, de hangende violet- rood, crème gerand		5—6	0.65	Paulus Moreelse .		7—8	0.30
Pusilla		5—6	0.20	Peking , paars-rood met wit centrum.		7—8	0.30
Rhein Nixe . Opstaande bloembla- deren zuiver wit, hangende diep violetblauw, wit gestreept. Prach- tige snijbloem		5—6	0.65	Pieter de Hooghe , violet-rood, met zeer licht lila centrum		7—8	0.30
Violacea , paars		5—6	0.15	Rangoon , blauw, van binnen licht lila.		7—8	0.30
10 stuks in 10 soorten, naar mijne keus f 1.50				Rembrandt , paarsrood met witte streepen.		7—8	0.30
100 stuks in 10 soorten naar mijne keus f 10.—				Rose Queen , langstelige rose bloemen		7—8	0.50
Iris gigantea (ochroleuca) , wit met geel		5—6	0.15	Shirwin , zeer licht rose gespikkeld.		7—8	0.30
				To Kwang , donkerblauw.		7—8	0.30
				Tokio , lila met violetkleurige aderen.		7—8	0.30
				Van Dijk .		7—8	0.30
				W. v. d. Velde , licht lila, violet ge- marmerd.		7—8	0.30
				Yokohama , wit met lila tint.		7—8	0.30
				10 stuks in 10 extra soorten naar mijne keus f 2.50			
				100 stuks in 10 soorten naar mijne keus f 20.—			
				† Iris laevigata albo purpurea . De grote bloemen zijn donkerblauw met witte vlekken		7—8	0.85
				— laevigata fol. var. Het breede donkergroene blad is zuiverwit ge- streept. Een van de mooiste bont- bladerige vaste planten met schit- terend blauwe bloemen		7—8	0.50
				† IRIS PUMILA HYBRIDEN .			
				Deze nieuwe hybriden zijn ontstaan door kruising der vroegbloeiende <i>Iris pumila</i> met grootbloemige <i>Iris germanica</i> . Ze bloeien even vroeg als eerstgenoemde en hebben in kleuren en vorm der bloem veel van de laatste over- genomen. Ze bloeien reeds in Mei, dus in een tijd, dat men nog weinig bloemen ziet.			
				Cyanea , donkerblauw	20	5	0.15
				Die Braut , zuiverwit	20	5	0.25
				Die Fee , blauw	20	5	0.20
				Eburna , geelachtig wit	20	5	0.20
				Excelsa , okergeel	20	5	0.15
				Florida , geel	20	5	0.15
				Formosa , donkerblauw	20	5	0.15
				Schneekuppe . <i>Iris</i> van dezelfde groeijwijze als de <i>germanica</i> -soor- ten. De opstaande en hangende bloembladeren zijn sneeuw wit, de laatste aan de keel groengeel ge- aderd	20	5	0.50
				Iris Pseudacorus , <i>Gele Zwaardlelie</i> , oeverplant	100	5—6	0.15
				— virginica	100	5—6	0.25
				† Lathyrus latifolius . Overblijvende pronkerwt met rose bloemen	150	6—9	0.25
				† — latifolius albus . Overblijvende pronkerwt met zuiverwitte bloemen	150	6—9	0.25

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

*Lathyrus latifolius White Pearl.*†*Lathyrus latifolius Rose Queen.*

Nieuwe grootbloemige helderroze variëteit, in mijne kweekerij ontstaan. (Getuigschrift v. Verdienste Amsterdam, Augustus 1916.) . . .

†— *latifolius White Pearl.*

De fraaiste overblijvende *Lathyrus* met bloemen die dubbel zoo groot zijn als die van de gewone witte. Men telt meestal 14 bloemen op de lange stevige stengels . . .

†*Lavatera Olbia.* Nieuw ingevoerde heesterachtige plant, met groote mooie rose Malva-achtige bloemen die in grooten overvloed het geheele jaar door verschijnen. Zij begint reeds te bloeien vroeg in Juni en bloeit onafgebroken door tot het laatst van October of November, wanneer de vorst den bloei vernietigt. De afgesneden stengels blijven 14 dagen goed en de knoppen bloeien bijna tot het einde uit. Op voedzamen grond uitgeplant, vormen ze reeds het eerste jaar zware struiken . . .

Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
-------------	-----------------	-------------------

200	7—10	0.50
-----	------	------

200	7—10	0.50
-----	------	------

150	6—11	0.35
-----	------	------

Lavandula Middachten var.
NIEUW! Lange bloemstengels met donkerpaarse bloemen . . .

— *Munstead var.* Vroegbloeiende, lage, nieuwe variëteit van het welriekende Lavendelkruid met groote trossen paarse bloemen. Wanneer men de afgesneden bloemstengels droogt, verspreiden deze zeer langen tijd een heerlijken geur. (Bekroond te Londen '16.) . . .

†*Liatris callilepis*, helder karmijnrose . . .

†— *scariosa*. Met donker-purpere bloemen . . .

— *spicata*. Met lange purperachtig roode bloemen. Zij groeit het best in lichten tuingrond en op een halfbeschaduwde standplaats . . .

Ligularia Jacquemontana. Met zeer groot blauw-groen blad en een menigte groote, gele bloemen . . .

— *stenocephala*. Met groote bronsgroene bladeren en goudgele bloemen . . .

— *stenocephala globosa* . . .

Lithospermum prostratum. Met donkerblauwe, trechtersvormige bloemen . . .

— *prostratum Heavenly Blue*. Nieuw, lichtblauw . . .

Beide *Lithospermums* kunnen tot de mooiste Rotsplanten worden gerekend. De bloemen doen aan de Vergeet-mij-niet denken en steken met hun schitterende blauwe kleur goed af tegen het donkergroene loof dat over den grond kruipt. Ze bloeien den geheelen zomer.

†*Lupinus polyphyllus*. Krachtige, hooggroeiende Lupine met lange bloemaren in blauwe tinten . . .

†— *polyphyllus albus*, zuiver witte variëteit der voorgaande. Zeer geschikt voor snijbloemen . . .

†— *polyphyllus Moerheimi*. Een der beste door mij ingevoerde nieuwigheden. De hoofdbloei valt in den voorzomer, evenwel volgen nog bloemstengels tot in het najaar. De prachtige trossen verheffen zich flink boven het sterke loof en zijn dicht bezet met lichtrose gekleurde bloemen . . .

†— *polyphyllus roseus*. Rose bloeiende Lupine . . .

†*Lychnis chalcidonica alba plena*. Dubbele witte Konstantinopel . . .

†— *chalcidonica rubra*. Konstantinopel met schitterend scharlaken roode bloemen . . .

†— *chalcidonica rubra plena*. Dubbele Konstantinopel met scharlakenroode bloemen . . .

Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
-------------	-----------------	-------------------

40	7—8	0.40
----	-----	------

30	7—8	0.30
----	-----	------

60	8—9	0.20
----	-----	------

60	8—9	0.20
----	-----	------

45	9	0.20
----	---	------

180	8	0.30
-----	---	------

120	8	0.30
-----	---	------

80	7—8	0.55
----	-----	------

	5—9	0.35
--	-----	------

	5—9	0.35
--	-----	------

100	6—7	0.15
-----	-----	------

100	6—7	0.15
-----	-----	------

80	6—8	0.50
----	-----	------

100	6—7	0.25
-----	-----	------

60	6—7	0.35
----	-----	------

80	6—7	0.25
----	-----	------

80	6—7	0.45
----	-----	------

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Lychnis diurna rosea plena. Met grootte, dubbele, rozeroode bloemen	60	5—6	0.30	Mentha rotundifolia fol. var., krui- pend. Met zilverbont blad . . .		6—8	0.25
† viscaria splendens plena. Fraaie dubbele, vuurroode Lychnis, die buitengewoon rijkbloeiend is. Deze plant, die vroeger meer algemeen bekend was onder den naam van „Pekanjer,” wordt thans weinig meer in de tuinen aangetroffen. Ze verdient echter alle aanbeveling .	40	7—9	0.25	Menyanthes trifoliata, Waterdrie- blad; waterplant met vleeschkleu- rige bloemen	30	5—6	0.15
Lysimachia dahurica	60	7—8	0.50	Menziesia empetrifolia. Kruipend met mooie rose-roode bloemen . .	5	5—7	0.45
— Fortunei	60	7—8	0.50	Mertensia echlioides elongata. Al- penplant met tallooze gentiaan- blauwe bloemen	30	5—7	0.45
— velutina	60	7—8	0.50	— primuloides. Met diep donker- blauwe bloemen, overgaande in purper en geel oog. Deze soort komt veel overeen met eene Myo- sotis	15	5—6	0.30

LYTHRUM.

De Lythrums zijn alle zeer rijkbloeiende zomerbloemen. De bloemen hebben verschil- lende nuances van rose en zijn dicht aaneen op de lange stengels gezeten.

† Lythrum roseum superbum, grootbl. helderrose	180	7—8	0.20
† — roseum superbum Perry's var., glanzend kersrood	90	7—8	0.20
† — salicaria Brightness. Sierlijke bloemstengels met zuiver rose bloemen	90	7—8	0.20
† — salicaria Rose Queen, helder rose	90	7—8	0.25
† — virgatum roseum	90	7—8	0.25
† — virgatum Rose Queen. Door de prachtige rose bloemen aan dunne stengels is zij uiterst ge- schikt als snijbloem. Een der mooiste van deze soort	90	7—8	0.25
Maianthemum racemosum. Uitste- kende, lelieachtige schaduwplant .	15	5—6	0.50
† Malva moschata. Rose bloeiende Kaasjesbloem	60	6—8	0.15
† — moschata alba, witte Kaasjes- bloem	60	6—8	0.15
Meconopsis cambrica fl. pl. Zeld- zame plant met dubbele, oranjegele bloemen, die aan Papavers doen denken	80	7—9	0.45

MEGASEA.

De Megasea's behouden hare fraaie hart- vormige of ovale lederachtige bladeren ook des winters en bloeien bovendien in een tijd wanneer men haast geen andere bloemen ziet. Zeer geschikt voor rotspartijen; groeien ook in vochtigen bodem bij watervallen of vijvers.

Megasea ciliata, rose	30	4—5	0.40
— cordifolia purpurea. Groeit for- scher dan <i>M. speciosa</i> en de bloemen zijn donkerder van kleur	40	3—5	0.40
— (Saxifraga) speciosa, rose . . .	20	11—4	0.25
Melittis Melissophyllum, rose . .	30	6—7	0.30
— Melissophyllum album, wit . .			
Bovenstaande beide <i>Labiatae's</i> zijn zeer gezocht door de bijen .	30	6—7	0.50

† — sibirica	30	5—6	0.25
† — sibirica ciliata	30	5—6	0.30
Beide laatste variëteiten hebben blauwe bloemen aan lange bloem- stengels, die als trossen hangen.			
Meum athamanticum. Met fijn in- gesneden en heldergroen blad, de bloemen zijn onaanzienlijk . . .	25		0.20
Miscanthus saccharifera, zie <i>Imperata</i> .			
† Monarda didyma Cambridge Scar- let. Donkerroode variëteit van de bekende gewone soort	60	6—7	0.20
— Ramaleyl, rose	50	8—9	0.30
— violacea superba, purper-violet		7—9	0.30

† MONTBRETIA.

De Montbretia's behoren tot de dankbaarste en rijktbloeiende planten. Boven de riet- achtige bladeren verheffen zich de elegant ver- takte bloemtrossen, die gevormd zijn uit ster- achtige bloempjes van een kleur, die variëert tusschen geel, oranje en donkerrood. Zeer geschikt voor bouquets.

Het uitplanten der bollen geschiedt in April of Mei; in den herfst moeten ze opgenomen worden om droog en vorstvrij gedurende den winter te worden bewaard. Men kan ze even- wel onder een goede bedekking ook buiten doen overwinteren.

Montbretia America. Rijkbloeiend, met donker oranjegele bloemen en een donkerrood centrum	60	7—11	0.15
— Geo Davison. Met groote wijd- openstaande licht oranjegele bloe- men	60	7—11	0.15
— Germania. Met groote, wijdopen- staande bloemen, van een prachtige oranje-roode kleur	100	7—11	0.15
— King Edmund. Met dichte sten- gels, welke goudgele bloemen dragen, die van buiten donkerder gekleurd zijn, ruim 7 cm. doorsnede hebben en zes tot acht chocolade- kleurige vlekken aan de keel ver- toon	120	7—11	0.20
— Lady Hamilton. Bloeit zeer rijk met gele bloemen. Bekroond te Londen	100	7—11	0.15
— Le Pactole. Prachtige, nieuwe verscheidenheid met groote goud- gele bloemen en bruin centrum .	60	7—11	0.15

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Montbretia Lord Nelson. De donkerste van alle. Met zeer donkere, purperkleurige stengels, welke goed vertakt zijn. De bloemen hebben een doorsnee van 6½ cm., zijn donker oranje-rood en aan de buitenzijde karmozijnrood. De bloembladeren zijn van een fraaien vorm, het oog is geel	100	7—11	0.50	Nymphaea alba, Witte Waterlelie .			0.35
— Martagon. De bloemen zijn groot, donker oranje met bruin hart met teruggeslagen bloembladeren, waardoor de bloemen aan die van <i>Lilium Martagon</i> doen denken	60	7—11	0.15	— aurora , grootbloemige variëteit, zeer rijkbloeiend. De bloemen welke bij het opengaan geel met rose zijn, worden spoedig fraai rood			2.—
— Messidor. De groote bloemen zijn zacht stroo-geel	60	7—11	0.35	— Froebeli , een der beste roode waterlelies. De groote bloemen zijn donker wijnrood. Zeer sterke soort			2.50
— Norvic , met groote gele bloemen	50	8—11	0.20	— Gladstoniana , reusachtig en sneeuwwitte bloemen, goudgele stampers			2.—
— Oriflamme	60	7—11	0.10	— James Brydon , met groote rose bloemen			4.50
— Prometheus. Uit Engeland ingevoerde nieuwe <i>Montbretia</i> . De bloemstengels vertakken zich sterk en zijn rijk voorzien van groote oranje-roode bloemen met donker-roode vlek bij het hart	100	7—11	0.90	— laydeckeri purpurata , met groote helder karmozijnroode bloemen; sterke en rijkbloeiende soort . .			2.50
— Rheingold. De kleur is schitterend goudgeel, terwijl het iets lichtere centrum bruinachtig rood geteekend is	60	7—11	0.35	— laydeckeri rosea prolifera . Buitengewoon rijkbloeiend met kleinere welriekende bloemen, die bij het opengaan vleeschkleurig zijn en later rose en donkerkarmijn worden; de beste voor kuipen en ondiepe basins			5.—
Montbretia Star of the East. Prachtige nieuwe variëteit met oranjegele bloemen. <i>Extra grootbloemig</i> , de mooiste van allen	60	7—11	0.65	— marliacea albida , met enorm groote zuiverwitte bloemen . . .			2.—
Montbretia St. Botolph , grootbloemig heldergeel		7—11	0.20	— marliacea carnea , zacht vleeschkleurig, grootbloemig			2.—
— Tragédie , rood		7—11	0.25	— marliacea chromatella , prachtige lichtgele bloemen en donkerbruin gemarmerd blad			1.50
— Vésuve . Scharlakenroode bloemen met goudgeel hart		7—11	0.15	— odorata rosea , met rose bloemen			1.50
— Zonnebloem , met oranjegele bloemen		7—11	0.15	— Paul Harlot , grootbloemig kopergeel, zeer mildbloeiend			3.50
Mulgedium giganteum. Sierplant met groote bladeren en lichtblauwe bloemen	150	7—8	0.30	Oenothera fruticosa major	40	7—8	0.25
Nepeta longiflora	100	6—8	0.30	— fruticosa	40	7—9	0.25
— macrantha , (= <i>Dracocephalum sibiricum</i>) met zachtblauwe bloemen	100	6—7	0.25	— missouriensis , met buitengewoon groote zwavelg. bloemen. Kruipend	30	7—9	0.20
— Mussinil. Zeer rijkbloeiende plant met lila-blauwe bloemtrossen en grijs blad	30	6—7	0.35	— Nuttall	10	5—9	0.50
Nesaea salicifolia	80	7—8	0.55	— riparia , geel	30	7—8	0.25
Nierembergia rivularis. Aardig kruipend plantje met zuiverwitte klokvormige bloemen		5—6	0.30	† — speciosa grandiflora . Met groote witte bloemen, die ook den geheelen dag openblijven	60	7—9	0.30
Nuphar luteum, Gele Waterlelie . .		6—8	0.15	— Youngi . Rijkbloeiend met donkergele bloemen	50	7—9	0.25
NYMPHAEA (Waterlelies). Behalve de bekende gele en witte zijn ook een groot aantal andere Waterlelies hier volkomen winterhard. De door mij aangeboden planten zijn zonder eenige bedekking buiten gekweekt. De verzending heeft bij voorkeur in de maand Mei plaats.				Omphalodes cappadocica. Nieuw, m. groote bladeren en groote donkerblauwe bloemen	25	4—5	0.30
				† — verna . Voor deze plant, met hemelsblauwe Vergeet-mij-nietachtige bloemen is een half beschaduwde standplaats wenschelijk	30	3—5	0.15
				— verna alba . Witte variëteit der voorgaande. Beide bloeien dikwijls in het najaar nog eens	30	3—5	0.15
				Orobis alatus	5		0.25
				— Gmellini , lila	30	5—6	0.15
				— lathyroides . Een der vroegste planten met donkerpaarse bloemen	50	4—5	0.15
				— Smithi , zeldzaam	30		0.25
				— superbus , met paarsbl. bloemen .	50	5	0.30
				— varius . Zeldzame plant, die zeer vroeg bloeit met zalmkleurig rose en gele bloemen	35	4—5	0.55

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ” ”



Nymphaea Marliacea.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Orobis vernus, rose	30	5	0.25
— „ albus, wit	30	5	0.35
— „ roseus, met zacht- rose bloemen; zeer geschikt voor rotspartijen	30	5	0.25
— vernus purpureus major		5	0.55
Oxalis enneaphylla. Zeldzame plant van de Falklandeilanden met witte bloemen	5	6—8	0.80

† **PAEONIA SINENSIS**
(PIOENROOS).

Door hybridisaties is men er de laatste jaren in geslaagd pioenrozen in allerlei kleuren te verkrijgen, waarvan ik de beste in dezen catalogus heb opgenomen. Opdat ze goed zullen groeien en bloeien, moet de grond flink diep worden omgespit en bemest. Eerst het tweede of derde jaar na de planting kan men volop bloemen verwachten.

Enkelbloemige variëteiten.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Clothos, rose		5—6	0.30
Comus, karmijnrose		5—6	0.30
Festiva fragans, grootbloemig licht- rose		5—6	1.—
Goliath, donkerrood		5—6	0.55
Hermes, donkerrose		5—6	0.40
Lemon Queen, wit met geel centrum		5—6	0.55
Medon, vleeschkleur, in wit over- gaand		5—6	0.30
Red Queen, donkerrood		5—6	0.75
Trophy, rose		5—6	0.40

Whittley Major. Met enorm groote,
zuiver witte bloemen en oranje-
kleurige meeldraden, op zeer
lange en stevige bloemstengels.
De mooiste enkele witte Pioen .

5—6 0.85

Wilbur Wright, donkerrood 5—6 0.65

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Dubbelbloemige variëteiten.				PAEONIA HYBRIDEN.			
Agida , violet rose, halfdubbel . . .		5—6	0.25	Deze planten zijn ontstaan door kruisingen van <i>P. sinensis</i> met <i>P. Witmanniana</i> . Zij bloeien evenals laatstgenoemde zeer vroeg, namelijk in het midden van Mei en dus eenige weken vóór dat de <i>P. sinensis</i> beginnen te bloeien. De bloemen zijn enkel.			
Albâtre , ivoorwit met licht gestreept midden		5—6	0.65	Avant-garde , zachtrose met goudgele meeldraden		5	3.—
Birket Foster , dubbel rood		5—6	0.50	Le Printemps , groote bloem, kleur roomgeel, gele meeldraden, stempel karmijnrood		5	3.—
Canari , wit met crème weerschijn		5—6	0.35	Mal-Fleuri , vleeschkleurig wit met zalmkleurige tint, gele meeldraden		5	3.50
Carnea superba , licht vleeschkleurig rose		5—6	0.50	Paeonia Anemonaeflora rosea			0.40
Charlemagne , room- tot vleeschkleurig		5—6	0.35	— lobata			0.50
Cytéré , vleeschkleurig		5—6	0.30	— lutea , prachtige nieuwe soort van het Yunnangebergte afkomstig. De groeiwijze komt wel wat met die van een boompioen overeen. De bloemen zijn levendig <i>botergeel</i> . Voortreffelijke nieuwigheid		6—7	0.65
De Jussieu , dubbel licht rose		5—6	0.30	— officinalis alba plena , dubbel wit		5—6	0.85
Duc de Cazes , karmijnrose, naar het midden in zalmkleur overgaand		5—6	0.35	— „ mutabilis plena , rose in wit overgaand		5—6	0.30
Duchess of Teck . Zeer groote platte bloem, roomwit met karmijnroode vlekken in het midden; laatbloeiend. De plant is zeer gezond en buitengewoon rijkbloeiend. Een der allerbeste om voor snijbloem te gebruiken		5—6	0.65	— officinalis rosea plena , groote dubbele schitterend rose bloemen			0.35
Duchesse de Nemours , (Calot), crēmewit, extra		5—6	0.30	— officinalis rosea superba		5—6	0.65
Edmond Lebon , schitterend rose met zilveren weerschijn		5—6	0.35	— „ rubra plena , dubbele groote karmijnroode bloemen		5—6	0.25
Festiva , wit met karmijnroode vlekken „ maxima , zuiver wit met purperkleurige vlekken		5—6	0.50	— tenuifolia fl. pl. , zeer fraai oud soort met mooie donker karmijnroode, dicht gevulde bloemen en sierlijk fijn ingesneden blad		5—6	0.65
Helena		5—6	0.20				
Lady Mayoress , donkerrose met licht centrum		5—6	0.60				
La Rosière . Groote platte bloem, vrij goed gevuld met gele meeldraden in het midden. De rand der bloembladeren is crème-achtig wit; de bloem doet denken aan een geopende theeroos. Middelhoog		5—6	0.25				
Lord Derby , prachtig donkerrood		5—6	0.65				
Marconi , halfdubbel, lilarose		5—6	0.40				
Marie Lemoine , zuiverwit met crēmewit overschaduw centrum; extra grootbloemig		5—6	0.35				
Modesty , purper rose		5—6	0.20				
Mr. Charles Levêque , (= Madlle Léonie Calot) zuivere zalmkleur, zeer goede pioen		5—6	0.45				
Noémi Demay , grootbloemig, vleeschkleurig met zilveren weerschijn; vroegbloeiend		5—6	0.45				
Philomèle , zachtrose met goudgeel centrum		5—6	0.55				
Queen's Perfection , zeer licht rose met lila tint		5—6	0.55				
Roem v. Boskoop , (= Mad. Calot). Vleeschkleurig wit, naar het midden overgaand in zwavelgeel		5—6	0.40				
Signorinetta , licht lilarose, naar het midden lichter		5—6	0.55				
Solfatare , zacht lilarose in wit overgaand		5—6	0.35				
Territorial , lichtrose, lila getint, grootbloemig en rijkbloeiend		5—6	0.40				
Tricolor grandiflora , vleeschkleurig met okergeel hart; grootbloemig		5—6	0.25				
Vertumnus , lila rose met vleeschkleurig midden		5—6	0.20				
				† PAPAVER ORIENTALE.			
				Bij de tegenwoordig heerschende voorliefde voor groote, langstelige bloemen, worden deze planten zeer terecht meer algemeen gewaardeerd. Voor versiering in groote vazen zijn ze bijzonder geschikt. Ook maken ze groepsgewijze in een gazon of bij heesters, met hare schitterende bloemen, die reeds van verre de aandacht trekken, een zeer fraai effect. Ze bloeien in Juni-Juli, maar ook gedurende den geheelen zomer en in het najaar komen af en toe nog bloemen te voorschijn. Hoogte 50 tot 100 cm.			
				In soorten naar mijn keus, <i>per 10 stuks f 1.60.</i>			
				Beauty of Livermere , donker bloedrood		6—7	0.25
				Blush Queen , prachtig zacht rose		6—7	0.25
				Goliath . De enorme rechtopstaande stengels, eindigen in zeer groote schitterend scharl. roode bloemen	150	6—7	0.25
				Grossfürst , groote, goedgevormde, donkerroode bloemen met zwarte vlekken		6—7	0.25
				Jennie Mawson , met groote, mooie, goed ontwikkelde bloemen van een zalmkleurig rose, die rechtop op stevige stelen staan		6—7	0.30
				Lady Moore , NIEUW! zacht rose		6—7	0.30

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Mahony. Deze is ongetwijfeld de donkerste die bekend is. Voor eenige jaren werd zij door mij gewonnen. Haar kleur is van het donkerst karmijnrood, zich neigende naar het bruin van donker mahonyhout . .			0.20
Marie Studholme, zalmkleurig rood met karmijn aan den voet der bloembladen			0.25
Mrs. John Harkness, oranje scharlakenrood			0.20
Mrs. Perry, met enorm groote bloemen van een eigenaardig abrikooskleurig oranje			0.20
Oriental King, grootbl. scharl. rood			0.25
Oriflamme, met buitengewoon groote prachtige oranjerode bloemen, welke 25 cm. in doorsnede zijn . . .	90		0.20
Perry's White. Nieuwe variëteit, in groei- en bloeiwijze gelijkende op de bekende Mrs. Perry met bloemen van een zuiver satijnachtig witte kleur met donkere vlek . .			0.20
Princess Ena. Deze onderscheidt zich van de andere soorten door hare helder oranje-zalmkleurige bloemen van een onberispelijken vorm; zeer rijkbloeiend			0.20
Princess Victoria Louise, prachtige nieuwe Papaver met zacht zalmkleurig-rose bloemen			0.20
Queen Alexandra, grootbl. nieuwigheid van prachtig zalm-rose kleur			0.20
Rembrandt. Oranje-scharlaken. Zeer grootbloemig			0.25
Silver Queen. De bloemen zijn vleeschkleurig, bijna wit, met een schoone zilverachtige tint			0.20




Pentstemon Southgate Gem.

Parnassia palustris. Vroegbloeiende moerasplant m. helderwitte bloemen	25	6—7	0.30
Pentstemon barbatus, zie <i>Chelone barbata</i> .			
†— Mrs. F. Fulford. Nieuwe variëteit met prachtige groote karmijnroode bloemen. Zeer rijkbloeiend . . .	50	7—9	0.50
† Newbury Gem. Met schitterend karmijnroode bloemen. Bloeit zeer lang en rijk	75	7—9	0.30
†— Southgate Gem. Met schitterend karmijnroode bloemen, tweemaal zoo groot als die van Newbury Gem. Van binnen bijna geheel wit gekleurd		7—9	0.35
†— tubiflorus, met witte bloemen op lange stengels	60	7—9	0.25
Petasites japonicus giganteus. Plant met enorm groote decoratieve bladeren, die echter een paar jaar vast moet staan om zich tot volle schoonheid te kunnen ontwikkelen . . .			0.20

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Phalaris arundinacea fol. var. Zilverbont siergras, dat veel gebruikt wordt voor randen	150		0.30
— arundinacea elegantissima picta	150		0.30
Phlox amoena rosea. Prachtige plant die enorm rijk bloeit, zoowel in het voor- als najaar, met schitterend rose bloemen. Zeer geschikt voor rotsen, randen en lage perken . .	10	5—6	0.20
† PHLOX ARENDSI.			
Deze nieuwe Phloxen zijn ontstaan door eene kruising van <i>P. canadensis</i> met <i>P. decussata</i> . De bloei volgt direct op die der voorjaars-Phloxen en duurt tot de decussata-variëteiten volop bloeien. De rijkvertakte planten bereiken een hoogte van ongeveer 40—60 cm.			
Amanda, helder lila bloemen met een donkerder midden	35	6—8	0.30

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

Veld met *Phlox decussata*.

†PHLOX ARENSI (vervolg).

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Charlotte. De bloemen, die eene doorsnede hebben van ongeveer 3 cm., zijn wit met een zacht lila rose weerschijn en donker lila oog. De mooiste en meest aanbevelenswaardige van de Arendsi-variëteiten	60	6—8	0.25
Grete, witte bloemen; rose knoppen	50	6—8	0.35
Hanna, purperrose	40	6—8	0.30
Helene, met lichtlila bloemen . . .	40	6—8	0.35
Hilda, wit met zacht-lila weerschijn en helder-rose oog	40	6—8	0.35
Käthe, rose bloemen met donker oog, dat door een lichten rand is omgeven	50	6—8	0.30
Lisbeth. De bloemen, welke zich uit lila knoppen ontwikkelen, zijn wit met zacht lila onderzijde	60	6—8	0.55
Louise, met helder lila bloemen en lila-karmijn oog. Krachtige, rijkvertakte planten	60	6—8	0.35
Sophie, met groote trossen zuiver-witte bloemen	45	6—8	0.30

†PHLOX DECUSSATA.
(HERFST-SERINGEN.)

Ze beginnen te bloeien in Juli en bloeien den geheelen nazomer door tot somtijds in het begin van October. De zoetgeurende bloemen, welke in de rijkste kleurschakeringen voorkomen, bewaren, als ze afgesneden zijn, lang hare frischheid.

Nieuwere extra
grootbloemige soorten.

Afrika, karmijn-purperkleurig met donker bloedrood oog	0.25
Amerika, zalmkleurig rose met karmijnrood oog	0.30
Australië, m. karmijnvioletten bloemen	0.25
Azië. Lila-rose met helder karmijnrood oog; middelhoog	0.25

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

†PHLOX DECUSSATA (vervolg).	Hoog cm.	Bloei- tijd	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Baron van Dedem. Eene nieuwigheid, welke in mijne kweekerij is ontstaan. De bloemen komen veel overeen met die van Coquelicot, doch zijn ongeveer tweemaal zoo groot. Zij bloeit met groote trossen scharlakenroode bloemen. Door hare groote bloemen en hare opvallend schitterende kleur is dit een nieuwigheid van zeer groote waarde			0.20				0.25
Baron v. Heeckeren. Nieuw! Eigen- gewonnen zeer grootbloemige variëteit. Bloeit met groote trossen zalmkleurig rose bloemen			0.60				0.25
Boschlust. Hooggroeiende ouderwetsche soort met enorme trossen kleine lilakleurige bloemen			0.20				0.20
Comtesse de Jarnac, bontbladerig			0.25				0.25
Deutschland. Nieuwe soort met groote trossen schitterend donkeroranje bloemen			0.65				0.25
Dr. Königshöfer. Nieuw. Vurig scharlakenoranje met donker bloedrood oog en met gevulder trossen dan Coquelicot			0.45				0.15
Elisabeth Campbell. De groote bloemtrossen dezer nieuwe Phlox vormen prachtige bouquets. De bloemen zijn licht zalmkleurig met rose hart. <i>Extra</i>			0.25				0.15
Europa. Sneeuw wit met zilverwitten weerschijn, en met een opvallenden, karmijnrooden ring. Groote, dichte trossen			0.20				0.15
Frau Ant. Buchner. Zuiver wit; lange trossen met enorm groote bloemen. Zeer sterke groeier. De beste witte			0.15				0.20
Gartendirektor Brodersen. Licht karmijnrood met donker oog. Grootbloemig			0.20				0.25
G. A. Strohleln. Met groote oranjeachtig scharlakenroode bloemen en schitterend karmijn oog			0.20				0.25
Generaal van Heutsz. Deze nieuwe door mij gewonnen Phlox draagt zeer groote bloemtrossen met kolossale bloemen, die zalmkleurigrood gekleurd zijn met een zuiver wit centrum			0.20				0.25
Goliath. Eigengewonnen nieuwigheid; de trossen zijn pyramidaal gevormd en karmijnrood, terwijl elke bloem een donker oog heeft	180		0.20				0.25
Gruppenkönigin. Vleeschkleurig rose, met karmijn oog			0.20				0.25
Hajo Ellers, wit met lila, laag			0.20				0.25
Hans Vollmöller. Lila met wit; grootbloemig			0.20				0.25
Hermine, zeer lage, witte variëteit			0.20				0.25
				Hervor, karmijnrose met zalmkleurigen weerschijn en helder wit oog			0.25
				Jules Sandeau. Met zeer groote zuiverrose bloemen; laag			0.25
				Le Printemps, rose met wit oog, grootbloemig, laag			0.20
				Lofna, zachtrose grootbloemig			0.20
				Marcel Turbat, groot zilverbont blad, bloemen als van Eclairer			0.35
				Mevrouw Noordewier, rozerood met zuiver wit hart, mildbloeiend			0.25
				Miss Ellen Willmott, zeer aparte, zacht lila kleur met lichter midden			0.25
				Muriel Rogers, zacht rose met karmijn oog			0.25
				Reichsgraf v. Hochberg, schitterend amarant purper			0.20
				Rheingau, goed gevormde witte bloemen; knoppen en stengels donker violet			0.25
				Riverton Jewel, nieuwe variëteit met bloemen van een mauve-rose kleur en schitterend karmijnrood oog			0.25
				Rosa mundi, met groote zacht-rose bloemen, extra			0.15
				Rijnstroom, nieuwe Phlox met bloemen van een schitterend rose kleur, het meest gelijkend op Panthéon. De groeiwijze is echter forscher en de bloemen zijn grooter			0.15
				Selma. Door mij gewonnen hybride. Zij is sterk groeiend, geeft een groote tros met groote lichtrose bloemen, met kersrood hart			0.15
				Tapis Blanc. zeer laaggroeiend, zuiver wit. <i>Extra grootbloemig</i>			0.15
				Thor, grootbloemig zalmkleurig rood met bloedrood centrum			0.20
				Wanadis, lila met violet rood oog			0.25
				Widar, violetblauw met zuiver wit oog. Mooie groote trossen			0.25
				William Ramsey, donker purper			0.25
				ALGEMEENE COLLECTIE.			
				<i>Onderstaande variëteiten p. st. f 0.20, p. 10 st. f 1.60. p. 100 st. f 12.—.</i>			
				Aegir, schitterend scharlakenrood, verbrandt niet.			
				Antonin Mercier, donker lila met wit oog, laaggroeiend.			
				Arthur Ranc, zacht rose, groote tros.			
				Aurore, schitterend rose.			
				Béranger, licht rose, in wit overgaand.			
				Braga, levendig lila rose.			
				Caran d'Ache, zalmkleurig rose.			
				Clara Benz, schitterend rosekarmijn, met lila oog; laag.			
				Coquelicot, oranje scharlaken.			
				Crépuscule, zilverachtig mauvekleurig met helder karmijnrood oog.			
				Dr. Charcot, donker violet.			

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

†PHLOX DECUSSATA (vervolg).	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Eclairer , karmijn-violet met rose centrum.				Phlox ovata caroliniana , weinig bekende plant met helderroze bloemen op lange stevige stengels. Zeer mooi voor rotspartijen . . .	30	6	0.25
Etna , diep koraalrood.				— setacea Alice Wilson , lilarose . .	10	5—6	0.25
Eugène Danzanvilliers , lila met wit.				— „ atro-purpurea , rood . .	10	5—6	0.25
Fernand Cortez , oranje met purper.				— „ frondosa , helderroze . .	10	5—6	0.25
Flambeau , oranje scharlakenrood met donker oog.				— „ Moerheimi . Een uitstekende nieuwigheid, welke in mijne kweekerij is ontstaan. De groei is gedrongen en de stengels staan stevig overeind; enkele planten bij elkander geplaatst vormen in den bloeitijd een tapijt van schitterende karmijnrose bloemen. <i>Uiterst geschikt als rotsplant</i>	10	5—6	0.30
Flora Hornung , wit met groot karmijnrood oog, laaggroeiend.				— setacea Morgenstern , wit met roode ster		5—6	0.25
Freifraulein von Lassberg , zuiver sneeuwwit.				— setacea nivalis . Eenig mooi rotsplantje met prachtig witte bloempjes	10	5—6	0.25
Gloire de Maroc , violet met bruin midden.				— setacea rosea lilacina , lila-rose	10	5—6	0.25
Hanny Pfeiderer , licht rose, overgaand in zalmkleur met karmijnrood oog.				— „ Sensation , karmijn-rose. De Phlox-setacea-soorten zijn zeer schoone kruipende planten, die rijk bloeien en voor randen en rotspartijen zeer aan te bevelen zijn.	10	5—6	0.25
Iris , purperblauw.				— verna , kruipend met donkerrose bloempjes		5—6	0.30
Jean Dupuis , mauve met wit oog.				† Physalis Bunyardi . Een hybride tusschen Ph. Alkekengi en Ph. Franchetti, welker stengels bezet zijn met groote, scherp gepunte scharlakenroode vruchten	60	7—9	0.15
Josephine Gerbeaux , wit met rood oog, grootbloemig.				†— Franchetti . Chineesche lampionplant. De oranjeroode zaadkelk bereikt een middellijn van 5 à 6 cm. Zeer merkwaardige plant. Blijft in vazen lang goed	50	7—9	0.15
Le Mahdi , zeer donkere violetkleur.				† Physostegia virginica alba , wit . .	75	6—8	0.20
Loki , zuiver zalmkleurig rose met donker karmijnrood oog.				†— virginica rubra , lichtrose . . .	75	6—8	0.20
Mad. Paul Dutrie , zacht rose bloemen, die wit gevlekt zijn.				Deze beide planten behooren tot de schoonste vaste planten, zoowel voor snijbloemen, als voor borderbeplanting. Ze hebben de eigenaardigheid, dat men de bloemen heen en weer kan doen draaien en een bepaalden stand aannemen.			
Margarete Closs , zalmkleurig met karmijnrood oog.				†— virginica speciosa (imbricata) , met prachtige rose bloemen . . .	100	7—8	0.20
Météore , zacht rose met licht hart, extra grootbloemig.				† Pittyspermum acerinum . Met vederachtige witte bloempluimen .	90	8—10	0.25
Mrs. Arthur Baker , zalmkleurig rose.				Platycodon , zie <i>Campanula grandifl.</i>			
Mrs. Oliver , zalmkleurig met wit hart.				Plumbago Larpentae , rijkbloeiend met lavendelblauwe bloemen . .	30	9—10	0.45
Nana coerulea , laag; bloeit rijk met mooie paarse bloemen.				Podophyllum Emodi major . Zeer eigenaardige vroegbloeiende plant, met mooi gemarmerd blad. De langgesteelde licht rose bloemen komen boven het blad, dat tijdens de bloei als bevroren schijnt. Zeer zeldzaam	90	4—5	0.50
Pantheon , schitterend donkerrose.				† Polemonium Richardsoni , een weinig bekende, uit Amerika ingevoerde plant. De bloemen hebben een hemelsblauwe kleur met goudgele meeldraden	50	5—7	0.25
Rosenberg , karmijnviolet met bloedrood oog.							
Sigrid Arnoldson , vurig karmijnrood met donker centrum.							
Sofie Cordes , zacht lila met wit.							
Tolstoï , koperachtig amarant met bloedrood oog.							
W. C. Egan .							
<hr/>							
† Phlox suffruticosa Magnificense , purperkarmijn	50	6	0.35				
†— suffruticosa Snowdon , sneeuwwit, bijzonder rijdbl., zeer schoon voor perken en bouquets	50	6	0.25				
†— divaricata (canadensis) , met licht lila bloemtrossen, op stevige bl.stengels. Prachtige voorjaarsplant	20	4—6	0.20				
†— divaricata alba , witbloeiende variëteit van de voorgaande	20	4—6	0.30				
†— divaricata Laphami (Perry's variety) . De bloemen dezer variëteit zijn veel groter en levendiger gekleurd dan die der oorspronkelijke soort	30	5—6	0.30				
†— divaricata Violet Queen , nieuwe variëteit welke vroeg en rijk bloeit met fraaie violet-blauwe bloemen	30	4—6	0.30				
— glaberrima hybrida , bijzonder rijkbloeiend met middelgroote, rose bloemen	50	5—6	0.35				

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Polemonium Richardsoni album , met zuiverwitte bloemen	50	5-7	0.25	Laurium , geel met rood gevlekt.			
Polygonatum multiflorum , bekende <i>Salomonzegel</i>	90	5-6	0.20	Lemoine , schitterend rood met donker hart, geel gerand.			
† Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum (= <i>polystachyum</i>). Indien men deze plant laat in den herfst ziet, met aan elk harer takken grootte rose-achtig witte bloemtros- sen, zoo zou men haar eerder voor een heester aanzien, dan voor een vaste plant, welker bladeren en stengels des winters telkens af- sterven. Voor gazons is dit eene plant bij uitnemendheid, daar zij ook zonder eenige dekking over- wintert	200	9-11	0.25	Monsieur Rouillard , donker bloed- rood met geel omzoomd.			
— Baldschuanicum , zie <i>klimplanten</i> .				Mont d'or , geel.			
— bistortum superbum . Met fraaie lichtrose bloemtrossen	50	8-9	0.25	Nepalensis Miss Willmott, met schit- terend vermiljoenroode bloemen, een verbetering van de <i>formosa</i> , <i>enkel</i> .			
— lichiangense . Nieuwe uit China ingevoerde plant met een menigte zuiverwitte bloemen; rijkbloeiend	60	7-9	1.20	Nigra plena , donker purper, bijna zwart.			
— sachalinense . Snelgroeiende plant met een heesterachtig gewas en grootte bladeren. Zij laat zich zeer goed gebruiken als dekking en onder boomen	180	9-10	0.20	Panorama , oranje, purper gestreept.			
† Potentilla atrosanguinea (Gibson's scarlet). Bloemen zijn vermiljoen- rood en steken zeer mooi af tegen het helder groene blad. Lang- en rijkbloeiend	30 40	6-9	0.45	Perfecta plena , scharlakenrood met geel hart.			
POTENTILLA HYBRIDEN.				Purpurea plena , purper karmijn en goudgeel.			
Zij bloeien den geheelen zomer tot laat in den herfst en zijn wat behandeling betreft niet zeer kieskeurig, daar zij in vrijwel elken grond goed groeien. De afgesneden bloemen laten zich ook uitnemend gebruiken.				Rosaeflora , donker amarantrood.			
Per stuk f 0.25				Touissant Louverture , purperkarm.			
10 stuks in 5 soorten - 2.—				Van Dijck , geel, rood gestreept.			
25 „ „ 5 „ - 3.60				Vase d'or , geel.			
Onderstaande soorten zijn dubbel, behalve waar dit vermeld staat.	50	6-8		Variabilis plena , scharlakenrood met gele randjes.			
Arc-en-Ciel , chroomgeel, rood ge- streept.				Velours pourpre , fluweel bruin.			
Californica , zuiver geel.				Versicolor , geel en rood gevlekt.			
Cingalee .				Vulcain , helderrood, donker centrum.			
Cratère , purperrood, geel gerand.				William Rollison , kastanjebruin met oranje.			
Don Quichotte , geel geaderd, helder en donkerrood gestreept naar het midden.				Potentilla nitida	15	6-9	0.30
Drapeau , kastanjebruin met donker midden.				— nitida alba	15	6-9	0.70
Emille , purperrood, geel gerand.				Beide vormen lage polletjes. De eerste heeft zacht rose, de andere witte bloemen.			
Formosa , kersrood, rijkbloeiend, <i>enkel</i> .				— reptans fl. pl. , kruipend met dubbele gele bloemen		7-8	0.35
Golconde , rood met geel.				— tormentilla tongei , laaggroeiend; de bloemen zijn geel met scharlaken vlek in 't centrum			0.30
Goldkugel , goudgeel.				Poterium obtusum . Eigenaardige zeldzame nieuwe plant met lange rose bloemaren	60	7-9	0.30
Hamlet , donker karmijn.				Primula acaulis alba plena , wit . .	15	4-5	0.30
Hopwoodiana , rose met isabellageel, <i>enkel</i> .				— acaulis croussei plena , dubbel violet purper	15	4-5	0.45
L'acheron , donker vuurrood, geel gerand.				— acaulis grandiflora hybriden , in gemengde kleuren	15	4-5	0.20
Landseer , rood, <i>enkel</i> .				— acaulis lilacina plena met dubbele mat-lila bloemen	15	4-5	0.30
				— acaulis lutea plena , geel, half gev.			0.35
				— „ Pompadour . Reeds zeer oude, doch zeldzame Primula, met schitt. bloedroode dubb. bloemen	15	4-5	1.—
				— acaulis sanguinea plena , dubbel donkerrood	15	4-5	0.30
				— acaulis sulphurea plena , dubbel geel	15	4-5	0.35
				— Auricula , grootbloemige Luiksche Aurikels in gemengde kleuren . .	15	4-5	0.25
				— Bulleyana , met moeilijk te be- schrijven kleuren: gemskleur, oranje, abrikooskleur en scharlakenrood, alle komen er in voor. Niettegen- staande deze buitengewone kleuren- variatie een prachtig geheel . . .	40	5	0.30

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Primula Cashmeriana.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Primula Cashmeriana , zeer vroeg- bloeiend met mooie paarse bloem- hoofdjes	30	3—5	0.20
†— Cashmeriana alba , zuiver wit .	30	3—5	0.20
†— hybrida La Lorraine . Prachtige nieuwe hybride, zeer rijkbloeiend met karmijnrose bloemen	30	5—6	0.35
— hybrida Mrs. James Douglas . Nieuwe kruising van <i>Primula Auricula</i> met groote blauwpaarse bloe- men, gewonnen door den bekenden Engelschen <i>Primula</i> -kweeker James Douglas	25	5	0.55
— japonica . Bloeit met verschillende nuanceeringen tusschen purper en wit	30	5—6	0.20
†— Juliae . NIEUW! Zeer vroeg- bloeiende plant uit den Kaukasus met schitterend purperose bloemen	20	3—4	0.30
— Littoniana . Bloeit met 7—12 cm. lange bloemaren, kleur der bloemen is lila tot violetpurper	50 20 25		0.75
— luteola , fraaie geelbloemige soort		5—6	0.25

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Primula Moerheimi hybriden. Prachtige nieuwe <i>Primula</i> , in mijne kweekerij ontstaan uit krui- singen tusschen <i>Primula Beesiana</i> en <i>P. Bulleyana</i> . De planten hebben ongeveer dezelfde groei- wijze als <i>P. pulverulenta</i> en de bloemstengels bereiken ook on- geveer dezelfde lengte als deze, maar de bloemen komen voor in alle denkbare kleurschakeeringen tusschen geel, oranje, rood, rose en violet. Er zijn mij weinig planten bekend, waarbij zooveel kleurschakeeringen voorkomen. <i>Getuigschr. v. Verdienste Juni 1918</i>			
† Primula Pulverulenta , in groei en blad veel overeenkomende met <i>P.</i> <i>Japonica</i> . De bloemen zijn echter groter en van een schitterender purperen kleur. De stengels zijn met een poederachtige stof bestoven .	60	6—7	0.55
	80	6	0.20



Primula Pulverulenta.



Primula Sieboldi.

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

*Primula rosea grandiflora.*

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Primula rosea grandiflora. Uit het Himalayagebergte ingevoerde plant, waar zij op een hoogte van 3000 Meter werd gevonden. De helderroze bloemen hebben een donkergeel hart en zitten aan bloemhoofdjes bijeen	20	3—5	0.30	Primula veris elatior , gemengde kleuren. Bekende sleutelbloem; een der vroegste voorjaarsbloemen; zij wordt veel gebruikt voor randen om heesterperken. Ook kan men deze planten zeer goed een plaatsje geven in een perk met struikrozen, mits deze niet te dicht op elkaar zijn geplant. Ze bloeien dan wanneer de rozen nog geheel kaal zijn, terwijl des zomers de rozen haar niet zullen hinderen	30	3—5	0.15
† — Sieboldii , in soorten op naam (Voor afbeelding zie bladz. 59.) Deze worden ook wel Japansche Primula's genoemd en zijn in onze tuinen nog veel te weinig in gebruik. De bloemen, die in vorm veel doen denken aan de bekende Primula sinensis, komen voor in kleurschakeeringen van rood, rose, lila en wit. De planten groeien het best op een vochtige plaats, beschut voor de namiddagzon. Zeer geschikt voor potcultuur. Men kan ze dan reeds in Febr.-Mrt in bloei hebben.	30	4—5	0.20	Prunella incisa , donkerrose	25	5—6	0.30
— Sikkimensis . Afkomstig van het Himalayagebergte en zonder twijfel een der mooiste Primula's. Zij heeft een eigenaardigen, doch aangename geur. De stengels dragen een losse tros van neerhangende zwavelgele bloemen	40	6	0.30	— Webbiana , blauw-violet	25	5—6	0.30
				Pulmonaria angustifolia azurea . Een der vroegste voorjaarsbloemen, die ook goed tegen koude en nachtvorsten kan, met prachtige blauwe bloemen	30	3—4	0.20
				— rubra . Met purperroode bloemen	30	3—4	0.20
				— saccharata Mrs. Moon . Met mooie donkerblauwe bloemen, blad donkergroen en zilverwit gevlekt	25	4	0.25
				— sibirica maculata . Met eigenaardig gevlekt blad en paarsblauwe bloemen	30	4—5	0.30

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Pyrethrum.

†PYRETHRUM.

De Pyrethrum is een plant, die in de laatste jaren zeer op den voorgrond is gekomen. Zij munt uit door een grooten rijkdom van vormen en kleurentinten in wit, crème, rose, lila en rood. Vooral als snijbloem kan zij niet genoeg worden aanbevolen, daar ze zeer lang hare frischheid behouden. Zij bloeien vanaf begin juni en wanneer men zorg draagt bij het verbloeien de uitgebloeide stengels af te snijden, zullen ze ook in den nazomer een groote menigte bloemen geven.

10 stuks in enkele soorten naar mijne keus f 3.—.

10 stuks in dubbele soorten naar mijne keus f 3.—.

†Pyrethrum Lord Rosebery. Met schitterend karmijnroode, dubbele bloemen; prachtige soort

†— Mad. Munier. Met dubbele vleeschkleurige bloemen

†— Queen Mary. Prachtige nieuwe variëteit met zeer groote dubbele licht rose bloemen. Prachtige snijbloem op lange stevige stengels .

Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
-------------	-----------------	-------------------

50	5—6	0.50
50	5—6	0.45
60	5—6	0.55



Ranunculus aconitifolius fl. pl.

†Ranunculus aconitifolius fl. pl.

Een der beste vaste planten. Een perk daarvan levert gedurende den bloeitijd een zeer schoon gezicht. De dubbele sneeuwwitte bloemen met het donkergroene blad zijn onovertreffbaar voor bouquets, daar de bloemtrossen bovendien een lossen vorm hebben

†— acris fl. pl. Dubbele goudgele boterbloem

†— amplexicaulis, grootbloemig wit — lingua, oeverplant

†— speciosus fl. pl. Dubbele gele boterbloem met groote bloemen; gedrongen groeiwijze en zeer rijkbloeiend

Rhexia virginica. Laagblijvend plantje met donkerrose bloemen en gele meeldraden

Rodgersia aesculifolia. Uit Thibet ingevoerde plant met op kastanjebladeren gelijkend loof en rose bloemen

Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
-------------	-----------------	-------------------

45	5—6	0.25
60	5—6	0.15
25	5—6	0.40
	5—7	0.15
30	5—6	0.20
30	9—10	0.30
60	6—7	0.55

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”



Romneya Coulteri.

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Rodgersia pinnata. Zeldzame plant met kastanjeachtig blad en purperroode bloemtrossen	80	7—8	3.75	Sagittaria japonica , enkelbloemig .			0.30
— podophylla. Bloemen vuil wit, blad is zeer mooi bronsachtig . . .	80	7	0.45	— japonica fl. pl. , dubbelbloemig .			0.45
— tabularis. Een nog zeer zeldzame, vaste plant met groote, prachtige, sterke bladeren van een heldergroene kleur, gelijkend op die van Petasites; de gele bloemen staan in lange trossen.				Deze beide gelijken eenigszins op het gewone Pijlkruid, doch hebben forsker groeiwijze. De groote witte bloemen hebben een middellijn van 3—4 cM. en geven langs oevers van vijvers of grachten veel voldoening.			
Zij houdt van een vochtige en beschaduwde standplaats	120	7	0.35	Salvia patens , blauw	50	7—8	0.20
† Romneya Coulteri. De Californische Papaver heeft schoone grijs-groene bladeren en groote sneeuw-witte, satijnachtige bloemen, die een donkeren stamper en oranje-kleurige meeldraden hebben. De bloemen hebben een bijzonder sterke, heerlijke geur en bereiken een middellijn van 10—12 cM. Daar de planten houtachtige wortels hebben, die bij het verplanten anders licht tot rotting zouden overgaan, worden ze in pot gekweekt en in pot of met potkluit verzonden. Bij ontvangst moet men de planten voorzichtig uit de potten kloppen en uitplanten. zonder de kluiten te beschadigen. Ze groeien het best in voedzamen, goed doorlatenden grond op een warme plaats en moeten des winters met een weinig ruigte of turfstrooisel bedekt worden	150	7—10	0.60	†— pseudo-coccinea purpusi. Prachtige, zeldzame nieuwigheid, die hoewel eigenlijk niet tot de vaste planten behorende, zeer kan worden aanbevolen door den langdurigen bloei met vurig vermiljoenroode bloemen. Het verdient aanbeveling de planten in October op te nemen en in bak of koude kas te overwinteren	30	7—10	0.60
Rubus sorbifolius , eigenaardig gewas met prachtige vruchten, van eenigszins wrange smaak			0.15	— tenori , met lichtblauwe bloemen	50	7—9	0.30
† Rudbeckia Goldstrahl , met groote dubbele gele bloemen	180	8—9	0.20	†— virgata nemorosa. Zeer rijk-bloeiende plant met prachtige violetblauwe bloemen. Zeer geschikt voor borderbeplanting en perken; bloeit zeer lang	70	7—8	0.50
†— laciniata Golden Glow , met goedgevulde goudgele bloemen op lange stengels, bijzonder geschikt voor groote vaasbouquetten . . .	180	6—8	0.15	†— virgata nemorosa alba , witte variëteit	50	7—8	0.50
†— maxima , met lichtgrijs blad en enkele gele bloemen	100	7—8	0.30	Sanguinaria canadensis (major). Laaggroeiend met grijsgroene bladeren en tamelijk groote zuiverwitte bloemen			0.40
†— Newmanni , met groote stevige, oranjegele bloemen met donkerbruin hart. Bloeit zeer lang door en blijft afgesneden langen tijd goed . . .	50	7—10	0.15	Santolina chamaecyparissus , met zilvergrijs blad, geschikt voor rots-partijen en randen. Bloempjes geel	25		0.30
†— nitida Autumn Glory , m. groote enkele gele bloemen	100	8—10	0.25	— pinnata , met gele bloemhoofdjes	50	7—8	0.40
†— nitida Herbstsonne. Een der mooiste Rudbeckia's, met groote goudgele bloemen op stevige stengels; zeer rijkbloeiend. Prachtsnijbloem	150 200	9—10	0.20	† Saponaria officinalis rosea plena. Rijkbl. plant met zachtrose bloemen	50	6	0.35
†— purpurea , zie <i>Echinacea</i> .				— oxymoides splendens , kruipend rotsplantje m. karmijnrose bloemen		6	0.35
†— atro-purpurea , donker karmozijnrood	90	8—10	0.50				
†— subtomentosa , gele bloemen met purperen schijf	70	7—8	0.35				
Sagittaria sagittifolia , Pijlkruid, waterplant			0.15				

SAXIFRAGA.

De Saxifraga's zijn rotsplanten bij uitnemendheid. Het blad is mooi gevormd en de aardige bloemen meest wit of rose. Zelfs op schraalsten grond groeien zij nog goed; men geve ze bij voorkeur een halfbeschaduwde standplaats.

†**Saxifraga Cotyledon pyramidalis.**

Een der schoonste Saxifraga's. Zij vormt een groot rozet van bladeren, waaruit stengels met talloze witte bloemen te voorschijn komen. Ook zeer geschikt voor potcultuur . . .

— **deciplens Bathoniensis**

— " **grandiflora alba**, met groote witte bloemen

— **deciplens grandiflora pallida**, wit met rose weerschijn

— **geranoides**

— **Haworthi**

— **hypnoides**, wit

— " **Kingi**

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Saxifraga incurvifolia			0.25	Sedum glaucum , lichtgrijze bladeren			0.15
— lantoscana , wit			0.25	— kamschaticum , bloeit geel . . .			0.20
— Lindsayana			0.25	— „ fol. var.			0.35
— Macnabiana , wit			0.35	— latifolium atro-purpureum . . .			0.55
— peltata , rose, vroeg			0.25	— Lydium , rose			0.15
— „ gigantea . NIEUW!			0.35	— obtusifolium , met groen blad . .			0.35
— punctata			0.25	— reflexum , grijsachtig blad . . .			0.20
— reniformis			0.25	— roseum , met roseachtig blad . . .			0.15
— Rhei , rose, vormt een dicht tapijt			0.25	— ruprestre , grijsachtig blad . . .			0.25
— R. W. Hosier , donker karmozijn			0.30	— Spathulaefolium , een der mooiste			0.15
— sanguinea superba , rood			0.30	— spectabile atro-purpureum , met			
— Stansfieldi			0.25	prachtige grijsblauwe bladeren en			
— Sternbergi			0.25	bloemen van een diep robijn-roode			0.35
— umbrosa , (<i>Hoe langer hoe liever</i>				kleur in den herfst			0.45
<i>of Schildersverdriet</i>), wit			0.25	— spectabile Brillant , donkerrood .			
— umbrosa fol. var.			0.25	— spurium splendens , vuurroode			0.25
— Ware's Crimson , donkerrood . .			0.35	bloemen			
Saxifraga's in soorten naar mijn keus				Sempervivum arachnoïdeum Gna-			
p. 10 st. f 2.—; p. 100 st. f 16.—				phalium . De bladeren van deze			
				soort zijn als met een spinneweb			
				van fijne witte draden overdekt;			
				een der beste voor steengroepen.			
				Bloeit met roode bloemen			0.15
† Scabiosa caucasica . Van begin				— atro-violaceum			0.20
Juni tot eind October bloeien deze				— Browni , donkerrood; een der			
planten onafgebroken met prachtige				schoonste voor perken			0.15
langstelige, zacht lila-blauwe bloe-				— Comolli			0.20
men, die afgesneden geruimen tijd				— Cornutum			0.20
goed blijven	75	6—10	0.20	— fimbriatum			0.15
†— caucasica alba . Witte variëteit				— Funckii			0.15
een der schoonste snijbloemen . .	60	7—9	0.25	— Powellii , zeer schoone soort . .			0.20
— gigantea (= <i>Cephalaria tatarica</i>).				— pyrenaicum , de groote bladeren			
Hooggroeiend met zwavelgele				dezer soort zijn donkerrood, een			
bloemen	180	6—9	0.40	der schoonste voor rotspartijen en			0.15
— graminifolia . Bladeren smal,				mozaïek-vakken			0.15
bloem lang gesteeld, lila met rose	60	7—8	0.25	— Verloti			
weerschijn	30	6—7	0.30				
— Parnassi , rose				† Senecio clivorum , met groote hart-			
— pensylvanica , met zwavelgele				vormige bladeren en mooie oranje-			
bloemen	200	7—8	0.25	gele bloemen. Als solitair- en			
Scirpus lacustris , <i>Bies</i> , oeverplant .			0.15	borderplant uiterst geschikt . . .	100	8—9	0.25
Scrophularia nodosa variegata .				†— clivorum Orange Queen , met			
Prachtige bontbladerige plant . .	25		0.55	groote prachtige oranjebloemen .	100	8—9	0.55
(Getuigschrift v. Verdienste Ned.				†— tanguticus , sterkgroeiende, nieu-			
Mij v. T. en P. Augustus 1916).				we uit Centraal China afkomstige			
				plant met rechte, bebladerde sten-			
				gels, voorzien van dichte bloem-			
				trossen kleine goudgele bloemen.			
				Fraai ingesneden blad	200	9—10	0.25
SEDUM en SEMPERVIVUM.				— Veitchianus , met groote hartvor-			
Hetgeen van de Saxifraga's gezegd is, geldt				mige bladeren. De stevige lange			
grootendeels ook voor deze beide geslachten				bloemstengels zijn over een lengte			
welke echter meer eigenaardig zijn door den				van 60 cm. rijk bezet met schitte-			
bizonderen vorm der bladeren met verschil-				rend goudgele bloemen. Deze be-			
lende nuances van groen, waardoor ze zich,				kroonde nieuwigheid is bijzonder			
behalve voor rotspartijen, uitmuntend laten				geschikt voor aanplanting bij vij-			
gebruiken voor blijvende mozaïekvakken.				vers etc.	150	8	0.25
Sedum in soorten naar mijn keus				— Wilsonianus , prachtige nieuwig-			
p. 100 st. f 15.—; p. 10 st. f 2.—				heid met groote, hartvormige bla-			
Sempervivum in soorten n. mijn keus				deren en stevige, sterk vertakte en			
p. 100 st. f 12.—; p. 10 st. f 1.50				dicht met schoone goudgele bloe-			
Sedum Anacampseros , met blauw-			0.25	men bezette bloemstengels. Even-			
groen blad			0.15	eens zeer geschikt om in de nabij-			
— asiaticum , schoon grijs blad . .			0.25	heid van vijvers te planten . . .	150	8	0.35
— cristatum							
— Ewersii , blauwgroen blad en rose			0.15				
bloemschermen							

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Sidalcea candida , met donkergroene bladeren en witte bloemen aan lange stengels. De bloemen blijven lang goed en wanneer men de stengels afsnijdt en in water zet, openen zich de knoppen, en bloeien nog zeer lang	60	6—7	0.15	† Spiraea filipendula fl. pl. Midden uit het rozet van varenachtige, altijd groene bladeren, komen fraaie bloemtrossen met dubbele, witte bloemen	50	6—7	0.20
† Rosy Gem. Met rose bloemen; zeer rijk- en langbloeiend	120	7—10	0.15	† — gigantea. Met witte bloemen op lange stengels	150	8—9	0.30
Silene acaulis grandiflora. Zeldzaam; kruipend plantje, dat mooie polletjes vormt met lichtrose bloempjes		6—8	0.35	† — gigantea carnea. Met groote platte bloemtrossen van rose bloemen met een rose-violet midden	150	7—8	0.30
— alpestris , rotsplantje met zuiverwitte bloemen	10	5—7	0.30	† — palmata atro-purpurea. Laaggroeiende soort met donker loof en prachtige purperroode bloemen	50	6—7	0.35
— maritima fl. pl. Kruipend plantje met groote dubbele witte bloemen		7—8	0.45	— trifoliata , zie <i>Gillenia</i> .			
— Schafta , met groote purperrose bloemen	20	7—8	0.30	— Ulmaria aurea. Met goudgele bladeren	50	6	0.25
Silphium perfoliatum. De bladeren, die aan den stengel tegenover elkaar zitten, zijn aan hun voet vergroeid, en vormen zoodoende een beker, die gewoonlijk met water gevuld is	150	6—9	0.30	— Ulmaria fl. pl. Met dubbele witte bloemen	90	6	0.20
Soldanella alpina. Een in de Alpen groeiend wild plantje, met ronde, groene bladeren, die aan zeer dunne steeltjes bevestigd zijn. De klok-vormige bloempjes zijn van een diep blauwe kleur. Vraagt een koele schaduwrijke plaats	15	5—6	0.30	† — venusta (lobata). Met purperrose bloemen	90	6—7	0.25
† Solidago aspera , met sterkvertakte stengels en dichte goudgele bloemtrossen	120	8—9	0.25	† — venusta magnifica. Met helderder kleur en grooter bloemen dan de voorgaande. Zeer geschikt voor borders en als solitairplant	130	8	0.25
† — brachystachys	20	8—9	0.40	Stachys corsica. Zodenvormend rotsplantje met licht lila bloempjes	5	6—9	0.35
† — Golden Wings NIEUW! Met groote breede vederachtige gele bloemtrossen. Uitstekend geschikt voor borders en als snijbloem voor groote bouquetten	200	9—10	0.25	— discolor	25	6—7	0.30
† — Shorti , laaggroeiende geelbloeiende soort	30	9—10	0.15	— lanata. Met witte wolachtige bladeren. Men moet de bloemen geregeld afsnijden om de planten goed gevuld te houden. Zeer geschikt voor randen	25		0.20
— spectabilis	60	8—9	0.30	† Statice eximea fl. albo , wit	60	8	0.25
† — virgaurea (Gulden roede) , met schoone goudgele vederachtige bloemtrossen	150	9	0.25	† — latifolia. Uit een rozet van gegolfde bladeren komen de stevige bloemstengels, welke een ontelbare menigte, fijne, donkerblauwe bloempjes dragen. Voor bouquetten zijn ze zeer geschikt. Ook kan men ze, zoodra ze beginnen te ontluiken, afsnijden en drogen, door ze op een droge plaats in bosjes op te hangen, evenals men dit met Immortellen doet	45	7—9	0.25
† — virgaurea praecox (compacta). Laaggroeiende soort met groote, vederachtige trossen gele bloemen	50	7—9	0.25	† Stenanthium robustum. De bloemstengels geven met hare meestal 60 cm. lange witte bloemstukken den indruk van een gevederde Solidago. Zij verlangt een beschaduwde, vochtige standplaats. De afgesneden bloemstengels blijven langen tijd goed	100	7—8	0.85
† Spiraea Aruncus. Talrijke prachtige lange bloemaren met een ontelbare menigte kleine witte bloempjes. Uitstekende solitairplant	120	6—7	0.45	Stipa pennata. Fraai siergras met zeer fijne aren			0.35
† — Aruncus sinensis. Sterkgroeiende variëteit, met lange witte trossen	160	7—8	0.50	† Stockesia cyanea alba. Schoone, witte variëteit van de bekende Stockesia Cyanea; prachtig voor snijbloemen	25	9	0.25
† — Aruncus var. Kneiffi. Aanbevelenswaardige variëteit, welke lager groeit dan de gewone Spiraea Aruncus. Het blad is bijzonder fijn en sierlijk ingesneden, waardoor dit uitstekend geschikt is voor bouquetten, evenals de prachtige witte bloemtrossen	60	7—9	0.55	† — cyanea praecox. De oorspronkelijke soort bloeit zoo laat in den herfst, dat ze meestal niet meer in vollen bloei kan komen; deze variëteit bloeit reeds in Juli	25	7—9	0.35
† — filipendula	50	6—7	0.25	Stratiotes aloides , waterplant			0.15

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

" " " " " 5 " " " " " 4 " "

	Hoog cM.	Blei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cM.	Blei- tijd.	Prijs p. stuk.
Stylophorum diphyllum. Met groote gele bloemen, die aan boterbloemen doen denken	50	4—5	0.25	† Tiarella cordifolia. Deze plant met hartvormige bladeren en sierlijke witte bloemtrossen verlangt een halfbeschaduwde standplaats . .	30	5—6	0.25
Synthyris reniformis. Uit de polletjes met hartvormige bladeren komen vroeg in het voorjaar de trossen met blauwe bloemen . .	20	4—5	0.25	Tradescantia virginica	50	6—8	0.30
Telekia (Bupththalmum) speciosa. Uit het midden der groote bladeren verheffen zich de bebladerde en sterk vertakte bloemstengels met groote oranjegele straalbloemen. Schoone gazonplant	200	8—9	0.30	— virginica alba	50	6—8	0.30
Thalictrum Adianthifolium. Het fijne blad van deze plant gelijkt op Adianthum. Laaggroeiend	50	6—7	0.25	— „ rubra	50	6—8	0.30
†— Aquilegiaefolium. Schoone sierplant met bladeren als van de Akelei en met mooie witte bloemen . .	90	6—7	0.25	Tricyrtus hirta, mooie plant met roseachtige bloemen, die donkerkarmijn zijn gespikkeld. Groeit goed in de schaduw	90	9—10	0.25
†— Aquilegiaefolium compactum, met witte bloemen	40	6—7	0.30	Trillium erectum album. wit. Deze voorjaarsbloem is uit Amerika ingevoerd en groeit het best in de schaduw	30	5	0.55
†— Aquilegiaefolium purpureum, met purperrose bloemen	90	6—7	0.25	†— grandiflorum, prachtige voorjaarsbloem met groote sneeuw-witte 3-deelige bloemkroon, welker slippen eenigszins teruggebogen zijn	20	4—5	0.30
†— cornuti, met crème-witte bloemen	200	6—7	0.25	TRITOMA. De <i>Vuurpijlen</i> behooren tot de beste gazonplanten en worden als snijbloem voor groote vazen door weinig andere planten overtroffen. De tot 1½ M. lange bloemstengels, die uit de rietachtige bladeren opschieten, dragen gele of roode bloemen.			
† Thalictrum dipterocarpum. De lila-rose bloemen maken met de talrijke citroengele helmknoppen een fraai effect. Zeer geschikt voor groepen of als alleenstaande plant, daar zij een open, zonnige standplaats bemint. Een der mooiste snijbloemen	200	8—9	0.25				
Thalictrum flavum aureum, welriekende, gele bloemen	100	7—8	0.30	† Tritoma corallina, met helder groen loof en bloemtrossen van scharlakenroode tot oranjerode kleur .	60	7—10	0.35
— flavum glaucum. Met fraai zee-groen blad en enorme bloemstengels met fijne gele bloempjes . .	125	7	0.30	†— Goldelse, buitengewoon rijkbloeiend met heldergele bloemen .	80	7—10	0.25
— glaucum major	120	6—7	0.30	†— Mac Owani, zeer los en elegantbloeiende variëteit met oranjegele bloemen; de laagstgroeiende. Zij is zeer rijkbloeiend	45	7—10	0.20
— lasopittifolium	120	6—7	0.50	†— Quartiniana, met zeer lang neerhangend blad en dikke stengels met roode bloemen	80	8—9	0.35
†— petaloideum, met fijne witte bloemen	110	6—7	0.25	†— rufa, zeer fraaie, kleinbloemige variëteit met roode en gele bloemen	60	7—10	0.20
— sulphureum. Met fraai blad en zwavelgele bloemen	125	6—7	0.50	†— Torchlight, met oranjegele bloemen. Zeer rijkbloeiend	80	7—10	0.25
† Thermopsis montana. Weinig bekende plant met heldergele bloemen	40	5—7	0.30	†— Tucki, de vroegstbloeiende; bloemen rood in geel overgaand .		5—6	0.25
Thymus citriodorus	20		0.35	†— Uvaria grandiflora. Gewone vuurpijl.		7—10	0.30
— citriodorus fol. var., bonte citroen Thym.	20		0.25	TROLLIUS (60—80 cM.) Deze behooren zeker tot de beste en schoonste vaste planten van het voorjaar. De langstelige, hartvormige bladeren vormen krachtige bossen, waaruit zich de slanke bloemstengels verheffen. De bloemen hebben een goudgele tot donker oranje kleur en blijven afgesneden lang goed. Zij bloeien Mei-Juni, en gewoonlijk ook nog in den nazomer.			
— lanuginosus. Kruipende donker blauw-groene plant, welke den grond geheel als een mosachtig tapijt bedekt. Uitstekend voor mozaïekvakken en rotspartijen . .			0.20				
— Serpyllum albus. Lichtgroen kruipend plantje met witte bloemen		6—7	0.20	† Trollius asiaticus fl. croceo, donker oranje			0.35
— Serpyllum carmineus, karmijnrood			0.30	†— caucasicus Orange Globe. Deze voor enkele jaren ingevoerde Trollius heeft enorm groote, oranjegele bolvormige bloemen		5—6	0.45
— Serpyllum coccineus. Het blad is lichtgroen, de bloemen rood . .		6—7	0.30				
— Serpyllum splendens			0.25				

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „



Trollius.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Trollius Earliest of All. Vroeg- en rijkbloeiend, met licht oranjegele bloemen			0.35
†— Empire Day. Rijkbloeiend, met zeer groote kogelronde, licht oranjegele bloemen, waarin oranje meeldraden		5—6	0.50
† Trollius europæus superbus. Grootbloemig, zuivergeel; rijkbloeiend		5—6	0.25
† Trollius Feuertröll. Nieuwe variëteit met oranjeroode bloemen	65	5—6	0.55
†— Fire Globe. Grootbloemig; donker oranje		5—6	0.35
†— giganteus			0.40
†— Golden Sun. Nieuwe prachtsoort met oranjekleurige bloemen en sterk uitkomend donkerbruin midden		5—6	0.65

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
† Trollius His Majesty		5—6	0.50
†— hybr. Goldquelle. Met zeer groote oranjegele bloemen Getuigschrift van Verdienste 11 Mei 1915.			0.50
†— japonicus Excelsior. Bloeit gedurende eenige maanden met mooie oranje bloemen. Goede snijbloem		5—6	0.25
†— japonicus (Fortunei) fl. pl.			0.35
†— Ledebouri. Zeldzame plant met bekervormige, oranjekleurige bloemen, waarboven de lange, donkeroranje meeldraden uitsteken	120	7—8	0.25
†— Lichtball. Extra groote, dichte bloemen, oranjegeel	60	5—6	0.45
†— Orange Crest. Met een menigte zuiver oranje bloemen	80	5—6	0.35
†— Orange Prinsess. Vorm der bloemen als Orange Globe, kleur donkerder		5—6	0.50
†— pumilus Yunnanensis. Bijzonder fraaie, nieuwe plant, met donkergroene bladeren en helder goudgele, bekervormige bloemen. Nieuwe soort, welke uit China ingevoerd is		5—6	0.30
†— Springhill Beauty. Zeer rijkbloeiend, helder oranjegeel			0.50
†— T. Smith, grootbloemig licht geel		5—6	0.25
Tropæolum speciosum. Schoone klimplant met fijne bladeren, en prachtig scharlakenroode bloemen. Tegen coniferen of hagen opgegroeid maken ze tot in den herfst een schitterend effect. Ieder najaar sterft de plant tot den grond af om den volgenden zomer in korten tijd weer op te groeien. Van deze plant kunnen alleen worteltjes worden afgeleverd, die eenige centimeters onder de oppervlakte in den grond moeten worden ingegraven. Het is echter raadzaam minstens 5 of 10 stuks te nemen, daar ze bij het verplanten dikwijls doodgaan	350	7—10	0.15
Typha angustifolia, moerasplant. Met zeer eigenaardige bruine zaadpluimen	180		0.15
— latifolia, als vorige; blad iets breder	180		0.15
Utricularia vulgaris, Blaasjeskruid. Zeer eigenaardig gewas, dat gewoonlijk onder water groeit. Tegen den bloei vullen zich de blaasjes, waarmede de plant kleine waterdiertjes vangt, met lucht, waardoor de plant aan de oppervlakte komt en dan bloeit met gele bloemen			0.15
Uvularia grandiflora. Met fraaie gele bloemen; vroegbloeiend	25	4—5	0.30
— sessilifolia, met gele bloemen	25	5—6	0.30
Verbascum Caledonia. Met bruin-geint zalmkleurige bloemen	100	7—10	0.20

Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Bloei- tijd.	Prijs p. stuk.
Verbascum densiflorum. De bloemen zijn kopergeel met donker midden	100	7—10	0.20	Villarsia nymphaeoides. <i>Watergentiaan.</i> Waterplant met bruingevlekte bladeren en gele bloemen		7—8	0.15
— hybridum Mars. Nieuwe hybride tusschen V. Wiedemannianum en V. Pannosum, in mijne kweekerij door kruising ontstaan. Uit een rozet van prachtige viltige bladeren komen de bloemstengels, die gedurende een langen tijd van den zomer prijken met groote isabellakleurige bloemen, naar het midden in rood overgaand	200	8—9	0.25	Vinca minor, Maagdepalm	15	5—6	0.15
— Leianthemum, lichtgeel, hoog	200	8—9	0.55	— minor fol. arg. var., Zilverbonte Maagdepalm. Deze beide kruipende planten, zoowel de groene met hare glanzige bladeren, als de zilverbonte, hebben helderblauwe bloemen en kunnen niet genoeg worden aanbevolen voor randen. Zelfs onder boomen groeien ze goed, en maken, wanneer ze eenigen tijd gestaan hebben, een tapijt van blad en bloemen. Ze kunnen ook als hangplant dienst doen	15	5—6	0.20
— pyramidale	150	8—9	0.40	† Viola bosniaca, zeer vroegbloeiend helderroze		4—9	0.20
— vernale. Zeldzame plant met een buitengewoon groote menigte kleine heldergele bloemen met bosjes van rose meeldraden. Nadat de hoofdstengel uitgebloeid is, bloeien de zijstengels daarna nog volop	120	8—9	0.30	— cornuta G. Wermig, buitengewoon rijkbloeiend violet-blauw viooltje			0.15
— Wiedemannianum. Met eigenaardig grof donker blad en lange stengels met schitterende violette paarse bloemen	100	7—8	0.15	VIOLA CORNUTA HYBRIDEN. (TUFTED PANSIES.) Deze viooltjes, ontstaan door eene kruising van <i>Viola cornuta</i> × <i>Viola tricolor maxima</i> , zijn in Engeland reeds vele jaren in cultuur en hebben daar, dank zij de vele goede eigenschappen, die deze hybriden van hare beide ouders hebben overgenomen, eene vrij algemeene bekendheid verworven. Zij hebben de groeiwijze van <i>V. cornuta</i> , en bloeien vanaf April tot in het late najaar bijna zonder ophouden, terwijl zij volkomen winterhard zijn. De bloemen komen, wat vorm en grootte betreft, overeen met de gewone grootbloemige pensées, doch de kleuren zijn meer effen en zuiverder. <i>Per 10 stuks in soorten . f 1.50.</i>			
Veronica alpina, met licht lila bloempjes	30	5	0.30				
— amethystina, met amethystblauwe bloemen	40	5—6	0.20	Viola gracilis, een zeldzame soort uit Griekenland. Vroeg in het voorjaar komen hare bekoorlijke bloempjes van een diep violetblauwe kleur en met klein wit oog te voorschijn		4—6	0.20
— dichroa, lila		5	0.30	— odorata Doeve's reuzen, extra grootbloemig, welriekend viooltje	20	3—4	0.50
— incana, met zilvergrijs blad en violette bloemen	45	6—7	0.25	Yucca filamentosa. Deze schoone sierplant doet veel denken aan een Aloë. De smalle, grijsgroene bladeren zijn neerhangend aan de uiteinden; terwijl de bloemen aan lange stevige stengels gezeten, klokvormig neerhangen en wit met een zacht groene tint gekleurd zijn	75	6—7	0.55
— longifolia alba	40	6—7	0.25				
— longifolia subsessilis (Hendersoni), de schoonste der Veronica's met groote trossen diep blauwe bloemen	75	7—9	0.30				
— repens, zodenvormend met licht lila bloemen			0.25				
— Royal Blue, zodenvormend met blauwe bloemen	30	6	0.35				
— rupestris, laaggroeiend met blauwe bloemen		6	0.30				
— rupestris Trehani, laaggroeiend met goudgeel blad en blauwe bloemen. Zeer geschikt voor mozaïekvakken			0.30				
— sibirica alba	100	7—8	0.25				
— spicata Erika, nieuwe variëteit met prachtig donker rose bloemen	30	7—9	0.55				



Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

” ” ” ” ” 5 ” ” ” ” ” 4 ” ”

Varens

voor den vollen grond.

Voor het aanleggen van perken op beschaduwde plaatsen, waar andere planten niet groeien, komen de vollegronds-Varens hoe langer hoe meer in gebruik. Vele soorten, vooral de *Adiantum* met fijne bladeren, leveren een onschatbaar materiaal voor bouquets.

Voor al op stijve kleigronden verzuime men niet den grond te vermengen met bladaarde, boschgrond of turfstrooisel. Ofschoon bij elke plant de gemiddelde hoogte is aangegeven, moet men hierop niet te veel rekenen, want deze hangt veel af van de grondsoort. Ook groeien de planten, indien ze een of twee jaar vastgestaan hebben, gewoonlijk hooger dan het eerste jaar na de planting. Des winters bedekke men ze met zeer weinig blad of ruigte.

	Hoog cm.	Prijs p. stuk.		Hoog cm.	Prijs p. stuk.
Adiantum pedatum. Deze kan men gerust een der schoonste vollegrondsvarens noemen. Zij wordt ook Venushaar of in 't Engelsch „Maidenhair” genoemd. De waaivormig uitgespreide, fijne bladeren maken met haar staalblauwe bladstelen een onvergelijkelijk schoon effect, ook in bouquets. Is volkomen winterhard.	50	0.35	Osmunda cinnamomea. Dit is een zeer schoone, sterk groeiende soort met fraai blad	75	0.55
Aspidium Goldianum		0.50	— gracilis. Zooals de naam reeds aanduidt, heeft deze varen met haar slanke bladeren een eleganten, sierlijken vorm	75	0.55
— spinulosum	70	0.45	— regalis. Koningsvaren. Deze draagt, evenals de beide vorige, de sporen niet zooals de meeste soorten onder aan de bladeren, doch in schoone bruine pluimen aan 't einde der bladstelen . . .	90 à 120	0.35
Asplenium laciniatum	60	0.40	— regalis cristata. Nieuwe variëteit van de „Koningsvaren” met gekruld blad	70	0.45
— Rollandiæ. Prachtige variëteit met smalle bladeren	60	0.45	Polypodium vulgare	40	0.25
— Thelyptroides	70	0.50	Polystichum abbreviatum	60	0.30
Athyrium Filix femina congestum grandiceps	25	0.60	— Barnesi	100	0.45
— Filix femina pumilum		0.40	— angulare divisilobum.	45	1.—
— „ „ Victoriæ	70	0.60	— cristatum	80	0.40
Blechnum spicant		0.25	— setosum		0.50
Cystopteris asplenoides	30	0.30	— pumilum	30	0.35
Dicksonia punctilobula	70	0.40	Scolopendrium undulatum. Schoone variëteit met sierlijk gegolfd blad .	30	0.75
Lastrea (Aspidium) Filix mas . . .		0.20	Struthiopteris germanica. Deutsche Kelk- of Bekervaren, zoo genoemd, omdat de bladeren in den vorm van een beker groeien	75	0.15
— Filix mas fluctuosa cristata . .		0.55	— japonica	100	0.55
— „ „ linearis	80	0.45	— pennsylvanica		0.55
— pseudo mas polydactyla . . .	80	0.45			
— probingua crispa. Een zeer mooie variëteit met prachtig gekrulde bladeren		0.75			
Onoclea sensibilis. Schoone forschgroeiende varen	60	0.25			



Wanneer men van ééne soort 10 stuks bestelt, wordt de prijs van 8 stuks berekend.

„ „ „ „ „ 5 „ „ „ „ „ 4 „ „

Knolbegonia's en Dahlia's.



Knolbegonia's.

KNOLBEGONIA'S.

Behandeling der Knolbegonia's.

De Knolbegonia's worden direct na ontvangst uitgepakt en op een droge koele en vorstvrije plaats tot half Maart bewaard. Men plant ze tegen dien tijd bij voorkeur in een lauwwarmen bak om ze eerst te laten uitloopen. Ook kan men ze voor dat doel in potten zetten in de warme kamer. Einde Mei of begin Juni worden ze op de perken uitgeplant, die eerst goed van meststoffen moeten voorzien zijn. Op lichten zandgrond moeten zij bij droog weder des avonds worden gegoten.

N.B. Het is wel eens gebeurd, dat ik klachten kreeg dat de Knolbegonia's niet uitliepen. Daar ik echter steeds goede gezonde knollen aflever, moet de oorzaak worden gezocht in een verkeerde behandeling. Zelfs heb ik al eens gezien, dat de knollen onderstboven geplant waren.

	Prijs p. 100 st.	Prijs p. 10 st.		Prijs p. 100 st.	Prijs p. 10 st.
Enkelbloemige, in vele kleuren gemengd	15.—	1.80	Dubbelbloemige op kleur	22.—	2.50
Enkelbloemige op kleur	18.—	2.—	Crispa (met gekrulde bloembladen), in kleuren gemengd	18.—	2 20
Dubbelbloemige, in vele kleuren gemengd	18.—	2.—	Crispa, op kleur	22.—	2.50

DAHLIA'S.

Behandeling van Dahlia's.

Dahlia's mogen niet in versch gemesten grond geplant worden, daar er anders gevaar bestaat, dat men veel blad en weinig bloem krijgt. Dadelijk na ontvangst moeten de knollen worden uitgekapt en tot half April, ingekuild in tuinaarde, op een koele vorstvrije plaats bewaard. Dan plant men iedere knol in een pot en zet ze in den kouden bak of bij gebrek daaraan in een niet te warm vertrek. In het laatst van Mei neme men ze voorzichtig uit de potten zonder de kluiten te beschadigen en plante ze uit op een onderlingen afstand van 80 à 100 cm. Op zwaren grond verdient het aanbeveling er wat steen- of kalkpuin door heen te mengen. In elk geval is het noodig den grond flink diep om te werken. Het is wenschelijk om op elke knol niet meer dan 1 scheut te laten staan en men zorge er natuurlijk voor deze scheut tijdig aan een stevige stok aan te binden.

In het najaar, wanneer de vorst een eind aan den bloei heeft gemaakt, kunnen de knollen uit den grond worden genomen. Men snijde het loof een handbreed boven den grond af en beware de knollen in kelder of andere vorstvrije plaats in wat droog wit zand, nadat men ze goed droog heeft laten worden.

Cactus-Dahlia's in soorten gemengd

Prijs
p. 10 st.Prijs
p. 100 st.

2.—

„ „ in nieuwere soorten
op naam en op kleur

3.—

Pioen- en decoratieve Dahlia's, in
soorten gemengd

2.—

Pioen- en decoratieve Dahlia's, in
nieuwere soorten op naam en op
kleur

3.—

Enkelbloemige Dahlia's, in soorten
gemengd

2.—

Collerette (kraag) -Dahlia's, in
soorten gemengd

2.—

Gladiolus Childsi, in prachtige kleu-
ren gemengd

0.60

5.

— Lemoinei, in prachtige kleuren
gemengd

0.60

5.—

— princeps, met enorme karmijn-
roode bloemen

1.—

7.—

Gloxinia's, in prachtige kleuren ge-
mengd

2.—

Groente- en Specerijplanten.

	Prijs p. st.	Prijs p. 10	Prijs p. 100		Prijs p. st.	Prijs p. 10	Prijs p. 100
Aspersie van Argenteuil , uitmun- tende verscheidenheid, welke reeds zeer vroeg prachtige dikke asper- ges oplevert. In de omstreken van Parijs wordt deze bijna uitsluitend gebruikt		0.40	3.50	Kruizemunt , (<i>Mentha viridis crispa</i>)	0.50		
Over de kultuur der Aspersie zie onder Groentezaden, blz. 73.				Lieve-Vrouwe-Bedstroo , (<i>Asperula</i> <i>odorata</i>). Welriekend plantje, dat veel wordt gebruikt om Meiwijn of Rijnwijnbowl te kruiden	0.20		
Boonenkruid , (<i>Satureia montana</i>) . .	0.20			Mierikswortel , (<i>Cochlearia Armo-</i> <i>racia</i>). Deze wordt veel gebruikt bij het inmaken van Augurken, enz. .	0.20		
Byvoet , (<i>Artemisia officinalis</i>) . . .	0.20			Pepermunt , (<i>Mentha piperita</i>) . . .	0.25		
Citroenmelisse , (<i>Melissa officinalis</i>)	0.25			— (<i>Mentha puligeum</i>)	0.20		
Dragon , (<i>Artemisia dracunculus</i>), echte overblijvende. Het jonge loof levert een zeer smakelijk toekruid bij salade en is voor den inmaak van Augurken enz. onmisbaar . .	0.30			— („ <i>viridis</i>)	0.20		
Roomsche Kamille , (<i>Anthemis</i> <i>nobilis</i>)	0.25			Rabarber Challenge , aanbevelens- waardige variëteit met vele prach- tige zware roode stengels van een uitmuntende smaak	0.20		
Lavendel , (<i>Lavandula spica</i>). Plant met zeer geurige bladeren en bloe- men, welke somtijds als kruiden wordt gebruikt. In Engeland wor- den de gedroogde bloemstengels met violet blauwe bloemen veel tusschen linnengoed gelegd, om daaraan een aangename geur te geven	0.25			Thijm , (<i>Thymus vulgaris</i>). De bla- deren en jonge scheuten dezer plant worden gebruikt als kruiden bij sommige groenten en vleesch .	0.25		
				Zuring , (<i>Rumex acetosa</i>), <i>breedbla-</i> <i>derige</i>		0.50	4.—
				— reuzenblad , nieuwe uit Frankrijk ingevoerde variëteit met enorm grote, malsche bladen	0.30		24.—

ZADEN.

Groentezaden.

N.B. Tengevolge van de verbreking van vele internationale verbindingen door den oorlog, als uitvoer-verboden enz., blijft het nog moeilijk om alle soorten Groente- en Bloemzaden verkrijgbaar te stellen en was ik tot mijn spijt genoodzaakt eenige soorten uit mijn catalogus te doen vervallen. Zooveel mogelijk zijn deze echter door anderen geremplaceerd en hoop ik dat mijne afnemers zich daarmee zullen willen behelpen. Bovendien moesten van sommige soorten de prijzen belangrijk verhoogd worden; deze prijzen zullen zooveel mogelijk gehandhaafd worden, doch zijn vrijblijvend. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat van sommige artikelen de prijzen nog wat worden verlaagd. De soorten welke niet geprijsd zijn, zullen hoogstwaarschijnlijk niet zijn te bekomen.

De voorraden van vele artikelen zijn gering en daarom kan het niet genoeg worden aanbevolen om vooral zoo vroegtijdig mogelijk te bestellen, want is de voorraad van sommige artikelen eenmaal uitverkocht, zoo zal het uiterst moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk zijn om deze weer opnieuw aan te vullen.

Gemakshalve zijn de soorten genummerd en zooveel mogelijk alphabetisch gerangschikt, en men kan bij bestelling volstaan, met de nummers en de verlangde hoeveelheden op te geven. Aan het einde der lijst van Groentezaden vindt men de zaden van Keukenkruiden enz.

N.B. 1 lood of decagram = 10 gram.

1 ons of hectogram = 10 lood = 100 gram.

Waar de prijzen niet per gewicht, maar per PAKJE zijn aangegeven, worden GEEN HALVE pakjes afgeleverd, en hoeveelheden van minder dan 5 cent worden niet verkocht.

ANDIJVIE.

Andijvie verlangt, evenals de meeste blad-groenten, een flink gemesten grond. De gekruld-bladerige soorten zijn het meest geschikt om als salade te worden gebruikt. Zaai een weinig van de vroege soorten voor de eerste maal half April. Om het doorschieten te voorkomen, moet men eenige malen met een kluitje verplanten en vooral zorgen voor voedzamen grond. Door gieten of schermen tegen felle zonneschijn, wanneer dit noodig mocht blijken moet men voorkomen, dat de groei der planten tot stilstand komt, hetgeen het schieten ten gevolge heeft. De latere soorten zaaie men half Juni—Juli. Men plant de andijvie op een voet afstands onderling; zodra de planten volgroeid zijn, bindt men ze op en na omstreeks 14 dagen zijn ze voor 't gebruik geschikt.

1. Andijvie, echte vroege krop . . .
Deze heeft reeds uit zichzelf neiging tot kroppen, toch is het opbinden niet geheel overbodig.

3. Andijvie, fijne zomerkrul . . .
Wordt veel gebruikt voor het maken van andijvie-salade.

9. Andijvie, gewone breedblad volhart . . .
Deze soort wordt het meest voor den inmaak gebruikt.

11. Andijvie, echte late krop . . .

13. „ late fijne krul . . .

Prijs
per lood.

Prijs
per pakje.

0.70

0.20

0.80

0.25

0.70


0.20

0.75

0.20

0.80

0.25



Andijvie, zomerkrul.

ARTISJOK.

De Artisjok is eene groente, die ten onzent nog weinig wordt gebruikt. Indien men een warmen bak heeft, zaaie men in Februari, de plantjes kunnen dan reeds in Mei worden uitgeplant in een diep losgewerkten, voedzamen, liefst een weinig vochtigen grond en zullen dan hetzelfde jaar nog dragen. Op den kouden grond zaaie men in Mei. Om flinke planten te krijgen, plante men ze op een afstand van minstens 80 centim. onderling. Des winters moeten de planten tegen strenge vorst worden beschut. De oude stengels worden dicht bij de wortels afgesneden en om elke plant wordt een heuveltje van aarde gemaakt, ter hoogte van 20 centim., zorgdragende dat er geen aarde in het hart der plant komt. Bij strenge vorst bedekke men daarenboven met droog blad. De bloemhoofdjes worden vóór het ontluiken afgesneden en gestoofd gegeten.

19. Artisjok, gewone groene . . .


Prijs
per lood.

Prijs
per pakje.

0.25



Artisjokken.



Aspersie.

ASPERGIE.

Zaai in Maart of April en zorg dat de plantjes, als ze te dicht staan, worden gedund op een onderlingen afstand van 8 à 10 cm. In 't volgende voorjaar, in Maart of April, kan men de bedden aanleggen; men zorgt voor diep omgewerkten, voedzamen en goed gedraineerden grond. Plant op 2 voet afstand onderling. Het derde jaar kan men beginnen te steken; men make in 't voorjaar boven elke plant een heuveltje van 1 voet hoog, met grond uit de paden; ook kan men de bedden boven de planten regelmatig ophoogen. Zoodra de spruiten zich daarboven vertoonen, slecht men het heuveltje, breekt de jonge scheut boven den wortelhals af, en maakt het daarna weer in orde. In 't najaar wordt de oppervlakte der bedden weder gelijk gemaakt. Na 15 Juni mogen geen Aspersies meer gestoken worden.

25. **Aspersie**, vroege van Argenteuil
 Voor Aspersieplanten zie blz. 71.


AUGURKEN.

De Augurken verlangen een humusrijken, goed gemesten grond. Men zaaie begin Mei op bedden van 1.25 M. breedte, welke in het midden iets hooger zijn dan de zijden en op het midden waarvan men op 60 cm. afstand onderling kuiltjes maakt; in elk der kuiltjes legt men drie zaden en bedekt deze met een weinig aarde. Bij het opkomen der plantjes behoudt men het sterkste, en snijdt de anderen onder de zaadlobben af. Een weinig verdunde gier kan zeer gunstig op den groei werken.

29. **Augurken**, kleine, groenescherpe
 31. " " " gladder.

BIETEN of KROOTEN.

Voor Bieten kiese men een voedzamen, liefst in 't vorig jaar gemesten grond. Zaai in regels die 3 à 4 cm. diep en 30 cm. van elkander verwijderd zijn. De plantjes worden zoodanig uitgedund, dat ze op 25 cm. afstand onderling komen te staan. Tenzij men gaarne zeer vroege bieten wil hebben, zaaie men niet vóór eind April of begin Mei. Voor de winterprovisie bewaart men ze het best in een kuil, evenals de aardappelen, of in den kelder.



39. **Bieten**, gewone donkerroode

41. **Bieten**, bleekblad, donkerroode
 Hoewel het blad licht van kleur is, is de wortel bijzonder donker en fijn van smaak.

Prijs

Prijs

per ons. per lood.
 1.— 0.15

per lood. per pakje.
 0.20 0.10
 0.20 0.10

per ons. p. 1/4 ons.
 0.45 0.15
 0.35 0.10

43. **Bieten**, non plus ultra, halflange
 45. " platronde Egyptische .
 47. " ronde zwartroode . . .

Prijs
 per ons.
 0.55

Prijs
 p. 1/4 ons.
 0.15
 0.25
 0.20


SNIJBIET of WARMOES.

Deze groente wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt als de Bieten. Beide behooren tot dezelfde plantensoort. Bij de eerste hebben echter door de cultuur de bladeren, bij de andere de wortelen een meerdere ontwikkeling gekregen. De kweekwijze van beide is gelijk, en verwijs ik hier dus naar hetgeen van de Bieten is gezegd. Tegen het eind van September kan men reeds beginnen met telkens de meest ontwikkelde bladeren af te snijden voor het gebruik, en hiermede voortgaan tot laat in den herfst; waarom deze groente ook wel winterspinazie genoemd wordt.

51. **Snijbiet**, goudgele

0.55

0.15



Snijbiet „Lucullus.”

53. **Snijbiet** „Lucullus”

0.60

0.20

Deze nieuwe snijbiet is een prachtige verbetering van de gewone. De bladeren zijn geelgroen en mooi gekruld. Zeer aan te bevelen.

BOONEN.

Evenals alle vlinderbloemige gewassen, hebben de boonen het vermogen, door de bacteriën, die zich in de knolvormige gezwellen der wortels bevinden, stikstof uit de lucht te verzamelen. Ze vereischen dus geen versch gemesten grond, doch hebben veel behoefte aan kali (potasch), welke men met succes kan toedienen in den vorm van haardasch of patentkali. — **Stoksnij- en Stokslaboonen** (of princessen) zaaie men begin Mei voor de eerste maal en voor de late pluk nog eens begin Juni. Velen plaatsen de stokken kruiselings over elkander. Op deze wijze winden de ranken zich spoedig in elkander, zoodat licht en lucht niet overal vrijen toegang hebben. Ik kan daarom aanbevelen om elken stok afzonderlijk en recht overeind te zetten op regels, welke 1 M. van elkaar verwijderd zijn, en in de regels op 50 à 60 cm. afstand onderling. Bij elken stok legt men 6 tot 10 boonen. Het is nuttig om de planten tot aan de zaadlobben aan te aarden. **Stamsnij- en Stamslaboonen** (of princessen) zijn minder gevoelig voor de koude dan de stokboonen en kan men reeds vroeger zaaien, namelijk voor de eerste maal begin April, op een warm plekje. Men dekke dan des nachts gedurende eenigen tijd met bloempotten. Indien men vervolgens met tusschenpoozen van drie weken zaait, tot half Juli, kan men zich tot laat in den herfst

	Prijs per 5 ons.	Prijs per ons.		Prijs per 5 ons.	Prijs per ons.
een opeenvolgende oogst van boonen ver- schaffen. De snijboonen zaai men op 20 cM. afstand, op regels welke 50 cM. van elkander verwijderd zijn; de slaboonen op 12 cM. afstand, op regels van 40 cM. afstand onderling.			103. Stamslaboonen , vroege Wage- naars	1 60	0.35
61. Stoksnijboonen , vroege breede Veensche	1.80	0.40	104. „ „ „ Perfect ”	2.—	0.45
Deze brengt niet zulke lange scheeden voort als de slagzwaardboonen, maar is vroeger en veel rijkdragender.			Een in de laatste jaren in den handel ge- brachte enkele Stamslaboon, die alle aanbe- veling verdient. Zij is zuiver zonder draden en van een fijnen smaak terwijl zij in tegen- stelling met andere fijne soorten goed tegen ongunstig weder bestand en geheel vrij van ranken is.		
63. Stoksnijboonen , extra lange breede slagzwaard	2.	0.45	105. Stamslaboonen , (princ.) gewone enkele	1.80	0.40
Is te bekend om eenige aanbeveling te be- hoeven.			107. „ „ „(princ.) groote dubbele	1.60	0.35
64. Stoksnijboonen , lange breede slagzwaard, zonder draden	2.30	0.50	108. „ „ „dubb. zonder dr.	1.80	0.40
Eene nieuwe, draadloze Stoksnijboon, van bizonderse aanbeveling.			109. „ „ „fijne vr. suiker	1.80	0.40
67. Stamsnijboonen , lange breede echte	2.60	0.55	110. „ „ „ Delicata	2.60	0.55
68. Stamsnijboonen , lange breede echte, zonder draden	3.20	0.70	Deze soort wordt ook wel Stamtros-prin- cessen zonder draden genoemd; zeer geschikt voor den inmaak.		
Een aanbevelenswaardige nieuwe Stamsnij- boon, welke zeer rijkdragend en daarbij zuiver zonder draden is.			111. Stamslaboonen , (princ.) fijne zonder draden	2 50	0.55
71. Stamsnijboonen , vroege smalle	2.—	0.45	113. „ „ „Hinrich's reuzen	1.75	0.40
73. „ „ „broei	2.—	0.45	Deze is een der rijkstdragende stamsla- boonen. Zij is tamelijk vroeg en geeft buiten- gewoon lange scheeden, die uitmunten in malschheid. De boonen zien er zeer eigen- aardig bont gekleurd uit, namelijk wit met rose vlekjes. Zij is ook een der smakelijkste boonen om te drogen.		
75. Stokslaboonen , (princessen) <i>Juli</i> Bijzonder vroege, buitengewoon rijkdragende soort.	2.50	0.55	115. Stamslaboonen Hinrich's reu- zen , zuiver witte zonder draden	2.50	0.55
77. Stokslaboonen , (princessen) ge- wone enkele	1.50	0.35	117. Stamslaboonen , chocolaadbr. rotjes	1.40	0.30
79. Stokslaboonen , (princessen) vroege enkele	1.50	0.35	119. „ „ „citroengele	1.10	0.25
81. Stokslaboonen , (princessen) fijne trosjes	1.80	0.40	Per 5 Ko. f 9.—		
Deze prinsesseboon is zeer geschikt voor den inmaak of om in bussen te worden gecon- serveerd en is bovendien buitengewoon rijk- dragend.			N.B. In antwoord op sommige aan mij ge- richte vragen diene, dat Slaboonen ook Princessen-, Heeren-, Suiker- of Spersie- boonen worden genoemd.		
83. Stokslaboonen , (princessen) fijne trosjes zonder draden	1.80	0.40	123. Stamboonen Chevrier's , groene	1.10	0.25
Deze nog betrekkelijk nieuwe soort heeft het onschatbare voordeel, dat ze bij alle goede en voortreffelijke eigenschappen van de fijne trosjes, ook nog geheel zonder draden is en bijzonder malsch.			125. „ „ „gewone bruine	0.60	
85. Stokslaboonen , (princ.) enkele zonder draden	1.50	0.35	Per 10 Ko. f 10.—		
87. Stokslaboonen , (princ.) groote dubbele	1.50	0.35	127. Stamboonerwten , gespikkelde	1 30	0.30
89. Stokslaboonen , (princ.) Van Celst reuzen zonder draden	2.—	0.45	133. Tuinboonen , vroege breede witkiem	0.95	
91. Stokslaboonen , Rijsche dik- vleezige spek	1.80	0.40	Deze verscheidenheid is de beste van alle. Zij is 8 à 10 dagen vroeger dan de gewone Haarlemmer, draagt zeer rijk en brengt breede lange afhangende scheeden voort, terwijl de boonen, daar dezelve witkiemig zijn, langer malsch blijven dan eenige andere ver- scheidenheid.		
93. Erwteboonen , of kievitseitjes, ge- spikkeld	1.80	0.40	134. Tuinboonen , witbloeiende wit- kiem	0.95	
95. Pronkboonen , witbloeiende met lange scheeden	2.—	0.45	Deze nieuwe soort heeft de eigenaardig- heid, dat zij in tegenstelling met alle andere soorten, wit bloeit, en gekookt, zoowel als ingemaakt, geheel wit blijft.		
97. „ „ „roodbloeiende	2.—	0.45	135. Tuinboonen , breede Haarlemmer of klooster	1.—	
99. Stamslaboonen „ Alpha ”	2.—	0.45	137. Tuinboonen , lange afhangers of Leidsche	0.95	
Eene der allervroegste stamslaboonen met ronde, dikvleezige, zeer lange scheeden en geheel zonder draden. Ze is ontstaan uit de bekende Hinrichs reuzen en heeft dezelfde goede eigenschappen, doch is 10 à 14 dagen vroeger dan deze; zeer rijkdragend.			147. Tuinboonen , Mazagan, voor in- maak	0.80	
101. Stamslaboonen , vroege dubb. met lange scheeden	1.75	0.40	De Tuinboonen zaai men in 't voorjaar, zoodra de grond kan worden bewerkt. Men make daartoe 2 regels op 20 cM. afstand van elkaar en 4 à 5 cM. diep. Hierin legge men de boonen 20 cM. van elkaar verwijderd, en na deze weer te hebben dichtgemaakt, make men op 90 cM. afstand van de vorige weer 2 regels enz. Om ze vroeg te kunnen plukken, kan men ook zeer dicht zaaien op een warm plekje in den tuin of onder een raam, om de jonge plantjes later uit te planten. In den open grond zaait men met tusschenpoozen van 4 weken. Tusschen de dubbele regels kan men gelijk met de boonen, spinazie, radijs enz. zaaien.		

CICHOREI.

Zaai begin Mei in diepen, lossen en niet versch gemesten grond, en in regels, die 30 cM. van elkaar en 2 cM. diep zijn. Voor uitdunnen, zoodat de plantjes in de regels op 5 cM. afstand onderling komen te staan, moet worden gezorgd. In November worden de wortelen gerooid, de bladeren boven den wortelhals afgesneden en zijn ze geschikt, om te worden gebleekt. Men kiese hietoe een vorstvrije plaats uit in schuur, kelder of ouden broeibak en men kan op verschillende wijzen te werk gaan. Altijd kiese men echter flinke wortelen uit met niet meer dan één kop. Om zeer spoedig te kunnen snijden, make men een bed van paardemest ter dikte van 40 cM., waarop men een goede laag teelaarde van 30 cM. dik aanbrengt. Men steekt hierin de wortelen, die van onderen af op een lengte van pl.m. 20 cM. schuin zijn afgesneden, naast elkaar op regels, die 5 cM. van elkaar zijn verwijderd. Men zorge het licht op de een of andere wijze geheel buiten te sluiten en voor vorst te dekken. Na eenige weken kan men de bladeren snijden en gestoofd of als salade gebruiken. Om kropjes van Brusselsch Witloof te verkrijgen, bedekke men na het planten het geheel met een 20 cM. dikke laag fijne bladaarde of lichten tuingrond.



Cichorei.

Heeft men in schuur of kelder geen ruimte, zoo kan men ook een kuil maken in dentuin, en hierin op dezelfde wijze te werk gaan, het geheel met droge bladeren of oude matten voor vorst en regen dekkende. Ook zonder paardemest kan men de cichorei bleeken, doch dan duurt het langer. Heeft men een warme kas, dan heeft men een schoone gelegenheid om onder de tabletten eenige aarde aan te brengen en hierin de wortelen te steken.

151. Cichorei, gewone lange . . .	0.30	0.15
153. „ Brusselsch Witloof .	0.40	0.20

ERWTEN.

Tot de vlinderbloemige gewassen behorende, gedijen de doperwten evenals de boonen enz. het best in grond die 't vorige jaar gemest is, en vele kalk- en kali- (Potasch) houdende bestanddeelen bevat. Het is raadzaam ze niet meerdere jaren achtereen op denzelfden grond te kweken. Stamdoppers legge men in 3 à 4 cM. diepe regels en op 15 cM. afstand onderling. Naarmate de soorten lager of hooger groeien, moeten de regels 30 à 40 cM. van elkaar verwijderd zijn.

De rijdsoppers (soorten, die pl. m. 60 cM. en hooger groeien) zaaie men in dubbele regels, die dan een afstand van 10 cM. onderling hebben. De erwten worden hierin dun uitgestrooid, en wel dunner, naarmate de soorten hooggroeiend zijn. Wanneer de erwten opkomen, plaatse men er rijns bij en is het nuttig ze dan tevens een weinig aan te aarden. Voor de eerste maal zaaie men in Januari of Februari, en vervolgens om de 3 weken tot half Juni. Van af het begin van April zaaie men de late soorten.

N. B. De verscheidenheden met * gemerkt zijn gerimpeld.

Hoewel de hoogte in centimeters bij elke soort is aangegeven, gelieve men er aan te denken, dat de erwten hooger groeien, naarmate de grond krachtiger, meer stikstofhoudend is.

Prijs
per 1/4 ons.

Prijs
per lood.

VROEGE DOPERWTEN.

	Hoog cM.	Prijs p. 5 ons	Prijs p. ons.
161. Doperwten *GRADUS (Ideal). Vroege erwt, met enorm groote scheeden.	100	1.80	0.40
163. Doperwten *Wonderv. Amerika Een der vroegste en rijkst dragende stamdoppers.	20	1.—	0.25
165. Doperwten *William Hurst Verbeterde variëteit der W. v. Amerika, die langere schokken voortbrengt en zeer rijkdragend is.	20	1.30	0.30
167. Doperwten, gele stam of kruip	15	1.—	0.25
169. „ *Bliss' Abundance (overvloeds)	45	1.20	0.30
Zeer aanbevelenswaardig; de planten brengen een groote hoeveelheid doperwten voort, zoodat deze verscheidenheid terecht „overvloeddopper“ is genoemd.			
171. Doperwten, Emerald Gem, vroegegroene extra	45	1.25	0.30
173. „ Girling's extra vroege Deze beide laatste Engelsche soorten zijn buitengewoon vroeg en rijkdragend.	45	1.25	0.30
175. Doperwten, Lentedopper, vroegegroene	60	0.90	0.20
179. „ Carters first crop, vroegegroene, extra . . .	75	1.—	0.25
181. „ *Laxton's Alpha. .	75	1.30	0.30
183. „ eerste vroege Mei of of Prince Albert. .	75	0.80	0.20
185. „ vroege Haarlemsche Van de doperwten met gladden korrel is deze zonder twijfel een der vroegste en daarbij zeer rijkdragend. Van de Hollandsche soorten kan ik deze als één der beste aanbevelen, daar bovendien de smaak zeer fijn is.	90	1.—	0.25
187. Doperwten, *Delicates. . . .	30	1.50	0.35
Lage groene; zeer geschikt voor de inmaak.			

MIDDELVROEGE OF VOLGERS.

193. Doperwten, gewone Mei . . .	75	0.80	0.20
195. „ gele krombek, beste opvolgers	120	1.—	0.25
197. „ Vlijmsche krombek Deze soort wordt in Noord-Brabant op groote schaal gekweekt voor de Engelsche markt. Zij is enorm rijkdragend en zonder twijfel een der beste middelvroege doppers.	90	1.10	0.25
203. Doperwten, *Champion of Eng- land	120	1.50	0.35
207. „ raspers, gele ruige	180	1.40	0.30
208. „ „ groene „	180	—	—

LATE DOPERWTEN.

211. Doperwten, *Daisy	60	1.40	0.30
Late Engelsche Doperwt, groote scheeden, zeer rijkdragend.			
217. Doperwten, gr. Kaapsche groene	90	1.10	0.25
219. „ gewone lage groene	90	0.90	0.20
221. „ groote hooge groene	200	1.10	0.25

CAPUCIJNERS.

227. Capucijners, stam	30	1.20	0.30
229. „ lage vroege grijze	90	1.—	0.25
231. „ gew. lage Kaapsche	90	1.—	0.25
233. „ *lage witte . . .	90	1.35	0.30
235. „ *hooge witte . .	180	1.50	0.35
237. „ laagbloeiende hooge	180	1.20	0.30
239. „ rasper		1.20	0.30

PEULEN.

VROEGE PEULEN.

	Hoog cm.	Prijs p. 5 ons	Prijs p. ons
243. Peulen de Grace, echte vroege stam	15	1.50	0.35
245. Peulen, vroege stam of kruip	45	1.50	0.35
249. „ Lentepoul (40-daagsche)	100	1.25	0.30
251. „ vroege halfstam	70	1.30	0.30
253. „ „ Hendriks	100	1.20	0.30
255. „ gele kwee	100	1.30	0.30
257. „ gewone suiker	120	1.30	0.30
259. „ Moerheim's Reuzen	120	1.60	0.35

Deze in mijne kweekerij gewonnen peul is thans reeds over de geheele wereld bekend en behoeft geen bijzondere aanbeveling meer, daar ze zich een eerste plaats onder de peulsoorten heeft veroverd. Ze groeit pl.m. 4 voet hoog. Haar smaak is uitmuntend.

LATE PEULEN.

261. Peulen, lage grijze roodbl.	75	1.25	0.30
263. „ Ridder, witte	90	1.50	0.35
265. „ groote slier of krombek	150	1.50	0.35
267. „ wijker of zomer	150	1.30	0.30
270. „ hooge groene late	180	1.60	0.35

KOMKOMMERS.

Zaai omstreeks 10 à 12 Mei op een terrein, dat zooveel mogelijk tegen koude winden beschut is. In de bakken kan men reeds in Januari en Februari zaaien. Niets is voor de komkommer zoo schadelijk als koude en natigheid. Het zaaien geschiedt op dezelfde wijze als de Augurken. Evenals voor deze zorge men voor lossen, goed gemesten grond. Om de vruchtbaarheid te bevorderen, moet men de loten, zoodra ze 6 à 7 bladeren hebben, innipen en aan elke plant niet meer dan 8 à 10 der grootste vruchten behouden. Het toedienen van vloeibare mest in een kuiltje bij elke plant, kan vooral bij droog weder worden aanbevolen.

	p. lood.	p. pakje
277. Komkommers, lange gele tros	0.25	0.10
281. „ lange Amsterd.		0.25
In de omstreken van Amsterdam wordt deze soort bijna uitsluitend verbouwd, en geeft prachtige lichtgele vruchten. Ze wordt hoofdzakelijk onder glas gekweekt.		
285. Komkommers, extra lange gele Goliath		0.30
Eene uitmuntende soort om onder glas te kweken. De prachtige groote lichtgele vruchten zijn bezet met zwarte doorntjes.		
286. Komkommers, witte Delftsche broei		0.35
Eene voortreffelijke witte broei-komkommer, welke in het Westland veel wordt geteeld; zeer rijkdragend.		
289. Komkommers, gewone lange groene		0.15
291. Komkommers, Erfurter lange witte		0.35
293. Komkommers, Rollison's Telegraph, groene		0.40
Zeer milddragend en van buitengewoon schoonen vorm.		
294. Komkommers, Alabaster, extra witte broei		0.40
Eene zeer aanbevelenswaardige zuiverwitte broeikomkommer, die in gunstige omstandigheden eene lengte bereikt van 40 à 60 cm.		
295. Komkommers Japansche klimmende	0.40	0.15
Deze moet bij rij's worden gekweekt, en verdraagt beter dan eenige andere, koude en natigheid.		

KOOL.

Bloemkool. De vroege soorten kunnen moeilijk zonder bakken worden gekweekt. Men zaai einde Augustus of begin September op voedzamen grond. Omstreeks half October neme men de plantjes op en plante ze in een bak op 5 cm. afstand onderling, doch late, tot het begint te vriezen, de ramen er af. Ofschoon de plantjes wel eenige vorst kunnen verdragen, moet men bij strenge vorst, vooral des nachts dekken, doch zorg dragen nu en dan bij helder weder, midden op den dag, de ramen een weinig open te zetten. In Maart plante men uit op een warm plekje in den tuin, op een onderlingen afstand van 50 cm., met tusschenpoozen van 14 dagen en dekke in den eersten tijd des nachts met bloempotten. De Erfurter dwerg is de beste om onder glas te worden vervroegd. Indien men geen bakken ter beschikking heeft, zaai men half April, om ze evenals de Sluitkool verder te behandelen. De herfstbloemkool, zooals de uitmuntende verscheidenheden „Algiersche reuzen” en „Veitch's Autumn Giant” zaai men begin Mei. De planten worden op 70 cm. afstand onderling uitgezet. Zij hebben meer ruimte noodig dan de andere koolsoorten om zich goed te kunnen ontwikkelen. De kool moet steeds des morgens zoo vroeg mogelijk worden gesneden, wanneer de morgendauw er nog oplicht.

De Brocoli is een soort Bloemkool en wordt gezaaid omstreeks half Mei en in Juli uitgeplant. In het najaar bindt men de bladeren op, en zoodra het begint te vriezen, brengt men een flinke laag droog blad tusschen de planten. Zoodra de vorst voorbij is, ontbloote men de planten en make de bladeren los; zeer vroeg in 't voorjaar zullen zich dan de koolen beginnen te vertoonen.


Alle koolsoorten verlangen een diepen, niet te drogen, goed gedraineerden grond en een koele standplaats. Alleen voor de vroege kool is het goed een warm plekje in den tuin op te zoeken. Van groot nut is het om het terrein diep om te werken en in 't najaar flink met kalk te bezaaien.

Roode, witte en Savoye kool zaait men gewoonlijk van Maart tot Mei, al naar gelang van de soorten en naarmate men de kool vroeg of laat wenscht gereed te hebben voor het gebruik. Men zaai vooral niet te dik en zoodra de planten een dikte hebben van een ganzeveder, plant men ze uit op een onderlingen afstand van 60 cm., in alle richtingen. Bij elke plant make men een kuiltje om zoo noodig te kunnen gieten.

Spruitkool zaai men tweemaal, nl. begin Maart en einde April. Men gaat op dezelfde wijze te werk als met de sluitkool, doch plant uit op 50 cm. afstand onderling. Men meste niet zoo zwaar als voor andere koolsoorten.

Boerenkool is een der minst veeleischende groenten, zoowel wat grondsoort als standplaats betreft. Men zaai half Mei en plante uit op 50 à 60 cm. afstand onderling. Speciale zorgen vereischt de boerenkool verder niet.


303. Brocoli, late Engelsche witte		0.30
305. Bloemkool, vroege Erfurter broei (gegarandeerd echt) extra	1.10	0.30
De beste soort om te broeien. Zij is verreweg de vroegste en geen enkele andere soort overtreft haar in vastheid en witheid van kool; ze maakt zeer kleine bladeren en is daardoor zeer geschikt voor den bak.		
307. Bloemkool, fijne vroege	0.70	0.25
309. „ kortbeen Lenormand	0.80	0.25
Deze is zeer vroeg en geeft flinke koolen, die niet zeer gevoelig zijn voor ongunstig weder.		
310. Bloemkool, Lecerf's groote middelvroeg	1.20	0.30
311. „ groote Utrechtsche kortbeen	0.80	0.25
313. „ vroege Langendijker	0.80	0.25



Witte kool „Roem van Enkhuizen.”


	Prijs per lood.	Prijs per pakje.
315. Bloemkool , Eclipse, vroegste Ital. Reuzen		0.50
317. „ Algiersche groote, late		0.60
319. „ Non plus ultra, vroege Reuzen		0.45
321. „ Veitch's Autumn Giant, late Reuzen.		0.60
De vier laatste soorten zijn afkomstig uit Italië en geven bloemkoolen van enorme afmeting. Ze moeten echter niet te dicht worden geplant.		
322. Witte kool , „Roem van Enkhuizen”	0.25	0.10
Deze vroege soort geeft zeer vaste, uiterst fijn geribde kool; bijzonder aanbevelenswaardig.		
323. Witte kool , vroegste Express	0.25	0.10
Deze is zeer vroeg en geeft vaste spitsvormige koolen.		
325. Witte kool , fijne vroege kortbeen	0.20	
327. „ „ vroege spitse suikerbroods	0.25	0.10
331. Witte kool , spitse Winningstädter	0.30	0.10

Deze soort geeft langwerpige, spitse en zeer smakelijke koolen. Aan de eigenaardige groeiwijze kan men ze reeds van verre herkennen.



Witte kool, Winningstädter.

	Prijs per lood.	Prijs per pakje.
333. Witte kool , kortbeen Bruns- wijker groote platte	0.20	
335. Witte kool , kortbeen groote late	0.25	0.10
337. „ „ Langedijker	0.25	0.10
In Noord-Holland wordt deze bijna uitsluitend gekweekt en bij groote massa's naar binnen- en buitenland verzonden.		
338. Witte kool , Maagdenburger groote witte	0.25	0.10
341. Witte kool , Deensche groote vaste winter		0.25
Uitmuntensoort. Deze is cender beste voor wintergebruik.		
353. Roode kool , fijne Utrechtsche zwart-roode	0.45	0.20
355. Roode kool , gewone donker- roode groote	0.35	0.15
357. Roode kool , groote late	0.35	0.15
359. „ „ „Zenith”	0.70	0.30
Eene middelvroeg soort, welke zeer donkerroode, vaste, fijngeribde koolen levert van middelmatige grootte.		
360. Roode kool , Langedijker donker- roode late Winter	0.70	0.30
Zeer aanbevelenswaardige late soort.		
361. Kapperkool , groote met blauwe randen	0.45	0.20
365. Savoye kool , platte groote gele Rijnsburger		0.30
367. Savoye kool , groote gele, extra	0.25	0.10
369. „ „ fijne vroege, gele	0.25	0.10
371. „ „ Bloemendaalsche gele	0.20	
373. Savoye kool , fijne vroege groene	0.20	
377. „ „ Bredasche fijne groene	0.35	0.15
379. Savoye kool , groote groene late	0.30	0.10



Spruitkool „Hercules.”

391. Spruitkool , „Hercules”	0.25	0.10
Zooals de afbeelding aantoont, brengt deze prachtige Spruitkool een zeer groote menigte spruitjes voort, die bijzonder stevig en van een heerlijken smaak zijn.		

	Prijs per lood.	Prijs per ons.
393. Spruitkool , Brusselsche hoge	0.15	
395. " " lage	0.20	
401. Boerenkool , lage groene gekrulde	0.15	
403. " middelhooge groene gekrulde	0.15	
404. Boerenkool , middelhooge met tongvormig blad	0.20	
Extra fijn gekrulde soort.		
405. Boerenkool , hoge groene ge- krulde	0.15	
409. Zeekool , Crambe maritima . . .	0.25	

Een zeer smakelijke groente, die in Engeland in groote hoeveelheden wordt geteeld, om des winters of vroeg in 't voorjaar te worden gebruikt. Zij moet evenals de Cichorei gebleekt worden; haar smaak heeft eenige overeenkomst met de Asperge en ze wordt ook op ongeveer dezelfde wijze toe bereid. Ze wordt gezaaid in April.

KOOL- of KNOLRAPEN.


Deze zijn slechts eene verscheidenheid van de kool. Terwijl men van Sluitkool de tot een krop gegroeide bladeren nuttigt, en van Bloemkool den in wording zijnden bloemstengel, zoo wordt van de Koolrapen de knolvormig vergroeide stengel of wortel gebruikt, naar gelang deze zich boven of onder den grond tot een knol vormt. Die welke boven den grond groeien, worden gewoonlijk Koolrabi of Glaskoolrapen genoemd, in onderscheiding van de gewone Koolrapen (onder den grond). Beide groepen worden op dezelfde wijze gekweekt. Men zaait omstreeks half Mei. Wanneer men vroeger zaait, zoo worden ze, indien ze niet jong worden gebruikt, onsmakelijk en stokkerig op schotel. Beide soorten kunnen worden verplant, op onderlingen afstand van 35 à 40 cM., ofschoon het beter is de gewone koolrapen terstond ter plaatse te zaaien en later uit te dunnen. Wat den aard van den grond betreft zijn zij niet zoo kieskeurig als de koolsoorten.



Koolraap.

419. Koolrapen , gewone witte . . .	0.15	
421. " " gele . . .	0.15	0.70
423. " groote gele blauwkop	0.15	0.70
426. " Rutabaga of Zweedsche	0.25	

KOOLRABI of GLASKOOLRAPEN.



Koolrabi.

433. Koolrabi , Weener kleinbladerige fijne blauwe	0.30
435. Koolrabi , Weener kleinbladerige fijne witte	0.30
Deze 2 soorten groeien boven den grond.	

MELOENEN en CANTALOUPEN.

Meloenen zaait men einde Januari of begin Februari in den warmen bak in rijkelijk gemesten vruchtbaren grond. Na 4 weken zaait men nog eens, daar bij strenge vorst het eerste zaaisel dikwijls mislukt, vooral wanneer men bij donker weder of sneeuw niet dikwijls genoeg lucht kan geven. Omstreeks 4 weken na het zaaien worden de plantjes verspeend op een onderlingen afstand van 12 à 13 cM., eveneens in een warmen bak. Zoolang de plantjes in dien bak staan, moet men zooveel mogelijk lucht geven. In Maart (voor het tweede zaaisel in April) snoeit men ze boven het tweede blad in en brengt ze ter plaatse. De beide vertakkingen, die zich nu bij elke plant zullen vormen, laat men groeien totdat zij elk 8 à 10 bladeren hebben, waarna men ze tot boven het zesde blad innijpt. In 't begin van Mei zal men bij een goede behandeling op deze wijze de eerste vruchten kunnen plukken. Bij het kweken van Meloenen is het van het grootste belang er voor te zorgen, dat de temperatuur in de bakken meestijds hooger is dan 12 graden Celsius. Vooral tegen dat de vruchten rijp zijn, is een hooge temperatuur zeer gewenscht.

449. Meloen , Berlijnsche net, zeer groot	0.40
Algemeen bekende soort.	
455. Meloen , Jenny Lind	0.30
Kleine Meloen met groen vleesch.	
459. Meloen , Surprise (oranjekleurig vleesch)	0.40
462. Cantaloup , de Paris	0.25
Parijsche marktmeloen.	
465. Cantaloup , noir des Carmes .	0.40
Een der vroegste meloenen, die het gemakkelijkst gekweekt wordt, terwijl de donkergroene, somtijds bijna zwarte vruchten, een bijzonder fijnen, geurigen smaak hebben.	

510. Rabarber, Challenge

Nieuwe variëteit welke vele zware, roode stengels voortbrengt.


Voor **Planten** zie blz. 71 „Groente- en Specerij-planten.”

RADIJS.

In de bakken kan men Radijs zaaien in Januari en Februari. Op den kouden grond begint men hiermede bij open weder in 't laatst van Februari, voor de tweede maal zaait men 3 weken later, en vervolgens gedurende den geheelen zomer, zelfs tot laat in den herfst, geregeld om de veertien dagen. In de warme zomermaanden kieze men daartoe een koel en beschaduwde terrein. Zoodra de plantjes opkomen, moeten ze op plekken waar ze te dicht staan, worden uitgedund. In vele tuinen wordt dit nagelaten, doch dit verzuim is dan gewoonlijk oorzaak, dat ze slechts dunne, spillige wortels voortbrengen. Al naar gelang van den tijd des jaars, kan men de Radijs 4 à 6 weken nadat gezaaid is, gebruiken.

519. Radijs, Triumph-broei

De knol is kogelrond, wit met horizontale scharlakenroode streepen. Ook geschikt voor den vollen grond.

*Radijs, Ijskegel.***521. Radijs Ijskegel**

Zooals de naam reeds aanduidt, heeft deze radijssoort de vorm en de doorschijnende kleur van een ijskegel. De smaak is zeer pikant en maakt haar tot een van de beste soorten.

523. Radijs, non plus ultra af ronde scharlakenroode kortlof broei, extra**525. Radijs, rozeroode kortlof broei .****527. „ scharl. roode witpuntige broei****529. „ ronde witte kortlof broei****531. „ „ scharlakenroode .**Prijs
per ons.Prijs
p. lood.

0.15

1.10

0.15

0.80

0.15

0.90

0.15

0.90

0.15

0.90

0.15

0.90

0.15

0.70

0.10

533. Radijs, ronde roode gewone . .**535. „ „ witte gewone . .****537. „ „ roode witpuntige****541. „ halflange roode witpuntige****543. „ „ scharlakenroode .****544. „ vollegrondsoorten gemengd**Prijs
per onsPrijs
per lood.

0.70

0.10

0.70

0.10

0.70

0.10

0.75

0.10

0.75

0.10

0.60

0.10

RAMENAS.

De Ramenas is een verscheidenheid van de Radijs, doch de meeste variëteiten nemen veel grootere afmetingen aan dan deze, indien men ze laat doorgroeien. De zomer-ramenas wordt gezaaid in Maart en April, doch schiet dikwijls door, waarom men met de winter-Ramenas gewoonlijk meer succes heeft. Deze wordt niet vóór Juni gezaaid. Men zaait de Ramenas op regels die 40 cM. van elkaar verwijderd zijn, en men dunt de jonge plantjes zoodanig uit, dat ze op 20 cM. afstand in de regels komen te staan. Men late de wortels niet te dik worden, daar ze dan den aangename smaak verliezen. In een koelen kelder kan men de winter-Ramenas tot in het voorjaar in zand bewaren.

547. Ramenas, ronde zwarte zomer .

0.15

553. „ „ „ winter .

0.15

555. „ lange zwarte „ .

0.15

RAPEN of KNOLLEN.

Deze gedijen in bijna elken grond. Het best echter op terrein dat het vorige jaar gemest is. Vooral op lichte gronden is het zeer nuttig in het najaar den grond met kalk te bezaaien en dan om te spitten. De vroege soorten zaait men op een beschutte plaats in 't laatst van Februari of begin Maart en vervolgens telkens om de drie weken tot half Mei. Van af Juni tot Augustus neemt men de latere verscheidenheden. Wanneer men voor de laatste maal zaait, is het echter beter om weder Meirapen te nemen. Men zaait, uit de volle hand of op regels; volgens de laatste methode maakt men de regels op 25 cM. afstand van elkaar. Voor voldoende uitdunnen moet vooral worden gezorgd, daar men anders geen flinke knollen kan verwachten.

567. Rapen, Italiaansche vroegste roodkoppige witte Mei .

1.20

0.20

571. „ platte witte Mei

0.90

0.15

573. „ half. witte Hilversumsche

0.20

575. „ lange Nijmeegsche witte

0.20

577. „ ronde witte herfst. . .

0.15

579. „ „ gele herfst . . .

0.75

0.10


p. 1/4 ons.

583. RAAPSTELN

0.70

0.20

Deze zaait men in Februari of Maart. Daar men deze groente gewoonlijk te dicht zaait, moet hierop vooral worden gelet.

*Rapen.*

SALADE.

Kropsalade verlangt, evenals de meeste bladgroenten, een goed gemesten grond. Om gedurende den geheelen zomer kropsalade te kunnen snijden, moet men dikwijls zaaien en voor elk jaargetijde de daarvoor meest geschikte soorten nemen. Om vroeg kropsalade te kunnen hebben, zaai men half September en wel vroege roodrand, bonte Chili of dergelijke. Zoodra de plantjes 3 à 4 bladeren hebben, plant men ze op een beschutte plaats of liever nog in een kouden bak op 10 cM. afstand van elkaar. De ramen moeten, tot dat het begint te vriezen, niet op den bak worden gelegd; slechts bij strenge vorst mag worden gedekt, terwijl men veel lucht moet geven. Een dun laagje sneeuw maakt het bedekken, ook van de planten, die op den kouden grond overwinteren, overbodig. In Maart begint men, zoodra het weder zulks toelaat, met het uitplanten op een warme plaats en op 25 cM. afstand onderling. Reeds in Mei beginnen de eerste kroppen zich te vertoonen. Voor het vervroegen in den bak zaai men eveneens in September, doch kiese dan uitsluitend broeisoorten. Om een opeenvolging van kroppen te verkrijgen, moeten de planten niet alle tegelijk worden uitgeplant. In Maart wordt weder op den kouden grond gezaaid, doch vooral niet te dik. Een gedeelte der plantjes worden uitgeplant, terwijl men de andere van afstand tot afstand laat staan; deze laatste zullen dan eenigen tijd eerder beginnen te kroppen dan de andere. Begin April zaait men nog weer een vroege soort en begint in de laatste helft van April met de latere verscheidenheden te zaaien, met 3 weken tusschentijds, tot einde Juli. De zomerkropsla wordt op 30 cM. afstand onderling uitgeplant.

Snijsalade wordt gewoonlijk in Maart en April gezaaid en wel uit de volle hand of op 10 cM. van elkaar verwijderde regels. Men behoeft er verder geen zorg aan te besteden dan schoonhouden. De **Pluksalade** is eene verscheidenheid tusschen de snij- en kropsalade in. Zij is zeer vroeg en geeft dik gezaaid ook eene uitmuntende snijsalade. De losse kroppen die zij vormt (wanneer deze de ruimte hebben om zich te ontwikkelen) leveren gestoofd eene uitmuntende groente. **Bindsalade** wordt in Mei en Juni gezaaid en geheel op dezelfde wijze behandeld als de kropsalade; alleen moet ze evenals de Andijvie worden opgebonden, om het geel worden der binnenste bladeren te bevorderen. De teelt der **Veldsalade** is zeer eenvoudig; men zaai einde Augustus of begin September, en zorg bijtijds voor voldoende uitdunnen. Zij groeit in bijna elken niet te drogen grond.

588. **Kropsalade, Maikönig**

Deze ontwikkelt zich bijzonder vlug en is daardoor als broeisalade zeer aan te bevelen; hare grootte en malschheid overtreffen die van alle andere soorten.

589. **Kropsalade, vroege kleine roodrand**590. **Kropsalade, kardoezen**

Een uitstekende broeisalade, die op de groenteveiling in Holland meestal den dubbel prijs van andere soorten opbracht.

591. **Kropsalade, gewone groote gele**593. „ **bonte Chili, echt**

Op alle gronden, doch vooral op zandgrond, is deze soort de kropsalade bij uitnemendheid. Zij kan gedurende den geheelen zomer worden gezaaid, en vormt groote zeer malsche kroppen, die niet spoedig doorschieten. De bladeren zijn eenigszins roodachtig gerand.

595. **Kropsalade, Berlijner witte**597. „ **Rotterdamsche blanke**599. „ **Duitsche groote gele**600. „ **Banket- of Posteleinkrop**603. **Kropsalade, Zeeuwsche blanke**605. „ **gele Trotskop**

Vormt zeer vaste kroppen.

Prijs
per lood.

Prijs
per pakje.

606. **Kropsalade, Laibacher Eis**

Zeer geschikt om te stoven.

613. **Kropsalade, Erfurter reuzenkrop**617. **Snijsalade, Fransche latuw**619. „ **blanke kropdunsel, fijne vroege**620. **Snijsalade, kruldunsel**621. **Pluksalade, Amerik. roodrand**623. „ **Australische gele**629. **Veldsalade, groote N.-Holl.**

Per 1/4
ons.

Per
lood.

Per
pakje.

0.60

0.20

0.65

0.20

0.35

0.35

—

0.80

1.10

0.20

0.40

0.55


0.10

0.15

0.20



„Kropsalade „Maikönig.“



Pluksalade.

631. **Veldsalade**, donkergroene met vol hart

Bij deze verscheidenheid groeien de bladeren in rozetjes, zoodat zij gelijken op kleine kropjes. Door hare malschheid munt zij bijzonder uit.

637. **Molsalade**, verbeterde breed-bladerige

639. „ volhart

De kweekwijze van molsla is zeer eenvoudig. Men zaait ze in Maart of April en verplant ze in Mei of Juni op regels, die 35 cM. van elkaar verwijderd zijn. Men kan ze bleeken door in den herfst op elke plant een bloempot te zetten of het bed met zand te bedekken. Zij kan echter ook als de Cichorei worden behandeld.



Bindsalade.

641. **Bindsalade**, geelbladerige

SCHORSENEEREN.

Zaai einde Maart op regels die 20 cM. van elkaar verwijderd zijn. De plantjes worden tot op 10 cM. afstand onderling uitgedund. De Schorseneer verlangt een voedzamen, ofschoon niet versch gemesten grond, welke diep moet zijn omgespit. Op koude en zware gronden zaaie men omstreeks half Augustus. De jonge plantjes zijn niet zeer gevoelig voor vorst en beginnen vroeg in 't voorjaar weer te groeien; deze worden zwaarder dan die, welke in 't voorjaar zijn gezaaid. Gewoonlijk kan men echter, door in 't voorjaar te zaaien, reeds in 't najaar flinke wortels verkrijgen, vooral als men Reuzenschorseneeren zaait. Als alle wortels in 't voorjaar niet zijn gebruikt, kan men de overgeblevene laten staan en kunnen ze in 't volgend najaar nog worden gebruikt, ofschoon ze niet zoo malsch en smakelijk zijn als de eenjarige.

645. **Schorseneeren**, gewone zwarte

647. „ lange zwarte Russische Reuzen

SELDERIJ.

De Selderij houdt van een frisschen, voedzamen, goed gemesten grond, die liever vochtig dan droog moet zijn. Het zaad moet evenals dat van de Peterselie lang in den grond liggen eer het opkomt.

Tuin- of Snijselderij zaait men begin April op den kouden grond. Bij aanhoudende droogte moet men zoo nodig gieten. Als de plantjes 4 à 5 blaadjes hebben, worden ze verplant en vereischen dan verder geen bijzondere zorg.

Bleekselderij. Om vroeg planten te kunnen hebben, zaaie men in Februari onder glas, of (als men daarvoor geen bak disponibel heeft) einde Maart in den open grond. Als de plantjes nog klein zijn, worden ze in den bak verspeend en na een week of 4 op den kouden grond uitgeplant. In de meeste tuinen wordt de

Prijs
per 1/4 ons 0.30
Prijs
p. lood. 0.15


Per lood. 0.40
Per pakje. 0.15

p. 1/4 ons.

bleekselderij in diepe voren geplant; om dit met succes te kunnen doen, moet men hoog gelegen terrein en een dikke laag teelaarde hebben, daar anders de planten licht gaan kwijnen. Meer is het daarom aan te bevelen om op bedden te planten met 3 regels, welke 30 cM. van elkaar verwijderd zijn. In de regels behoudt men denzelfden afstand tusschen de planten onderling. Daar men voor het bleeken veel aarde nodig heeft, laat men tusschen de bedden een strook grond open van 75 à 80 cM. breed, welke men voor Radijs, Spinazie enz. kan benuttigen. Wanneer de planten bijna haar volkomen wasdom hebben bereikt, bindt men bij droog weder de bladeren van elke plant bij elkaar en strooit met een schop de aarde uit de overgebleven ruimte tusschen de planten, zoodat ze ongeveer tot op de helft zijn ingegraven. Na een dag of tien begraaft men ze zoodanig onder de aarde, dat alleen de toppen der bladeren zichtbaar zijn. Na een veertien dagen zijn ze geschikt voor de keuken en daar ze in dien toestand niet lang kunnen duren, moet men niet te veel planten tegelijk bleeken, telkens met 14 dagen tusschenpoozen.

Knolselderij wordt op dezelfde wijze gezaaid als de vorige, doch opdat de knol zich flink kan ontwikkelen, moeten de planten een weinig meer ruimte hebben en plante men uit op 40 cM. afstand in alle richtingen. Om zware knollen te verkrijgen wordt aanbevolen om gedurende den zomer een paar malen de horizontale wortels met een spade af te steken, zorgdragende de dieper liggende niet te beschadigen. Indien men ze vóór de vorst in een koelen kelder plaatst, kan men ze gedurende den geheelen winter bewaren.

651. **Tuinselderij**, fijne snij



Bleekselderij Engelsche grove.

655. **Bleekselderij**, Engelsche grove

663. **Knolselderij**, dikke kortlof

665. „ Reuzen van Praag
Brengt buitengewoon groote knollen voort.

SJALOTTEN.

Men plante de Sjalotten zoo vroeg mogelijk na den winter op regels die 25 cM. van elkaar verwijderd zijn, terwijl de bolletjes op 10 cM. afstand onderling komen te staan, zorgdragende dat de bovenste helft derzelve boven den grond uitkomt. Ze vereischen een voedzamen doch liefst niet versch gemesten grond. Begin Juli kan men ze optrekken en vóór dat men ze naar een droge plaats of zolder brengt, laat men ze eenige dagen in de zon drogen.

669. **Sjalotten**, om te planten

670. „ kleine voor de inmaak

Prijs
per lood. 0.15
Prijs
p. pakje. 0.05

per Kilo.

0.70

0.80

SPINAZIE.

Van deze algemeen bekende groente valt weinig bizonders te vermelden. De zomer-spinazie en reuzenspinazie zaait men in Februari, Maart en April, telkens om de 2 à 3 weken; de winterspinazie in September tot begin October, en wel op 25 cM. van elkaar verwijderde regels. Om een goede opbrengst te verkrijgen moet flink worden gemest.

	Prijs per 5 ons.	Prijs per 1½ ons.
673. Spinazie, breedblad, scherpzaad, zomer	0.80	0.30
674. Spinazie, breedblad, rondzaad zomer	0.80	0.30
675. Spinazie, rondzaad winter	0.95	0.35
677. „ Reuzenblad van Viroflay	0.95	0.35
679. Spinazie, laat doorschietende scherpzaad	1.10	0.40
681. Spinazie, Victoria, donkergroen zomer	1.—	0.35

Uitmuntende soort voor den zomer, die niet spoedig doorschiet.

683. Overblijvende Spinazie (Rumex Patientia)

Deze behoort tot hetzelfde geslacht als de Zuring en wordt geheel op dezelfde wijze gekweekt. Zaaityd April.

Het is noodzakelijk deze soort ieder jaar opnieuw te zaaien, daar overjarige planten min of meer giftige eigenschappen bevatten.

685. Nieuw-Zeelandsche Spinazie (Tetragonia expansa)

Wordt gezaaid in Mei en vereischt weinig zorg.

Per ons.	Per lood.	Per pakje.
0.50	0.10	
0.50	0.10	

TOMATEN.

Zonder kunstmatige warmte kan de Tomaat zich in ons land niet volkomen ontwikkelen. Omstreeks half Maart zaait men in een warmen bak en zodra de plantjes 3 bladeren hebben, worden ze in een anderen bak verspeend op 12 cM. afstand in alle richtingen. In 't begin van Mei neemt men overdag de ramen af om de planten langzamerhand aan de lucht te gewennen. In de laatste helft van Mei plant men ze uit in den open grond. Om het zetten der vruchten te bevorderen, moeten de loten nu en dan worden ingelepelen. Zodra de vruchten zich hebben gezet, moet men dikwijls gieten.

692. Tomaten „Alice Roosevelt”

Eene vroege variëteit met groote, gladde, donker scharlakenroode vruchten, van eenen heerlijken smaak.

693. Tomaten „Deensche Export”

Deze wordt in Denemarken op groote schaal in den vollen grond gekweekt en kan door haar groote vruchtbaarheid en buitengewone gehardheid tegen ongunstig weer niet genoeg worden aanbevolen.

694. Tomaten „Jennie Vermeer”

Deze nieuwe Tomaat is gewonnen door de Groentekwekerij „t Huis de Geer” en van buitengewone vruchtbaarheid, zoo zelfs dat zij alle andere tot hiertoe bekende soorten overtreft. Zij geeft mooi gevormde, vleezige vruchten en is de opbrengst tot 30 pond per plant. Voor hen die iets extra's willen kweken op dit gebied kan ik deze soort dan ook met warmte aanbevelen.

695. Tomaten, groote roode**TUINKERS.**

De Tuinkers zaait men gewoonlijk in Februari en Maart, ofschoon men dezelve gedurende den geheelen zomer kan zaaien, doch dan liefst op eenigszins beschaduwde terrein. Geen plant is gemakkelijker te kweken dan deze.

711. Tuinkers, gewone**UIEN.**

De Ui is een der weinige groenten, die men met succes eenige jaren achtereenvolgend op denzelfden grond kan kweken, indien men er de noodige zorgen aan besteedt. Voor bemesting moet men vooral geen ruwe bestanddeelen nemen, zooals versche stalmest enz. Kippen- of duivenmest, guano- of goed verteerbare stalmest is het meest aan te raden. Wanneer de grond voor het zaaien gereed is, wordt aanbevolen om een mengsel van roet en zout er zeer dun over te zaaien. Men zaait uit de volle hand of op regels, welke dan naar gelang der soorten, 10 tot 15 cM. van elkaar moeten verwijderd zijn, zorgdragende dat het zaad niet te diep door den grond worde bedekt. De plantjes worden tot op 10 à 12 cM. afstand onderling uitgedund. Om zeer vroeg uien te hebben, zaait men in de laatste helft van Augustus tamelijk dik. Gedurende den winter beschut men ze tegen koude en schrale winden, door eenig erwtenrij's zorgvuldig over de bedden te leggen. Indien men deze plantjes vroeg in 't voorjaar, zodra de grond dit toelaat, verplant



Tomaten „Jennie Vermeer.”

op 30 cM. van elkaar verwijderde regels en 15 cM. onderlingen afstand, zoo zijn zij bij een goede behandeling reeds in Augustus voor 't gebruik geschikt. Voor deze methode leent zich in 't bijzonder de Zwijsdrechtsche groote gele, die een enorme grootte kan verkrijgen. De kleine, witte uitjes voor den inmaak zaait men in Maart vrij dik, en indien men regelmatig gezaaid heeft, behoeft men niet te dunnen; deze kunnen reeds in Juli geoogst worden.

715. Uien, platte stroogele N.-Holl.	Prijs per lood.	0.25
717. „ „ groote gele Zwijsdrechtsche	Prijs p. pakje.	0.30
719. „ platte bloedroode Hollandsche		0.50
721. „ platte bruine Zeeuwsche		0.25
725. „ vroege witte St. Jans (inmaak).		
727. „ kleine zilverwitte Italiaansche inmaak		
733. „ Zittauer ronde gele reuzen		

WATERKERS.

De Waterkers is een plant, die in sommige streken van ons land ook in 't wild voorkomt, vooral op vochtige plaatsen. Men zaait op een vochtige plaats in April, zorgdragende veel te gieten, daar ze zonder veel water niet den aangename geur heeft. In Engeland vooral wordt de Waterkers veel gebruikt met een weinig zout bij het ontbijt. De smaak is zeer geurig en het is een zeer gezonde groente.

741. Waterkers

WORTELEN.

Wortelen zaait men, evenmin als alle wortelgroenten, niet op versch gemesten grond, daar ze anders dikwijls scheef groeien en splijten. In den bak zaait men voor de eerste maal einde December en vervolgens half Januari en half Februari. Men neme alleen de broeisoorten. Op deze wijze kan men de keuren van April tot Juni van wortelen voorzien. In den open grond zaait men voor de eerste maal in de maand Maart een der broeisoorten. Om een geregelde opeenvolging van jonge malsche wortelen in den tuin te kunnen hebben moet men dit alle vier weken herhalen, en telkens die verscheidenheden nemen welke voor den tijd des jaars het meest geschikt zijn. Het zaaien geschiedt zoowel uit de volle hand als op rijen, die men dan dicht naast elkaar kan maken. Na het zaaien moet de grond flink worden aangetreden, daar anders de zaadkorrels door de kromme haren, waarvan ze voorzien zijn, niet genoeg met de aarde in aanraking komen. Wanneer de plantjes 3 à 4 blaadjes hebben, dunt men ze zoodanig uit, dat ze een onderlingen afstand van 3 à 4 cM. hebben, waarna het goed is nog eens aan te treden. In 't begin van Juli zaait men voor de laatste maal en van dit of van een der laatste zaaisels kan men dikwijls gedurende een groot gedeelte van den winter smakelijke jonge wortelen plukken, indien men ze met een dikke laag droge bladeren voor de vorst bedekt. De winterwortelen zaait men in Mei.

745. Wortelen, Parijsche ronde roode broei	Prijs per lood.	0.50	Prijs p. pakje.	1.—
747. „ „ Amsterdamsche halflange stomppuntige roode broei		0.35		0.70

Voor den broeiteelt is deze de wortel bij uitnemendheid en wordt door geen enkele andere soort overtroffen. De schoongevormde roode stomppuntige wortelen hebben bijna geen hart en munten uit door zoeten en aangename smaak. Ook kan zij zeer goed op den kouden grond worden gezaaid en is dan eveneens zeer vroeg. Door deze uitmuntende hoedanigheden wordt zij terecht zeer gezocht. Daar ik dit jaar een flinke partij heb geteeld, kan de prijs zoo billijk worden genoteerd.

749. Wortelen, korte roode deuvik of broei	Prijs p. lood.	0.40	Per 1/4 ons.	0.80
751. „ dubbele deuvik		0.45		0.90
755. „ Zwijsdrechtsche vroege korte roode		0.35		0.70
759. „ vroege fijne roode glas		0.50		1.—
761. „ halflange stomppuntige roode van Nantes		0.35		0.70
763. „ Hoornsche halflange roode		0.35		0.70
765. „ lange roode stomppuntige		0.15		0.30
Voor herfstgebruik en voor winterwortel is deze bijzonder geschikt.				
769. Wortelen, Nijmeegsche lange roode winter		0.35		0.70
771. „ Flakkeesche lange roode		0.20		0.40
773. „ Friesche stomperroode		0.25		0.50

ZURING.

Men zaait in April op regels en dunt na eenigen tijd zoodanig uit, dat de planten 20 centim. van elkaar verwijderd komen te staan. Twee maanden nadat men gezaaid heeft, kan men reeds beginnen eenige bladeren te plukken. In ons land wordt de zuring echter hoofdzakelijk vroeg in 't voorjaar gesneden. Ofschoon men de zuring zeer goed uit zaad kan kweken, is het toch raadzamer om planten te nemen met enkel mannelijke bloemen, daar deze geen zaad voortbrengen en daardoor een grooteren opbrengst aan forsche breede bladeren geven. Voor die planten zie blz. 71 Groente- en Specerijplanten.

779. Zuring, breedblad of nobel	0.15
---	------

DIVERSE ZADEN.

(De zaaitijd is achter elke soort vermeld.)

781. Anijs (April)		p. pakje	0.20
783. Basilicum, grove (April)			0.15
785. Boonenkruid (April-Mei)	0.25		0.10
786. Boterkool (Mrt.-April)	0.15		
787. Cardonzen (April-Mei)			0.20
789. Citroenmelisse „	0.35		0.15
790. Coriander „	0.30		0.10
791. Dessertblad (Malva Crispa) (Apr.-Mei)			0.10
793. Dille (April-Mei)			0.10
795. Dragon Russische (Maart)			0.25
Deze komt veel overeen met de echte overblijvende Dragon, doch heeft niet die aangename geur. De echte Dragon brengt nooit rijpe zaden voort, en kan alleen door stekken of afleggers worden gekweekt. Voor planten zie blz. 71 Groente- en Specerijplanten.			
797. Kervel, gewone (Mrt.-Apr.)	0.10		
Per ons . . . f 0.60			
799. Komijn (April-Mei)			0.15
801. Lavendel „			0.20
803. Lepelblad „			0.15
805. Lieve-vrouwe-bedstroo of Waldmeister (April-Mei)			0.40
807. Majoraan „			0.20
809. Melde, gele (April)			
810. „ roode „			

	Prijs per lood.	Prijs per pakje.		Per lood.	Per ons.	Per kilo.
811. Mosterd, bruine (Mei)			RIJSTMELDE (Chenopodium Quinoa)	0.30	2.—	15.—
813. Peper, Spaansche (Febr.-Mrt.)		0.15	Een nieuw voedergras dat een enorme opbrengst geeft, zelfs op schrale gronden. Het zaad is ook voor menscheijk voedsel te bereiden.	100 zad.	1000 zaden.	10000 zaden.
815. Pimpernel (April)		0.15				
Raapstelen, zie bij Rapen.			ZEA MAIS	1.25	10.—	90.—
819. Rozemarijn (April-Mei)		0.20	Deze Maissoort wordt zelfs in zeer ongun- stige omstandigheden, volkomen rijp. Zij groeit slechts 1 M. hoog en iedere plant draagt 2 tot 6 kolven.			
821. Salie	0.30	0.10				
823. Snijmoes blauwe Groninger (Maart-Aril) per ons f 0.50	0.10					
831. Thijm (April-Mei)		0.25				
833. Venkel	0.30	0.10				
835. Wijnruit		0.20				



Landbouwzaden.

GRASZADEN.

De prijzen van Gras- en Klaverzaden kun-
nen niet vóór **begin Februari** definitief
worden vastgesteld en zullen dan gaarne op
aanvraag worden verstrekt.

Voor het aanleggen van weiden gelieve men
dienaangaande met mij in correspondentie te
treden en daartoe de grootte van het terrein
en de gesteldheid van den bodem op te
geven. Ook dient te worden in aanmerking
genomen, of men blijvend weiland wenscht of
den wisselbouw toepast. Opgave der benoo-
digde soorten, hoeveelheden en prijsopgave
wordt door mij gaarne verstrekt en alle moge-
lijke inlichtingen daaromtrent gegeven.

Voor minstens 10 Kilo graszaad wordt
de prijs per 100 Kilo berekend.

839. Engelsch Raygras, Lolium perenne	
841. Italiaansch Raygras, Lolium italicum	
843. Westerwoldsch Raygras	
845. Florigras, Agrostis stolonifera	
847. Vossestaart, Alopecurus pratensis	
849. Reukgras, Anthoxanthum odo- ratum	
851. Fransch Raygras, Avena elatior	
853. Kamgras, Cynosurus cristatus	
855. Kropaar, Dactylus glomerata	
857. Hard Zwenkgras, Fest. duri- uscula	
859. Rood Zwenkgras, Fest. rubra	
861. Schapengras, Fest. ovina	
863. Beemdlanbloem, Fest. pratensis	
865. Wollig Zorggras, Holcus lanatus	
867. Timotheegras, Phleum pratense	
869. Boschbeemdgras, Poa nemoralis	
871. Veldbeemdgras, „ pratensis	
873. Ruwbeemdgras, „ trivialis	
875. Gazongras, in de beste soorten gemengd	2.—

KLAVERZADEN.

881. Noord-Brabantsche roode.	
883. Roozendaalsche roode.	
884. Overblijvende roode klaver (Cowgras.)	
885. Inlandsche witte.	
887. Luzerne Provencer.	
889. Zweedsche bastaard.	
891. Incarnaat.	
893. Gele Hoppeklaver.	
(Prijzen worden gaarne begin Februari opgegeven.)	

ZADEN VAN WORTELGEWASSEN.

894. Mangelwortelen Barres van Sludstrup, halflange gele	2.10	0.25
Eene zeer aanbevelenswaardige, nieuwe variëteit, welke bij eene proef op mijne boer- derij uitstekend heeft voldaan.		
895. Mangelwortelen, Groninger extra lange roode	2.—	0.25
897. „ Mammouth roode reuzen	2.—	0.25
899. „ extra lange gele reuzen	2.—	0.25
901. „ Golden Tankert.	2.—	0.25
902. „ Eckendorfer roode reuzen	2.—	0.25
903. „ Eckendorfer gele reuzen	2.—	0.25
905. Suikerwortelen, groenkraag	2.—	0.25
907. „ jaapjespeen, rose	1.80	0.20
909. Koolrapen, groote gele blauwkop	6.—	0.70
915. Knollen of Rapen, gew. gele herfst	6.—	0.75
919. Turnips, lange witte roodkoppige		0.90
921. „ groote gele „		1.—
923. Voederwortelen, Nijmeegsche lange roode		2.60
925. „ groote roode Paarde- of koepeen		1.20
926. „ groote gele koepeen		1.50
927. „ lange witte of pink- sternakels		0.40

Voor bovenstaande Wortelgewassen
geldt de prijs per Kilo voor minstens
2½ ons.

ZADEN voor den GROENVOEDERBOUW.

Bij belangrijke partijen gelieve men
eerst prijsopgave aan te vragen.

935. Lupinen, gele (Lupinus luteus).	
945. Seradella, (Ornithopus sativus).	
947. Spurrie, gew. (Spergula arvensis).	
949. „ reuzen (Spergula maxima).	

Bloemzaden.

Tot versiering onzer bloemtuinen komen hoe langer hoe meer de éénjarige Zomerbloemen in gebruik en m. i. zeer terecht. Door doelmatige keuze der soorten en elkaar opvolgende uitzaaiingen kan elk bloemenliefhebber die een eenigszins gunstig gelegen stukje tuingrond bezit, zich gedurende den geheelen zomer tot laat in den herfst van bloemen voorzien, ook zonder dat hij over een serre of broeibak kan beschikken.

COLLECTIËN BLOEMZADEN.

Voor hen, die met de keuze der soorten minder goed bekend zijn, heb ik evenals vorige jaren eenige collectiën samengesteld van verschillende soorten Zomerbloemen, waaronder Asters, Zomerviolieren, Balsaminen, Portulaca, Klimplanten, Stroobloemen of Immortellen, Siergrassen etc. tegen de volgende uiterst lage prijzen.

Collectie A.	10 pakjes in 10 soorten, Zomerbloemen	naar mijne keus	f 1.25
„ B.	20 „ „ 20 „ „	„ „ „	- 2.—
„ C.	40 „ „ 40 „ „	„ „ „	- 3.25
„ F.	10 „ „ 10 „ welriekende Zomerbloemen	„ „ „	- 1.20
„ H.	10 „ „ 10 „ Snijbloemen	„ „ „	- 1.20

Vele dezer soorten zijn in gekleurde zakjes verpakt, waarop de cultuur is aangegeven.

N.B. Van de bloemzaden kan geen kleinere hoeveelheid dan één pakje worden afgeleverd, daar deze te voren worden afgewogen en gereedgemaakt en het dus te tijdroovend zou zijn om in den drukken tijd van de verzending halve pakjes te maken.

Zaden van Zomerbloemen.

H beteekent: hoogte; **†** beteekent: geschikt als snijbloem; ***** beteekent: geschikt voor randen.

† ADONIS.

De Adonis-soorten laten zich zeer gemakkelijk kweken; men zaait ze op de perken in de laatste helft van April.

1001. aestivalis , Zomer-Kooltje vuur, vuurrood, Bloeitijd Juni-Sept. . .	50	0.25	0.10
1002. Aleppica	50		0.70

Prachtige, 40 à 50 cm. hooggroeiende plant, welk zeer sterk vertakt is en bijzonder rijk bloeit met glanzig donkerbloedroode bloemen. De bloei duurt minstens twee maanden, terwijl ze zoowel voor groepen als voor potcultuur geschikt is. Men zaait vroeg in het voorjaar op den vollen grond of in een kouden bak, daar het zaad 4 tot 6 weken noodig heeft om te ontkiemen.

1003. autumnalis , Herfst-Kooltje vuur, donker bloedrood. Bloeit Juli-Oct.	50	0.25	0.10
---	----	------	------

AGERATUM MEXICANUM.

Men zaait de Ageratums begin Februari in den warmen bak en zorgt voor eenige malen verspenen en langzamerhand afharderen, tot dat men ze einde Mei of begin Juni op de perken uitgeplant. Ze laten zich ook goed gebruiken voor potcultuur. Bloeit Juni-Sept.

1005. „ Blausternchen ”	20		0.30
Prachtige gedrongen groeiende variëteit; de bloemen zijn blauwachtig wit, dat later in lichtblauw overgaat. Zeer geschikt voor mozaïekvakken.			
1007. Imperial dwarf blue , donkerbl.	20	0.30	0.10
1009. „ „ white , wit . .	20	0.30	0.10
1011. Little Dorrit , laag met kleine donkerblauwe bloemen	20	0.40	0.15

AGROSTEMMA.


Hemelroosje met helder gekleurde bloemen. Kan einde April in den vollen grond worden uitgezaaid. Bloeit Juli-Sept.

1017. coeli-rosa fimbriata nana , prachtig purperrood	30	0.30	0.10
--	----	------	------

† ALONSOA.

De Alonsoa's worden in Maart-April in den bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei uitgeplant. Zoodra de planten 15 cm. hoog zijn, rijpt men de uiteinden der stengels in om het bloeien te bevorderen. Bloeit Juli-Sept.

1021. Warscewiczii , schitterend rood	60	0.25	0.10
--	----	------	------



Alyssum Benthalmi compactum lilactnum.

***ALYSSUM.**

Voor randen om bloemperken is dit plantje zeer geschikt. Men zaait het in April in den vollen grond, zorgende, dat het zoodanig wordt uitgedund, dat de plantjes 20 à 25 cM. van elkaar komen te staan. Wanneer men na het bloeien de takjes inkort, herhaalt zich later de bloei. Bloeit Juni-Sept.

1027. Benthami , wit	20	0.30	0.10
1030. " compactum , wit, welriekend		0.30	0.10
1031. Benthami compactum lila- cinum	20		0.25

Deze nieuwe variëteit met rechtopstaande bloemen onderscheidt zich door hare zuiver lilakleurige bloemen van de tot dusver bekende witte soorten. In vollen bloei gelijkt deze plant een miniatuurvorm der lila Iberis.

AMARANTHUS.

De Amaranthussoorten worden in April in den bak gezaaid, onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Ze vereischen evenals alle bladplanten een rijk gemesten grond. Bloeit Juli-Sept.

1033. caudatus , <i>Kattestaart</i> , m. lange donkerroode bloemtrossen	90	0.15	0.05
1035. caudatus viridis (albiflorus), groen		0.30	0.10
1037. atro-purpureus , donker purper		0.30	0.10
1039. cruentus , bloedrood		0.30	0.10
1043. superbus , langwerpige ronde bladeren, bloedrood met helder- gelen rand	60		0.10

***ANAGALLIS.**

Men zaait einde April in den vollen grond. Door hare heldere bloempjes, die blauw en rood gekleurd zijn, en hare lage groeiwijze, is de Anagallis zeer geschikt voor randen en perken. Bloeit Juli-Sept.

1047. grandiflora , in kleuren gemengd	15		0.25
---	----	--	------

† ANCHUSA.

De hemelsblauwe bloemen hebben een zuiver wit hart. Wanneer men voorjaars in den bak uitzaait, begint ze in Juli te bloeien. Men kan echter ook in Augustus uitzaaien, de planten onder glas doen overwinteren en in 't voorjaar uitplanten. Ze beginnen dan reeds in April te bloeien.

1051. Capensis , Kaapsche Vergeet- mij-niet	75	0.40	0.15
---	----	------	------

† ANTIRRHINUM.

De bekende Leeuwenbekjes zaait men in Maart-April en na eenige malen verspeend te hebben, kan men ze in Mei uitplanten. Men kan ze ook in het najaar zaaien, zoodat men dan den volgende zomer sterkere planten heeft. Ze vereischen veel warmte en een goeden bodem. Bloeit Juli-Oct.

1055. majus , hooggroeiende, in ge- mengde kleuren	45	0.30	0.10
1059. majus nanum Tom Thumb , dwergachtige Leeuwenbek in schoone kleuren gemengd	15	1.—	0.20
1060. majus nanum Queen of the North , zuiver wit		0.80	0.20
1061. majus nanum Defiance , helder- scharlakenrood			0.30
1062. majus nanum Delicaatrosa , zacht rose			0.25

1063. majus nanum Golden Queen , grootbl. goudgeel			0.25
1064. majus nanum Zwarte Prins , zeer donker			0.25
1065. majus nanum Oranje Prins , zalmrose en oranje			0.25
1066. majus nanum Albino-mengsel Een nieuwe variëteit van de bekende Leeu- wenbekjes, welke in tegenstelling met de- gewone soorten, hoofdzakelijk in lichtere kleuren bloeit. Daarbij zijn de bloemslippen dezer nieuwe soort eigenaardig gevlekt en gestippeld. Sierlijke snijbloem.	0.75		0.15

† ARCTOTIS.

Deze prachtige, uit Zuid-West-Afrika ingevoerde plant, wordt zeer gemakkelijk gekweekt en groeit ongeveer 70 cM. hoog. Zij bloeit den ganschen zomer tot laat in den herfst met groote bloemen, die een doorsnede hebben van 7—8 cM. De straalbloemen zijn zuiver wit met een smalle, gele ring van onderen, terwijl de helderblauwe met witte meeldraden bezette schijfbloemen daarbij prachtig afsteken. De min of meer vederachtige bladeren zijn witachtig behaard.

*Arctotis grandis.*

1067. grandis	70	0.40	0.15
--------------------------------	----	------	------

ARTEMISIA.

1073. saccorum viridis	150		0.25
---	-----	--	------

Deze uit China ingevoerde Nieuwigheid heeft geheel het aanzien van een Zomerden. Ze groeit zeer snel, zoodat de schoone pyramidaal gevormde planten eene hoogte bereiken van 1—1½ Meter.

Als alleenstaande gazonplant of in groepjes verenigd, verdient zij alle aanbeveling, terwijl zij ook voor de potcultuur uitstekend geschikt is. Zij verdraagt zoowel aanhoudende droogte en hitte als nattigheid, terwijl eenige graden vorst in den herfst haar niet schaden.

De kleur van het fijn getakte loof is van het donkerste groen en de afgesneden takken blijven zeer lang frisch, zoodat deze tevens een uitstekend materiaal zijn voor de binderij.

ASPERULA.

Lief plantje, dat in Mei kan worden uitgezaaid en dat bijna den geheelen zomer met ontelbaar vele hemelsblauwe bloempjes bloeit.

1075. *azurea setosa* 30 0.15 0.05

† ASTER.

1078. *sinensis*, scharlakenrood, prachtig 0.40 0.15

1079. „ gemengd 0.30 0.10

De hierbij aangeboden enkelbloemige Chineesche Asters hebben geheel nieuwe kleuren en zullen dan ook evenals de oorspronkelijke Chineesche soort, welke alleen maar lila gekleurd is, zeer in den smaak vallen.

De prachtige paarse, violette, rose en op appelbloesem gelijkende kleuren der groote bloemen steken tegen het zuivere geel der harten sterk af.

Door hunne stevige stelen en langen duur der bloei, zijn ze als snijbloemen uiterst geschikt.

1080. *Eleganz*, wit 0.30

1081. „ donkerblauw 0.30

1082. „ helder rose 0.30

1083. „ gemengd 0.20

Eene werkelijk schoone enkelbloemige Aster; de bloemen zijn op stevige stengels gezeten en dus voor de binderij bijzonder geschikt, temeer daar zij zich afgesneden zeer lang goed houden.

† ASTER SINENSIS FL. PL. (DUBBELBLOEMIGE.)

De Asters zijn buitengewoon dankbare bloemen, die in elken grond kunnen worden gekweekt, mits niet te schraal. Ze worden in Maart onder glas uitgezaaid en zoodra ze twee blaadjes hebben, verspeend. Na eenige weken plant men ze in potten, waarin men ze laat staan totdat ze op de perken gezet worden. Men kan ze ook half Mei buiten uitzaaien en later uitdunnen. De hooggroeiende soorten moeten natuurlijk iets wijder geplant worden dan de lagere.

De Asters kunnen zeer gemakkelijk, zelfs wanneer ze in vollen bloei zijn, verplant worden, waardoor men ze uitnemend kan gebruiken voor het beplanten van perken, waar op vroegbloeiende planten gestaan hebben.

BLOEITIJD JULI OCTOBER.

† HOOGHE ASTERS.

1093. *Paeonia-perfection*, in kleuren gemengd 60 0.25

De bloemen dezer verscheidenheid hebben veel overeenkomst met pioenrozen en zijn zeer schoon en regelmatig gevormd.

1099. *Witte Dame* 60 0.30

1101. *Reid's verbeterde Kogel*, gemengd 60 1.— 0.25

1112. *Struisveder*, *karmozijn* 60 0.30

1113. „ *donkerblauw* 60 0.30

1114. „ *donkerpurper* 60 0.30

1115. „ *lichtgeel* 60 0.30

1116. „ *malmaison rose* 60 0.30

1117. „ *wit met violet*, *rose spitsen* 60 0.30

1118. „ *zalmkleurig rose vroegbloeiend* 60 0.30

De bloemen hebben een doorsnede van 10 à 12 cm. en ze bloeit met de allervroegste soorten.

1121. *Struisveder*, *hemelsblauw* 60 0.30

1123. „ *helder rose* 60 0.30

1124. „ *terra-cotta-kleurig* 60 0.30

Daar de terra-cottakleur veel in den smaak valt, is deze soort als snijbloem zeer aan te bevelen.

1125. *Struisveder*, *wit* 60 0.30

1127. „ *gemengd* 60 1.40 0.25

De struisveder-Asters zijn voor alle bloemenliefhebbers een groote aanwinst. De groeiwijze is kandelaervormig en de bloemen maken met hun lange bloembladen een ongeëvenaard sierlijk effect. Voor bouquets zijn ze onontbeerlijk.

1129. *Amerikaansche Struik*, gem., is de laatste van alle Aster-soorten in het bloeien. 60 0.90 0.20

1134. *hooge*, in soorten gemengd 60 1.— 0.25

† MIDDELHOOGHE ASTERS.

1135. *Hohenzollern*, *wit* 45 0.30

Prachtige extra grootbloemige, zuiverwitte variëteit.

1136. *Hohenzollern*, *reuzenbloem*, gemengd 45 0.25

1140. *Victoria* middelhooge, in kleuren gemengd 45 1.30 0.30

Deze klasse heeft groote en sterk gevulde bloemen, die eenigszins plat gevormd zijn.

1144. *Komeet*, in kleuren gemengd 45 1.30 0.30

Deze hebben smalle bloembladen en maken daardoor een zeer los effect.

1146. *Reuzenkomeet*, *brillant-robijnrood* 45 0.30

1153. *Reuzenkomeet*, *verbeterde Sneeuw witte* 45 0.30

1154. *Reuzenkomeet*, *zwavelgeel* 45 0.30

1155. „ in prachtsoorten gemengd 45 1.30 0.25

Zeer rijkbloeiende verbetering van de bekende Komeet-Aster met zeer groote, dicht gevulde, prachtig gevormde bloemen.

1156. *Reine des Halles*, in gemengde kleuren 45 0.85 0.20

Is de vroegstbloeiende van alle Asters.

1160. *middelhooge*, in soorten gem. 45 0.85 0.20


† DWERG-ASTERS.

1162. *Chrysanthemum-dwerg*, in kleuren gemengd 30 1.50 0.30

De Chrysanthemum-Asters kunnen onder de schoonste Asters worden gerekend; zij bloeien zeer rijk met groote bloemen en kunnen zoowel voor potkultuur als voor bloemperken worden aanbevolen.



Dwerg Chrysanthemum Aster.



Triumph-Dwerg Aster.

	Hoog cm.	Per lood	Per pakje.
1172. Dwerg-Bouquet (Boltze), gem.	30		0.25
1178. Victoria-dwerg, in kleuren gem. Deze bloeien evenals de middelhooge Victoria-Asters, doch groeien niet hooger dan 30 cm.	30		0.30
1183. Triumph-Dwerg, gemengd . . De Triumph-Asters zijn de laagstgroeiende van alle; de bloemen zijn kolossaal groot en maken met hare smalle bladeren een schoon effect.	30		0.35
1188. dwerg, in kleuren gemengd .	30	1.50	0.30

BALSAMINEN, zie Impatiens.

BARTONIA.

Dit schoone plantje groeit het best op een droge zonnige standplaats, tegen den wind beschut. Daar het zich niet gemakkelijk laat verplanten, moet men het in Mei buiten uitzaaïen. Bloeitijd Juli-Oct

1210. aurea, helder geel	90		0.25
------------------------------------	----	--	------

† BIDENS.

Met fluweelachtige zwartroode bloemen. Men zaait ze in Maart in den warmen bak of in Mei op den kouden grond. In 't laatste geval verschijnen de bloemen natuurlijk veel later. Bloeitijd Juli-Oct.

1214. atro-sanguinea (Dahlia Zimapani)	60		0.25
---	----	--	------

BRACHYCOME.

De Brachycome's zijn zeer schoone planten met levendig gekleurde bloemen. Men kan ze op den kouden grond zaaien in April-Mei. Wil men ze laat in bloei hebben, zoo kan men nog half Juni zaaien. Bloeitijd Juni-Sept.

1218. ibiridifolia, blauw	15	0.80	0.15
1220. „ alba, wit	15	0.75	0.15
1222. „ rosea, rose	15	0.75	0.15

BROWALLIA.

Wanneer men deze schoone zomerbloem in Mei zaait, bloeit zij vanaf Juli, totdat het begint te vriezen.

1226. Czerwiakowski, blauw	15		0.25
--------------------------------------	----	--	------

† CACALIA.

Men zaait deze omstreeks half April buiten. De bloemen zijn zeer geschikt voor bouquetten. Bloeit Juni-Sept.

1232. songhifolia, bloedrood	45		0.20
--	----	--	------

CALANDRINIA.

De Calandrinia's moeten in April-Mei op de perken worden uitgezaaid, want de plantjes laten zich niet verspenen. Bloeit Juli-Oct.

1236. umbellata, laaggroeiend	30		0.15
---	----	--	------

De bloemen dezer soort zijn donker purper-violet. Als dit plantje in vollen bloei is, ziet men slechts één schitterende kleur.

† CALENDULA.

De Goudsbloemen zijn zoo algemeen bekend, dat hieraan weinig is toe te voegen; ze worden in April gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept.

1240. officinalis fl. pl. Meteor	30	0.20	0.10
--	----	------	------

Ora je-geel gestreepte variëteit.

1242. officinalis grandifl. fl. pl.	30	0.20	0.10
---	----	------	------

Gewone algemeen bekende Goudsbloem met donker oranje-kleurige bloemen.

1244. officinalis Prins van Oranje	30	0.20	0.10
--	----	------	------

Donker oranje, geel gestreept.

1246. officinalis sulph. fl. pl.	30	0.20	0.10
--	----	------	------

Deze heeft groote, zuiver gele, dicht gevulde bloemen.

† CALLIOPSIS.

De Calliopsis zaaie men in April. Wil men ze vroeg in bloei hebben, zoo moet men in Maart onder glas zaaien. Het zijn zeer dankbaar bloeiende planten. Bloeitijd Juni-Sept.

1250. bicolor, geel met bruin	90	0.25	0.10
---	----	------	------

1252. „ hybrida fl. pl., in kleuren gemengd	45	0.30	0.10
--	----	------	------

Met dubbele prachtige bloemen.

1254. bicolor nana	30	0.50	0.15
------------------------------	----	------	------

1255. Drummondi, met lange bloem- stelen	45	0.20	0.10
---	----	------	------

1256. radiata „Goudstraal”	20		0.20
--------------------------------------	----	--	------

Zeer rijk en langbloeiende zomerbloem, waarvan de bloembladen in vorm gelijken op die der algemeen gezochte Cactus-dahlia's, terwijl zij goudgeel gekleurd zijn met donker purperbruinen voet. Uit het donkere hart der bloem staan de goudgele stralen in alle richtingen. De planten worden ongeveer 15-20 cm. hoog.

Zeer schoone en gemakkelijk te kweken zomerbloem.

1258. radiata „Tijgerbloempje”	20		0.20
--	----	--	------

Een rijk en langbloeiende zomerbloem, waarvan de bloembladeren een eigenaardig gedraaiden vorm bezitten, die eenigszins aan enkele Cactus-Dahlia's doet denken. De kleur is roodbruin, overgaande in schitterend goudgeel naar de punten, welke tevens fraai gevlekt zijn. Zij groeit circa 20 cm. hoog, terwijl de gevulde planten den geheelen zomer door met bloemen bedekt zijn. De kultuur is zeer eenvoudig en mede door haren vroegen en rijken bloei verdient zij alle aanbeveling.

CAMPANULA.

Deze lieve klókjes worden in April-Mei gezaaid en vereischen weinig bijzondere zorg. Bloeitijd Juni-Juli.

1264. Loreyl fl. albo, wit	20		0.25
--------------------------------------	----	--	------

1268. „ „ coeruleo, blauw	20		0.25
-------------------------------------	----	--	------

1270. macrostyla, met groote beker- vormige bloemen	60		0.25
--	----	--	------

De kleur der bloemen is violet gestreept op witten grond.

1272. speculum, in kleuren gemengd	30	0.25	0.10
------------------------------------	----	------	------

CANNABIS.

Deze schoone bladplant groeit ongeveer 2.50 M. hoog en is zeer geschikt voor ruime groote perken. Ze wordt in den vollen grond uitgezaaid, ongeveer in het einde van April.

1278 *gigantea*, *Chineesche Reuzen-hennep*

Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
250		0.10

CARDUUS.

De stekelige bladeren hebben een fraai wit gemarmerde oppervlakte. Wordt in April in den vollen grond uitgezaaid.

1282. *Marianus*, *Mariadistel*

0.15	0.05
------	------

† CENTAUREA.

Deze schoone algemeen bekende Korenbloemen kunnen in Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en later worden uitgedund. Men kan ze ook eerder (de laatste helft van Maart) in den bak uitzaaien en ze in potjes verspenen en later uitplanten op een afstand van 25 à 30 cM. Bloeitijd Juli-October.

1288. *Cyanus*, *Korenbloem*, in gem. kleuren

45	0.30	0.10
----	------	------

1290. *Cyanus fl. pl.*, met dubbele bloemen in gemengde kleuren

45	0.35	0.10
----	------	------

1292. *Cyanus Kaiser Wilhelm*, donkerblauw

45	0.30	0.10
----	------	------

1296. *imperialis*, gem. kleuren

100		0.25
-----	--	------

Met langstelige schoon gevormde groote bloemen, welker kleur varieert tusschen wit, lila, rose en purperrood.



Centaurea moschata rosea.

1297. *moschata rosea*

45		0.25
----	--	------

De bloemen dezer betrekkelijk nieuwe variëteit zijn eerst roodachtig wit met helderroze meeldraden; na enkele dagen gaat de kleur in een prachtig zachtrose over. De hoogte der planten en grootte der bloemen is gelijk aan die der bekende wit- en blauwbloeiende variëteiten. De eigenschap dat de bloemen lang frisch blijven in vereeniging met de mooie zachte kleur, maakt deze soort bijzonder geschikt voor bouquets.

1300. *odorata Chamaeleon*

45		0.35
----	--	------

Nieuwe grootbloemige variëteit; de kleur is zwavelgeel, iets rose getint.

1302. *odorata Margaritae*, grootbloemige, zuiver witte verscheidenheid

45		0.35
----	--	------

1304. *suaveolens*, gele welriekende korenbloem

60		0.25
----	--	------

1306. **nana compacta Victoria*

15	0.25	0.10
----	------	------

Deze laaggroeiende blauwe variëteit is zeer schoon en bijzonder geschikt voor randen.

CENTRANTHUS.

Dit schoone 20 à 25 cM. hoog groeiende plantje vormt door de vele vertakkingen een dichte bloemenmassa. De bloempjes zijn wit of rood en zeer schoon. Men kan ze Maart-Mei buiten uitzaaien. Bloeitijd Juli-Aug.

1310. *macrosiphon nanus*, gemengd

Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
25	0.30	0.10

**† CHEIRANTHUS
ANNUUS FL. PL.
VIOLIEREN.**

Voor zomerviolieren moet de grond liefst vóór den winter worden bewerkt. Men meste vooral niet met versche mest, maar met geheel verteerde stalmest of afval. De zomerviolieren worden in Maart in den warmen bak gezaaid, eenige malen verspeend en langzamerhand afgehard. In Mei op de perken geplant, beginnen zereeds half Juni te bloeien.

In April zaait men de herfst-violieren, die op dezelfde wijze worden behandeld en einde Augustus beginnen te bloeien. De winter-violieren worden half Juni gezaaid en vóór November in den kouden bak gebracht. Ze beginnen dan in November te bloeien en men heeft slechts te zorgen ze vorstvrij te houden. Gewoonlijk bevinden zich 20 à 25 % enkele bloemen tusschen de Violieren.

Zomer-Violieren.

1320. *grootbl. Engelsche*, gem.

40	2.—	0.25
----	-----	------

1322. " " in afzonderlijke kleuren:

Kanariegeel 40 0.30

Karmijn 40 0.30

Helderrood 40 0.30

Donkerblauw 40 0.30

Vleeschkleurig 40 0.30

Wit 40 0.30

1330. *doorbl. Dresdener*, gemengd

40		0.45
----	--	------

1331. " " wit

40		0.50
----	--	------

1334. *grootbl. Pyramide*, gemengd

40		0.45
----	--	------

1335. " " wit

40		0.50
----	--	------

1338. " " *Prinsess*

May, lichtgeel

40		0.50
----	--	------

1340. *dwerg-Pyramide*, gemengd

40		0.50
----	--	------

1342. " *donkerbloed-*

rood

40		0.50
----	--	------

1346. *Victoria-Bouquet*, gemengd

40		0.45
----	--	------

1347. " *wit*

40		0.50
----	--	------

Prachtige klasse, die regelmatig gevormde bloemenpyramiden voortbrengt. Zeer geschikt voor potcultuur

Herfst-Violieren.

1350. *grootbl.*, gemengde kleuren

40		0.50
----	--	------

1354. *Schotsche*, gemengd

40		0.60
----	--	------

Winter-Violieren.

1358. *grootbl.*, gemengde kleuren

40		0.50
----	--	------


1364. *Witte van Nizza*, vroegbloeiend

40		0.40
----	--	------

1365. *Witte Dame*

50		0.65
----	--	------

Eene zeer schoone winterviolier, met groote, gevulde bloemen, terwijl de kleur van het zuiverste wit is. De planten groeien circa 50 cM. hoog en zijn sierlijk vertakt, zoodat elke plant een groot pyramidaal bouquet gelijkt. Ze brengt pl.m. 60—65 % gevulde bloemen voort en kan in alle opzichten de schoonste witte winterviolier worden genoemd.



Winterviolier „Witte Dame.“

1366. dwerg-Bouquet, gemengd . . . 40 . . . 0.60

† CHEIRANTHUS CHEIRI, MUURBLOEMEN.

De muurbloemen worden gewoonlijk in Mei of Juni op den kouden grond uitgezaaid, in Juni op een nieuw bed verspeend, waar men ze laat staan tot in den herfst. Men kan ze dan in potten zetten om ze zeer vroeg in bloei te hebben, of ook buiten op de perken uitplanten 40 à 50 cM. van elkaar. Deze welriekende bloemen groeien in elken grond, mits niet al te vochtig en 't liefst aan den voet van een muur, aan welke omstandigheid zij haar naam te danken hebben. De afgesneden bloemen blijven lang goed en de knoppen ontluiken zelfs geheel, indien men slechts het water nu en dan ververscht.

Bloeitijd April—Juni.

1370. *Allioni* 0.20
Eene nieuwe soort muurbloem, met oranje-gele bloemen.

1372. enkele vroegbloeiende *Parijsche*, gemengd 45 . . . 0.35 . . . 0.10

Deze bloeien reeds het eerste jaar, wanneer men ze in April buiten uitzaait.

1374. *hooge dubbele*, gem. kleuren 60 . . . 0.40

1378. *lage dubbele dwerg*, gemengde kleuren 30 . . . 0.50

CHEIRANTHUS MARITIMUS, ZEEVIOLIEREN.

Dit plantje groeit in bijna elken grond en onderscheidt zich door snellen groei en groote rijkbloeiendheid, zelfs in dichtaan zee gelegen tuinen, waar anders niet vele bloemen gelukken. Men zaait ze vrij dicht in April-Mei en dunt ze, zoodat de planten pl.m. 10 cM. tusschenruimte hebben. Bloeitijd Juli—Aug.

1384. *rood* 15 . . . 0.15 . . . 0.05

1386. *Crimson King*, karmozijn . . . 15 . . . 0.30 . . . 0.10

†CHRYSANTHEMUM.

Ofschoon de eenjarige *Chrysanthemums* niet zoo algemeen gewaardeerd worden als de bekende tot dit geslacht behorende overblijvende kamerplanten, verdienen ze toch een plaatsje in onzen bloementuin, daar ze zeer dankbaar bloeien en gemakkelijk te kweken zijn. Men zaait ze April-Mei; de planten zijn dan einde Mei of begin Juni gereed om met een kluitje op de perken te worden gezet. Men kan ze ook in potten kweken en om ze vroeg in bloei te hebben, kan men in September zaaien, waarna men ze op tijd verspeent en in het voorjaar uitplant. De carinatumvariëteiten moeten dan onder glas worden overwinterd. Bloeitijd Juni—October.

1390. *carinatum Chamæleon* 60 . . . 0.50 . . . 0.15
Bekende schoone verscheidenheid. Zeer aan te bevelen.

1392. *carinatum Dunnetti album plenum* 60 . . . 0.60 . . . 0.15
Prachtige dubbelwitte snijbloem.

1396. *carinatum aureum fl. pl.*, geel . . . 60 . . . 0.60 . . . 0.15

1398. „ *Golden Feather*, met goudgele bladeren 60 . . . 0.15

1400. *carinatum „Stern von Thüringen“* 60 . . . 0.70 . . . 0.20

Deze prachtige variëteit bloeit den geheelen zomer tot de vorst komt, met stervormige bloemen, die zuiver wit, geel, purper of karmijnrood gekleurd zijn.

1402. *carinatum fimbriatum fl. pl.* . . . 30 . . . 0.20

1403. „ *gemengd* 0.35 . . . 0.10

1404. „ *hybridum fl. pl.*, dubbele soorten in prachtmengsel . . . 0.50 . . . 0.20

1405. *carinatum „Noordster“* 50 . . . 0.25

(Zie afbeelding blz. 92.)

Eene reuzenbloemige eenjarige Chrysanthemum van bijzondere aanbeveling. De bloemen hebben een doorsnede van circa 9 cM., en zijn dus minstens $\frac{1}{3}$ grooter dan die der bekende carinatum-soorten. De kleur is zuiver wit, naar het midden in lichtgeel overgaand, en schoon afstekend tegen het zwarte bloemhart. De plant groeit ongeveer 50 cM. hoog; onschatbaar voor groote bouquets.

1406. *coronarium fl. pl.*, dubbel gemengd 30 . . . 0.30 . . . 0.15

1408. „ *fl. albo pl.*, dubbele witte 0.40 . . . 0.15

1410. „ *luteo pl.*, dubbele gele 0.40 . . . 0.15

1412. *inodorum plenissimum*, dubbel wit 30 . . . 0.60 . . . 0.15

CLARKIA.

De Clarkia's kunnen in April direct op de perken worden gezaaid, of eerst op een bed en in Mei uitgeplant worden. De planten moeten een tusschenruimte hebben van pl.m. 20 centimeter. Vooral de dubbele verscheidenheden zijn zeer schoon en aan te bevelen. Ook uitnemend geschikt voor kuipen of potten; bloeitijd Juni-Sept.

1416. *elegans fl. pl.*, in gemengde kleuren 45 . . . 0.40 . . . 0.10

1417. *elegans fl. pl. Chamois* 0.60 . . . 0.15

(Zie afbeelding blz. 92.)

De bloemen dezer nieuwe dubbele Clarkia zijn eerst gemengd met wit, dat later in prachtvol Chamois rosa overgaat, eene nog zeldzame kleur onder de eenjarige Clarkia's.

1418. *elegans fl. pl.*, *Purple King*, purperkleurig 45 . . . 0.60 . . . 0.15


1420. *elegans fl. pl. Salmon Queen*, zalmkleurig 45 . . . 0.60 . . . 0.15

1422. *elegans fl. pl. alba*, dubbele witte 45 . . . 0.60 . . . 0.10

1424. *pulchella*, enkele, in gemengde kleuren 45 . . . 0.35 . . . 0.10



Chrysanthemum carinatum „Noordster.” (Zie blz. 91.)



Clarkia elegans fl. pl. Chamois.
(Zie blz. 91.)

COLLINSIA.

De *Collinsia bicolor* en *multicolor* kan men in April op de perken zaaien, ze bloeien dan Juli-Aug. Door hare vroolijke kleuren maken ze een aardig effect. Ook kunnen ze uitmuntend worden gebruikt voor potcultuur om ze voor 't venster of op een balkon te plaatsen.

1430. bicolor candidissima , wit . . .		0.25	0.10
1434. „ tweekleurig , lila en wit . . .		0.25	0.10
1436. multicolor		0.25	0.10

CONVOLVULUS.

In Frankrijk Dag-Schoone (Belle de Jour) genoemd, behoren de *Convolvulus* met hare levendige bloemen tot de dankbaarste zomerbloemen. Men zaait ze op de perken in April. Bloeitijd Juli-Sept.

1446. tricolor , (<i>Driekleurige Winde</i>) blauw, wit en geel . . .	30	0.15	0.05
1447. „ gemengd	30	0.15	0.05
1448. „ albus , wit	30	0.15	0.05
1450. „ roseus , rose	30	0.15	0.05
1452. „ kermesinus violaceus , karmijn violet . . .	30	0.15	0.05

† COSMEA.

Deze plant eigent zich bijzonder voor groepen; door hare lange stengels is zij ook zeer geschikt voor snijbloem. Men zaait ze in Maart-April in niet te warmen bak of in potten en plant ze later uit op een afstand van 50–60 cM. Bloeitijd Juli tot September.

1457. bipinnata hybrida , gemengd . . .	60	0.40	0.15
1458. „ pinnatifida Praecox , vroegbloeiend, gem.	60	0.50	0.20

COSMIDIUM.

Deze plant heeft fijn blad met op lange dunne stengels gezeten bloemen. Zij wordt gezaaid in Maart-April in den

warmen bak, onder glas verspeend en in Mei uitgeplant. Bloeitijd Juni-Sept.



Cosmidium Burridgeanum.

1460. Burridgeanum , donkerbruin met goudgelen rand	75	0.60	0.15
---	----	------	------


CUPHEA.

Men zaait einde April buiten. De bloemen hebben een zachtrose kleur. Bloeitijd Juni-Sept.

1468. platycentra , langwerpige ver- miljoenroode bloemen, prachtige potplant	30		0.40
--	----	--	------

*** CYNOGLOSSUM.**

De bloemen komen veel overeen met die der witte Vergeet-mij-niet, terwijl het blad grijs-groen is. Voor randen om perken met donkere bladen, b.v. Canna's, is deze plant uitnemend geschikt, daar zij dan zeer schoon uitkomt. Zij groeit in bijna elken grond. Men zaait in Maart-April op de perken. Bloeitijd Juni-Sept.

*Cynoglossum linifolium.*

1474. *linifolium*, Witte Onschuld . . . 30 0.25 0.10

† DAHLIA.

Voor groote losse bouquetten, die tegenwoordig zoo zeer in de mode komen, zijn de enkele Dahlia's uitnemend geschikt. Vooral de enkele Cactus Dahlia's met eenigszins gebogen en gedraaide bloembladen zijn zeer elegant.

Men zaait de Dahlia's in den warmen bak in Maart en hardt ze af onder glas, waarna men ze einde Mei buiten uitplant. Men plant ze pl m. 2 voet uit elkaar. Voor randen om heesterperken of voor groote perken maken ze een schoon effect. Bloeitijd Juli-Oct.

1478. *variabilis*, enkelbloemige Dahlia's, in gem. kleuren . . . 90 0.35 0.10
 1480. *variabilis*, Tom Thumb, gem. zeer laag en gedrongen . . . 0.20
 1482. *variabilis striata*, enkelbloemig gestreept . . . 60 0.20
 1484. *variabilis fl. pl.*, dubbel grootbloemig in kleuren . . . 60 0.40
 1486. *variabilis cactus fl. pl.*, gem. 90 0.40
 1488. „ Hornsveld's Reuzenbloemige, gemengd . . . 0.30

DATURA.

Men zaait in April onder glas of in Mei buiten. De plantjes kunnen op ongeveer 35 à 40 cM. worden verspeend, hebben veel zon noodig en een goeden bodem. Bloeitijd Juli-Augustus.

1490. *fastuosa Huberiana fl. pl.*, grootbloemig dubbel in kleuren gemengd . . . 90 0.40 0.15

† DELPHINIUM.

De Riddersporen moeten in Maart-April direct op de perken worden uitgezaaid, want zij kunnen niet tegen verspenen. Men dunt

ze zoodanig uit, dat ze op een voet afstand komen te staan. Het zijn zeer sterke planten, die, in 't najaar uitgezaaid, zonder bedekking overwinteren. Men heeft ze dan 't volgende jaar vroeger in bloei.

1497. *Ajaxis*, lage dubbele ranonkelbloemige gemengd . . . 0.40 0.15
 1498. *Ajaxis*, lage dubbele Hyacinthbloemige Riddersporen, gemengd . 30 0.40 0.15
 1500. *Ajaxis*, hooge dubbele Hyacinthbloemige Riddersporen, gemengd . 90 0.40 0.15

† DIANTHUS.

De eenjarige Anjelieren zijn zeer dankbare rijkbloeiende planten. Om ze echter gedurende een groot gedeelte van den zomer in bloei te hebben, moet men ze op verschillende tijdstippen zaaien. Ze laten zich zeer gemakkelijk met een kluitje verplanten, ook al zijn ze reeds op het punt om te bloeien. Door in April in den bak en in Mei buiten te zaaien en een gedeelte te verplanten en het andere niet, kan men ze lang achtereen in bloei hebben.

1508. *Chinensis fl. pl.*, Dubbele Anjelieren of Chineesche Anjers in prachtsoorten gemengd . . . 0.60 0.15
 1510. *Imperialis fl. pl.*, Keizeranjers 0.90 0.25
 1511. *Heddewigi giganteus*, grootbloemig, in prachtige kleuren gem. 0.80 0.20
 1512. *Heddewigi fl. pl.*, Diadeem Anjers, in prachtsoorten gemengd 1.— 0.25
 1514. *Heddewigi albus*, Koningin van Holland, zuiver wit . . . 1.— 0.25
 1515. *Heddewigi Nobilis*, „Koningsanjelier” . . . 1.20 0.30

De bloemen dezer soort zijn enkel, met schitterende kleuren in purperroode en heldere schakeeringen, eigenaardig gedraaid en gefranjed en dikwijls tot 10 cM. in doorsnee. De planten groeien hoog en leveren een bij uitstek geschikt bindmateriaal. De bloemen blijven afgesneden onberispelijk schoon gedurende acht dagen. Met recht de schoonste van alle enkele Anjelieren.

1517. *Heddewigi*, „De Bruid” . . . 1.— 0.25
 De witte bloemen hebben een purperrood midden; laag, zeer schoon.

1518. *laciniatus punctatus*, „Prinzess-Nelken,” in lichte kleuren . . . 0.30

Eene enkelbloemige variëteit der *Dianthus laciniatus*-klasse, met lichte bloemen, welke den bloemenliefhebber eene rijke afwisseling leveren, daar ze als met puntjes en streepjes overdekt zijn.

1518. *laciniatus punctatus*, „Prinzess-Nelken,” (donker) . . . 0.30

In tegenstelling met de voorgaande, zijn de bloemen dezer variëteit bijna alle donker van kleur, n.l. purperviolet, bloedrood, etc. daarbij sterk gevlekt en gestippeld en licht tot zelfs wit gerand; zeer aanbevelenswaardig.

1520. *laciniatus fl. pl.*, in de prachtigste kleuren gemengd . . . 0.30

*Dimorphotheca aurantiaca.*

†DIMORPHOTHECA

De Dimorphotheca's zijn zeer rijk- en lang-bloeiende zomerbloemen. In den kouden bak gezaaid en daarna op een zonnige plaats uitgeplant, ontwikkelen de planten zich zeer snel en zullen na weinige weken volop bloeien.

Voor groepen, zoowel als alleenstaande plant verdienen zij alle aanbeveling.

1522. **aurantiaca**

Zeldzaam schoone nieuwigheid, afkomstig uit Zuid-Afrika, welke sterk vertakte bossige planten vormt, die ongeveer 30 cM. hoog en 40 à 50 cM. breed zijn. De op Chrysanthemums gelijkende bloemen, die geheel geopend eene doorsnede hebben van 7 à 8 cM., komen flink uit boven het heldergroene loof. De kleur der bloemen is donkeroranje met atlasglans, fraai afstekende bij het donkerbruine, zwartgezoomde hart.

1523. **aurantiaca hybrida**

Nieuwste hybriden in verschillende prachtige kleuren.

1524. **aurantiaca hybride fl. pl.**

Halfdubbele- en dubbelbloeiende variëteiten der voor enkele jaren ingevoerde, zeer gunstig bekende hybriden der Dimorphotheca aurantiaca. Ongeveer 50—60% der zaailingen bloeien dubbel en halfdubbel, terwijl de kleuren varieren van wit tot helder- en donkergeel, van zalmkleurig tot oranje.

ERODIUM.

Aardig plantje, dat meestal dient voor versiering van rotsen en het best op steenachtige plaatsen groeit. Men zaait in April of Mei en verspeent de plantjes op 40 à 50 cM. afstand. Bloeit in Juni-Juli met schoone violetkleurige bloemen.

1526. **gruinum**

*Eschscholtzia.*

† ESCHSCHOLTZIA.

Zeer gemakkelijk te kweken en weinig eischende Zomerbloem, die liever niet moet worden verplant, maar direct op de perken uitgezaaid in April. Ze moeten voldoende worden uitgedund en komen een volgend jaar gemakkelijk weer op.

1527. **aurantiaca**, donker oranje geel

1528. **californica**, heldergeel

1529. „ **alba**, wit

1530. „ **Karmijnkoning**,
nieuw

1532. **Douglasii**

Uit Californië ingevoerde vroegbloeiende variëteit. De bloemen hebben eene zuiver goudgele kleur met een weinig donkerder hart; het loof is grijsgroen en zeer fijn.

1534. **hybrida Mandarin**, van binnen oranje, van buiten rood

1536. **maritima**, heldergeel met donker-oranje vlekken

1538. **gemengd**

† GAILLARDIA.

De bloemen dezer plant komen voor in alle levendige nuances van geel en bruin. Zij zijn uitnemend geschikt voor bouquets. Ze kunnen einde April buiten worden uitgezaaid, doch in den bak gezaaid, beginnen ze reeds in Juni te bloeien.

1550. **Amblyodon**, met schoone donkerroode bloemen

1556. **picta Lorenziana fl. pl.**, in gem. kleuren

1558. **picta**, gemengd

† GAURA.

De lange bloemtrossen zijn met zuiver witte bloemen bezet; zeer geschikt voor groote perken en als snijbloem.

1560. **Lindheimeri**

† GODETIA.

De Godetia's laten zich zeer gemakkelijk kweken. Men zaait ze begin April op een bed en zodra de plantjes sterk genoeg zijn, worden ze uitgeplant op de perken met een tusschenruimte van 40 M. Nog beter is het om ze in 't laatst van September te zaaien; men verplant ze zodra mogelijk op een warm plekje in den tuin waar ze overwinterd worden. In 't voorjaar worden ze dan met kluitjes op de perken gezet. Bloeitijd Juni-September.

*Godetia Duchess of Albany.*

Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
	0.30	0.10
	0.30	0.10
	0.30	0.10
	0.60	0.15
		0.20
	0.40	0.15
	0.30	0.10
	0.30	0.10

Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
-------------	--------------	---------------

30 0.20

0.20

0.60

15 0.15 0.05

60	0.15
45	0.45
	0.10
	0.15

0.25 0.10

† **GODETIA** (vervolg).

	Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
1564. Bijou	15	0.60	0.20
Een der laagst groeiende Godetia's. Deze is zeer rijkbloeiend en de bloemen zijn wit met scharlakenroode vlekken.			
1566. Duchess of Albany	30	0.50	0.15
Algemeen bekende grootbloemige witte verscheidenheid.			
1568. Perle Blanche	20	0.50	0.15
Laaggroeiende vorm van de voorgaande, eveneens met witte bloemen.			
1570. Lady Albemarle	30	0.50	0.15
Deze is zeer rijkbloeiend. Als de plant in vollen bloei is, ziet men niets dan groote helderroode bloemen.			
1572. Prins Hendrik , zacht rosa met groote helderroode vlekken		0.50	0.15
1574. Mandarin , zacht geel	30	0.50	0.15
1575. rosea grandiflora fl. pl. , dubbel grootbloemig rose	30	0.75	0.20
1576. The Bride , zuiver wit, met hoog rood afgezet	45	0.50	0.15
1578. <i>gemengd in schoone lage soorten</i>		0.60	0.15
1579. " " " <i>hooge</i> "		0.50	0.15

† **GYPSOPHILA**.

Dit is een der schoonste, fijnste bloemen voor bouquets. De fijne lichtroze bloempjes zijn op draadvormige stengels gezeten. Ze kunnen ook evenals Immortellen worden gedroogd. Men kan ze in April op den kouden grond uitzaaien. Bloeitijd Juni-Aug.

1580. elegans , <i>Gipskruid</i>	45	0.15	0.05
---	----	------	------

† **HELIANTHUS**.

De Zonnebloemen vereischen uiterst weinig zorg. Men zaait in April-Mei en men kan ze al dan niet verplanten. Ze moeten echter flink ruimte hebben en voor den wind van een stok worden voorzien. In Hongarije worden de Zonnebloemen op groote schaal gekweekt voor oliebereiding en voor kippenvoer. Bloeitijd Juni-Oct.

1584. annuus fl. pl. , gewone dubbele Zonnebloem	120	0.25	0.10
1586. annuus Primrose Coloured , heldergeel	120	0.30	0.15
1588. cucumerifolius	120	0.50	0.15
Een der schoonste van alle zonnebloemen voor bouquets; zij bloeit met talloze goudgele bloemen tot laat in den herfst.			
1589. cucumerifolius Diadeem		0.65	0.20
Licht citroengeel met zwart midden; grootbloemig.			

*Helianthus cucumerifolius „Orion.”*

1590. cucumerifolius „Orion”	120	0.70	0.20
Deze éénjarige Zonnebloem is gewonnen uit de bekende variëteit „Stella” en heeft bloemen, die door hare gedraaide bloembladeren eenigszins aan Cactus-Dahlia's doen denken. Voor bouquetwerk is deze soort uitnemend geschikt.			
1592. cucumerifolius Stella	90	0.80	0.20
Bekende grootbloemige verscheidenheid.			
1594. macrophyllus giganteus, Reuzen-Zonnebloem	240	0.25	0.15
1596. nanus fol. var.	90	0.35	0.20
Lage, bontbladerige variëteit.			

IBERIS.


Deze planten kunnen in April op een bed worden gezaaid om later op de perken te worden uitgeplant met 30 cM. tusschenruimte. Men krijgt echter mooier en rijkbloeiender planten, wanneer men half September zaait en in den kouden bak overwintert, om ze in April op de perken uit te planten. Bloeitijd Juli-Sept.

1600. amara , wit	30	0.15	0.05
1602. coronaria Empress , zuiver wit	30	0.35	0.10
1604. " Tom Thumb	30	0.25	0.10
Eene zeer lage, grootbloemige variëteit met zuiverwitte bloemen.			
1606. umbellata , in gemengde kleuren	30	0.25	0.10
1608. " carminea , karmijnrood	30	0.45	0.15
1610. " Rose Cardinal	30		0.30
Zeer schoon, helder rose karmijn.			

IMPATIENS BALSAMINA,
(Balsaminen.)

De Balsaminen, die genoeg in onze tuinen bekend zijn, worden gewoonlijk in Mei op de perken gezaaid en zoodanig uitgedund, dat ze pl. m. 30 cM. tusschenruimte hebben. Ze laten zich ook gemakkelijk verplanten. Bloeitijd Juli-Sept.

1614. Dwerg , dubbele, in vele kleuren gemengd	20	1.50	0.40
1616. Rozen , dubbele, in vele kleuren gemengd	45		0.35
1618. camellia , dubbele, in vele kleuren gemengd	45		0.30
1620. enkele en halfdubbele , in vele kleuren gemengd	45	1.—	0.25

*Kochia trichophylla. (Zie blz. 96.)*

KOCHIA.

Zeer snelgroeijende bladplant, welke in volkomen wasdom veel op een Cypres gelijkt, waarom men deze plant ook wel zomercypres noemt. Zij heeft fijn loof van eene frisch-groene kleur en is bovendien in den nazomer overdekt met talloze bloedroode bloempjes, terwijl dan de geheele plant een bloedroode tint aanneemt. Ook is zij zeer geschikt voor potcultuur en leent zich daardoor uitstekend voor versieren van vestibules, balcon, of waranda's. Zij wordt in Maart onder glas gezaaid en verlangt veel zon en een ruime standplaats.

1622. *trichophylla*

LATHYRUS ODORATUS CUPIDO.

Deze laaggroeijende soort Lathyrus is voor eenige jaren uit Amerika ingevoerd en heeft overall veel opgang gemaakt. Ze is buitengewoon rijkbloeiend en kan in April buiten worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Aug.

1626. wit	20		0.20
1628. Apple Blossom	20	0.50	0.25
1630. gemengd	20	0.40	0.20

Voor andere Lathyrussoorten, zie onder „Klimplanten.”

LEPTOSIPHON.

Dit schoone laaggroeijende plantje is zeer rijkbloeiend. Een perk er van ziet er in den bloeitijd uit als een bloemtapijt. De bloemen komen voor in verschillende nuances van geel, rood, karmijnrood, enz.

Men zaait op de perken in April en zorgt er voor op tijd uit te dunnen, daar de planten pl. m. 15 cM. tusschenruimte moeten hebben. Bloeitijd Juli-Sept.

1632. *hybridus*, in gemengde kleuren 15 0.40 0.10

† LINARIA.

Schoon voor bouquets. De bloemen zijn geel en bronsachtig violet gekleurd. Men zaait half April en plant de plantjes in boschjes bij elkaar op de perken met een tusschenruimte van pl. m. 25 cM. Nog beter is het om in September te zaaien en onder glas te overwinteren.

Bloeitijd Juli-Sept.

1642. <i>maroccana hybrida</i> , gemengd	30	0.25	0.10
1644. „ „ <i>Excelsior</i> ”	30		0.20

Onder deze zeer gezochte, dankbaar bloeiende zomerbloem vindt men alle mogelijke nuances van donkerviolet tot lichtblauw, van donker-karmijn tot zachtrose; terwijl ook zachtgeel wordt aangetroffen.

Daar de maroccanasoorten zich zeer gemakkelijk laten kweken, is 't een plant die een ieder voldoen zal en ook op elken grond met succes kan worden uitgezaaid.

Ze laten zich ook tijdens den bloei zeer goed in potten overplaatsen.

LINUM.

De schitterend roode kleur maakt dit plantje zeer geschikt voor bloemperken. Men zaait begin Mei en dunt zoodanig, dat de plantjes 20 cM. van elkaar verwijderd komen te staan.

Bloeitijd Juli-Sept.

1646. *grandiflorum*, rood Vlas 15 0.50 0.20


*** LOBELIA.**

De Lobelia's zijn genoeg bekend, zoodat elke aanbeveling overbodig geacht kan worden. Voor randen en mozaïekperken vormen

zij onmisbaar materieel. Men zaait begin April in den warmen bak en verspeent ze eveneens onder glas en plant ze einde Mei op de perken. Om voller boschjes te krijgen plante men liefst eenige plantjes bij elkaar. Men kan ze ook nog in Mei op een warm plekje buiten uitzaaien, doch ze beginnen dan natuurlijk later te bloeien. Bloeitijd Juli-Oct.

1660. <i>erinus Kaiser Wilhelm</i> , helder blauw	15	1.75	0.25
1662. <i>erinus Prima Donna compacta</i> , donker rood	15		0.25
1664. <i>erinus Crystal Palace compacta</i> , blauw, de donkerste van alle	15		0.20
1666. <i>erinus Goldelse</i> , met goudgeel blad	15		0.25
1670. <i>erinus pumila splendens</i>	15		0.25

Zeer schoone laaggroeijende variëteit, donker purper violet gekleurd, met zuiver wit hart.



Lobelia hybrida Saphir.

1672. *hybrida Saphir* 60 0.30

De bloemen van deze nieuwe Lobelia hebben een prachtig diep blauwe kleur, welke te meer tot haar recht komt, door het scherp geteekende, groote, zuiverwitte oog, dat een derde der bloemen inneemt. Deze zijn 2 cM. in doorsnede en verschijnen aan ranken die circa 60 cM. lang worden en geheel met bloemen bezet zijn.

Een in pot gekweekte, volop bloeiende plant, is een sieraad voor balcon en bloementafel. In Januari uitgezaaid, bloeien de planten van einde Mei tot den herfst. Zaait men in September, zoo krijgt men bijzonder sterke planten, die reeds in April beginnen te bloeien.

† LUPINUS.

De meeste Lupinen-soorten worden half April buiten uitgezaaid. Ze kunnen niet tegen verplanten. Alleen L. Hartwegi, die uit Mexico is ingevoerd en niet goed tegen ongunstig weer kan, moet men bij verkiezing in kleine potjes uitzaaien onder glas en voorzichtig met kluit verplanten. Eene eigenaardigheid der Lupinen is, dat ze 's avonds de bladeren dichtvouwen.

1678. albus-coccineus	30	0.30	0.10
Rozerood met wit. Bloeitijd Juni-Juli.			
1680. Cruikshanksi . Bloeitijd Juli-October	100	0.25	0.10
Met groote blauwe welriekende bloemtrossen.			
1682. Hartwegi , gemengd, Bloeitijd Juli-October	60	0.30	0.10
1686. hirsutus , gemengd		0.20	0.10

† MALOPE.

Deze moet in Mei buiten worden uitgezaaid en vereischt zeer weinig zorg. Bloeitijd Juli-Aug.

1690. grandiflora purpurea	75	0.25	0.10
Met groote, rose, purperrood gevlekte bloemen.			
1692. grandiflora , gemengd	75	0.25	0.10

* MATRICARIA.

De Matricaria's of dubbele Kamillen moet men in Maart of April onder glas uitzaaien en in Mei buiten uitplanten. Ze worden veelal voor randen om perken gebruikt. Bloeitijd Juli-Oct.

1698. eximia Snowball met dubbele zuiverwitte bloemen	45		0.40
1700. eximia Goldball	30		0.25
Met talloze goudgele bloempjes, zeer geschikt voor randen.			

MESEMBRIANTHEMUM.

De Mesembrianthemums kunnen einde Mei buiten worden gezaaid; men geve de planten een tusschenruimte van 20 à 25 cM., door op tijd uit te dunnen. Wanneer men ze in Maart in den warmen bak zaait, later verspeent en in Mei uitplant bloeien ze vroeger.

1706. crystallinum , <i>Ijskruid</i> . Bloeitijd Juni-Juli	15	0.60	0.20
Eigenaardige bladplant, die geheel bedekt is met kristalachtige blaasjes, waardoor ze er als bedekt met ijs uitziet. Ze wordt veel gebruikt als hangplant in potten.			
1708. tricolor . Bloeitijd Juni-Sept.	15		0.20
De schoone rose bloemen openen zich alleen volkomen in de volle zon.			
1710. tricolor album , wit. Bloeitijd Juni-Sept.	15		0.20

MIMULUS.

De Mimulus-soorten worden in den warmen bak in Maart uitgezaaid, onder glas verspeend en in Mei buiten uitgeplant. Daar het zaad zeer fijn is moet men het niet met aarde bedekken, doch eenvoudig aandrukken en een weinig begieten. Zoodra mogelijk moeten de plantjes worden verspeend. Door hare levendige kleuren zijn deze planten zeer gezocht ook voor potcultuur. Bloeitijd Juni-Sept.

1714. cupreus . koperkl. oranje	45		0.20
1718. hybridus grandiflorus Feuerkönig , vuurrood met geel, purper gevlekt	30		0.35

1720. moschatus compactus , <i>Muskusplant</i>	15		0.30
1722. tigrinus , met schoone getijgerde bloemen	30		0.20

MIRABILIS.

Deze planten hebben zeer opvallende bloemen in allerlei kleuren en nuances. Ze worden in April in den warmen bak uitgezaaid en in Mei op de perken geplant. Men kan ook in Mei buiten uitzaaien, doch dan bloeien ze later. De knollen die zij vormen kunnen op dezelfde wijze als Dahlia's worden overwinterd en des voorjaars weer worden uitgeplant. Bloeitijd Juli-Aug.

1724. Jalapa , <i>Nachtschoonen</i> , in vele kleuren gemengd	60		0.30
1726. Jalapa Tom Thumb , zeer laag-groeiend, in vele kleuren gemengd	30		0.40

† NEMESIA.


De schoone groote bloemen dezer uit Engeland ingevoerde plant verschijnen in verschillende kleurschakeeringen van wit en geel tot oranje en karmijnrood. De plant moet echter met eenige zorg worden behandeld en in Maart onder glas worden uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Aug.

1730. strumosa Suttonii , gem.	30		0.30
1732. " " compacta nana	20		0.25
Laaggroeiende, zeer rijkbloeiende variëteit.			

NEMOPHILA.

Door hare zoo frissche en teere kleuren zijn deze planten zeer aan te bevelen voor vroege perken. In den bloeitijd zijn ze als met een tapijt van bloemen overdekt. Ze worden in Maart of April op de perken gezaaid en bij het uitdunnen zorgt men dat de planten 15 à 20 cM. tusschenruimte behouden. Bloeitijd Juni-Aug.

1736. atomaria Holborn Blue Bell , donkerblauw	20	0.25	0.10
1738. discoidalis , zwartbruin met witten rand	20	0.20	0.10
1740. insignis , prachtig hemelsblauw	20	0.20	0.10
1742. maculata , wit met donkerviolet vlekken	20	0.20	0.10
1744. gemengd	20	0.20	0.10



Nemophila maculata.

NICOTIANA.

De verschillende Siertabak-soorten worden liefst in den warmen bak uitgezaaid en niet vóór begin Juni uitgeplant. N.-affinis kan ook in Mei buiten worden gezaaid, doch bloeit dan wat later.

Bloeitijd Juni-Aug.

1746. **affinis**, witbloeiende *Siertabak* 75 0.30 0.10

De bloemen dezer soort zijn zeer welriekend.

1748. **colossea**, *Reuzentabak* 240 0.50

1750. **macrophylla gigantea** 120 0.10

De beide laatste soorten zijn bladplanten en maken als zoodanig in groepen bij elkaar geplant een verrassend effect.

1751. **Sanderæ** 70 0.15


Eene zeer schoone variëteit van de eenjarige Tabak. De plant brengt een groot aantal bloemen voort, die karmijnroze gekleurd zijn en een doorsnede hebben van 5 à 6 cM. In tegenstelling met de N.-affinis, die hare bloemen overdag gesloten houdt, zijn de bloemen dezer soort den geheelen dag geopend. Zij voldoet in alle opzichten zoowel alleenstaand als in groepen.

1752. **Sanderæ hybriden** 70 0.15

Door onderlinge kruisingen en bevruchtingen zijn uit de vroeger ingevoerde Nicotiana Sanderæ variëteiten ontstaan, die thans in de volgende kleuren voorkomen: purper, wit, rose, donker- en lichtrood, karmijnrood, zalmkleurigrood en donkerblauw.

1754. **sylvestris** 240 0.15

Zeer schoon voor alleenstaande plant, maar toch maakt deze in groepen het mooiste effect. Ze groeit 8 voet hoog en bloeit met zuiver witte, lange, eenigszins neerhangende bloemen.



Nicotiana Sanderæ.

† NIGELLA.

Dit plantje is zoo algemeen bekend, dat elke beschrijving overbodig kan geacht worden. Men zaait buiten half April. Bloeitijd Juni-Aug.

1756. **damascena fl. pl.**, *Juffertje in 't groen* 30 0.20 0.10

1757. **damascena Miss Jekyll**, nieuwe variëteit met hemelsblauwe bloemen 30 0.30 0.10

NYCTERINIA.

Laaggroeiend plantje, dat in Maart onder glas moet worden gezaaid. Bloeitijd Juni-Sept.

1760. **selaginoides**, zeer rijkbloeiend en welriekend 15 0.60 0.15

De kleur der bloemen gaat van zuiverwit over in licht rose of violet; in het midden oranjegevekt.

† OENOTHERA.

Deze plant kan zich zeer fors ontwikkelen. Men zaait in Maart-April in den kouden bak en plant in Mei uit op onderlingen afstand van 75 cM. Men kan ook einde April buiten uitzaaien.

De bloemen hebben een fijnen geur en blijven, afgesneden, zeer lang goed terwijl de knoppen zich nog openen. Eene eigenaardigheid van deze plant is nog, dat de bloemen zich eerst geheel openen in den namiddag. Bloeitijd Juli-Oct.

1764. **Lamarckiana** 90 0.20 0.05

1766. **rosea** 0.15

*** OXALIS.**

De Oxalis-soorten zijn zeer dankbaar bloeiende plantjes, die veel voor randen worden gebruikt en ook geschikt zijn voor potcultuur. Men kan ze einde April of in Mei buiten uitzaaien en zorg bij het uitdunnen pl.m. 15 cM. tusschenruimte te behouden.

Bloeitijd Juli-Sept.

1770. **tropaeoloides**, bruinachtig met gele bloemen 15 0.25

1772. **valdiviana**, geel 15 0.15

† PAPAVER.

De Papavers behooren tot de meest bekende en beminde zomerbloemen. De bloemen komen voor in allerlei kleurennuances. Ze laten zich zeer gemakkelijk kweken; men zaait ze half April op den kouden grond en zorgt voor behoorlijk op tijd uitdunnen. Ze kunnen niet tegen verplanten. Bloeitijd Juli-Sept.

1774. **Danebrog**, scharlakenrood met zilverwitte vlekken 45 0.25 0.10

1776. **glaucum**, (*Tulpenpapaver*) 30 0.60 0.20

Zuiver roodbloeiende Papaver, welke bij voorkeur in het najaar moet worden uitgezaaid. Bloeit Juli-Aug.

1780. **Murselli fl. pl.**, wit met rood gesprenkeld 30 0.25 0.10

1782. **Murselli fl. pl.**, *Mikado*, dubbel wit met karmijn gestreepte bloemen 60 0.30 0.15

1784. **Murselli fl. pl. splendens**, schitterend rose met wit 0.25 0.10

1788. **paeoniflorum fl. pl.**, gemengd 60 0.25 0.10

1789. „*Admiraal*” 0.15

De witte bloembladen dezer nieuwe, enkele, grootbloemige Papavers zijn omzoomd met een 2 cM. breeden rand van schitterend scharlakenroode kleur. Deze kleuren zijn scherp begrensd en vormen dus een schoon contrast. Zeer geschikt voor groote groepen.

† P A P A V E R (vervolg).

	Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.
1792. <i>Rhoeas Shirley</i> , enkele, in gemengde kleuren	60	0.45	0.15
1793. <i>somniferum fl. pl.</i> , in kleuren gemengd	90	0.25	0.10
1794. <i>somniferum nanum fl. pl. Cardinale</i> , vuurrood	45	0.30	0.10
1795. <i>somniferum nanum fl. pl. White Swan</i> , zuiverwit	45	0.30	0.10
1796. <i>somniferum nanum fl. pl.</i> , in k'euren gemengd	45	0.30	0.10
1797. <i>umbrosum</i> , scharlakenrood met zwarte vlekken		0.25	0.10
1798. <i>Virginia</i>		0.25	0.10

Deze éénjarige enkelbloemige Papaver heeft groote witte bloemen, welke zachtroze gerand en gefranjed zijn. Voor vaasbouquetten is zij zeer aanbevelenswaardig, daar de bloemen zich, afgesneden, betrekkelijk lang goed houden.

* PERILLA.

De Perilla's kunnen onder de beste sierbladplanten worden gerekend en worden dikwijls gebruikt voor randen om hooggroeiende bloemperken, als b.v. Canna's, Dahlia's enz. Ze maken dan een zeer schoon effect. Men zaait ze einde Maart in den warmen bak, verspeent ze onder glas, terwijl ze dan in Mei kunnen worden uitgeplant.

1799. <i>nankinensis</i> , bekende bruin-bladerige sierplant	45	0.15
--	----	------


P E T U N I A.

De Petunia's kunnen zonder twijfel tot de schoonstbloeiende planten worden gerekend, dank zij de groote verscheidenheid en de meest schitterende kleuren en vormen harer bloemen. Zij bloeien den geheelen zomer aanhoudend door. Men kan ze voor allerlei doeleinden gebruiken, zooals voor perken, balcon, groote tuinvazen, versiering van oude muren en ruïnen enz. en vooral wat betreft de grootbloemige en dubbele soorten voor potcultuur.

Daar de kweekwijze doodeenvoudig is, behoeft dit niemand af te schrikken om ze te zaaien. In Maart of April zaait men in een lauwarmen bak in potten of zaaipannen gevuld met lichten tuingrond. Men moet ze later onder glas verspenen en na eenige weken uitplanten, hetzij in potten, hetzij op den kouden grond zoodra het weer dit toelaat. Op de perken moet men ze niet dichter planten dan 50 cm. Nog valt bij het zaaien op te merken, dat de zeer fijne zaden bijna of in 't geheel niet met aarde mogen worden bedekt. Indien men geen bak te zijner beschikking heeft, kan men ook in potten in de kamer zaaien, om ze, zoodra de plantjes sterk genoeg zijn, te verplanten. Bij deze planten, vooral bij de dubbele, valt nog op te merken, dat men niet zooals dit dikwijls geschiedt bij het verspenen of verplanten de mooiste en zwaarste planten uitzoekt, daar deze meesttijds bloemen van mindere kwaliteit voortbrengen. Men kan van de mooiste soorten ook planten overwinteren in kamer of serre en dan in 't voorjaar stekken.

Bloeitijd Juli-Oct.

1804. <i>hybrida</i> , gewone in schoone kleuren gemengd	45	1.20	0.20
1808. <i>hybrida grandiflora</i> , grootbloemige prachtsoorten	45	0.75	
1816. <i>hybrida grandiflora fimbriata</i> , gekartelde in de schoonste grootbloemige soorten	45	0.80	
1820. <i>hybrida nana compacta</i> , prachtige lage Petunia, gemengd	45	0.30	



Petunia hybr. grandifl. fimbriata.

	Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.
1824. <i>hybrida grandiflora fl. pl.</i> , dubbel grootbloemige prachtsoorten gemengd	45		1.—
1826. <i>hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.</i> , dubbele gekartelde soorten gemengd	45		1.—

* PHACELIA.

Zeer schoon plantje met satijnblauwe klok-vormige bloemen; ook uitnemend geschikt voor randen. Men zaait in April-Mei op de perken en geve bij het uitdunnen de plantjes een tusschenruimte van circa 25 cm.

Bloeitijd Juli-Sept.

1828. <i>campanularia</i>	30	0.70	0.20
1830. <i>tanacetifolia</i>	30	0.30	0.10

Prachtig bijenvoeder-gewas.

† PHLOX DRUMMONDI.

De *Phlox Drummondii* kan zonder twijfel tot de schoonste en dankbaarste zomerbloemen worden gerekend. Door het groote aantal variëteiten, dat thans bestaat, maar waaruit ik echter alleen de beste en meest uiteenlopende heb gekozen, kan men met deze planten de meest kleurrijke perken maken. De kweekwijze is zeer eenvoudig. Men kan ze zaaien op den kouden grond in April-Mei en bij het uitdunnen de planten een tusschenruimte van pl.m. 15 cm. laten behouden. Ook zaait men ze in Maart-April in den kouden bak; zoodra de planten eenige blaadjes hebben, kan men ze op de perken zetten en ze nog wat meer ruimte geven, b.v. 25 centim. Om laat in het najaar nog Phloxbloemen te kunnen snijden voor bouquetten, zaait men ook nog in 't begin van Juni. Bloeitijd Juli-Oct.

1832. in schoone kleuren gemengd	45	0.90	0.20
1834. <i>cuspidata</i> , met spits toeloo-pende bloembladen in schoone kleuren gemengd	45		0.35
1836. <i>fimbriata</i> , met franjeachtige bloembladen in schoone kleuren gemengd	45		0.40
1838. <i>grandiflora</i> , grootbloemige prachtsoorten gemengd	45	1.—	0.25
1840. <i>grandiflora alba</i> , zuiver wit	45		0.35
1842. „ <i>atro-purpurea</i>	45		0.35
1844. „ <i>brillant</i>	45		0.35

†PHLOX DRUMMONDI (vervolg).	Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
1846. <i>grandiflora striata coerulea</i> , blauw gestreept	45		0.35
1850. <i>grandiflora isabellina</i> , isabel- lageel	45		0.35
1852. <i>grandiflora kermesina albo- oculata</i> , karmijnrood met wit oog	45		0.35
1856. <i>grandiflora violacea albo- oculata</i> , violet met wit oog . . .	45		0.35
1858. <i>grandiflora splendens</i> , schit- terend scharlakenrood met wit oog	45		0.40
1862. <i>nana compacta</i> , prachtige lage soorten gemengd	20	1.90	0.50
1864. <i>nana compacta atro-purpurea</i> , purperrood	20		0.60
1868. <i>nana compacta coerulea stel- lata</i> , helderblauw met wit oog . .	20		0.60
1870. <i>nana compacta nivea</i> „Schnee- ball”	20		0.60
1872. <i>Heynholdi</i>	20		0.40
1874. <i>Hortensiaeflora</i> , in vele kl. gem.			0.45

PORTULACA.

Voor bloemperken kunnen de Portulaca's met hare levendig gekleurde bloemen, vooral op zonnig gelegen plaatsen niet genoeg worden aanbevolen. Hetzij men buiten zaait of in den bak, moet er steeds aan worden gedacht, dat dit zaad weinig of niet met aarde mag worden bedekt. Wil men direct op de perken zaaien, zoo doet men dit niet dan na half Mei bij gunstig weder. Zekerder is men evenwel, wanneer men in den bak zaait omstreeks half April en ze ook na het verspenen onder glas houdt. Men kan de plantjes dan half Mei of begin Juni, naar gelang van het weder op de perken zetten en zorg voor een afstand van 15 à 20 cM. Bloeitijd Juli-Sept.

1878. <i>grandiflora</i> , enkel in vele kleu- ren gemengd, kruipend	1.20	0.30
1886. <i>grandiflora fl. pl.</i> , dubbele prachtsoorten, gemengd		0.45


Zeer schoon voor perken, niettegenstaande er bij het uitzaaien dezer soort altijd nog een gedeelte enkelbloemige exemplaren zijn.

† RESEDA.

De Reseda's zijn zoo algemeen bekend, dat hierover niet veel behoeft te worden gezegd. Men zaait in den vollen grond in de eerste helft van Mei. Om het lang doorbloeien te bevorderen moet men geregeld de uitgebloeide takjes afsnijden. Bloeitijd Juni-September.


1892. <i>odorata grandiflora (amelio- rata)</i> , gewone grootbloemige Reseda	30	0.30	0.10
1894. <i>odorata grandiflora multiflora compacta</i> , lage, gedrongen variëteit		0.60	0.15
1900. <i>odorata grandifl. eximia</i> , wit	30	0.35	0.10
1901. „ „ <i>Gabrielle</i>	30	0.50	0.15
1902. „ „ <i>Machet</i> , ge- drongen groeiwijze met groote bloemen	20	1.—	0.25
1904. <i>odorata grandifl. Machet goudgeel</i>	20		0.25
1905. <i>odorata grandifl. Machet Witte Parel</i>	20		0.30

Nieuwe variëteit van een krachtige, gedrongen groei; zij bloeit met mooi-gevormde dikke, witte bloemtrossen, welke flink boven het donkergroene loof uitkomen.



Reseda odorata grand. roode Goliath.

	Hoog cM.	Per lood.	Per pakje.
1906. <i>odorata grandiflora roode Goliath</i>	30	1.25	0.30
Deze extra grootbloemige Reseda heeft een gedrongene kandelabervormige groeiwijze. De helderroode bloemstruiken groeien recht opwaarts en hebben bij een lengte van 18 cM. menigmaal een doorsnede van 6½ cM. Deze variëteit stelt zoowel door haar schitterende kleur als door haar ongeëvenaarden geur zoozeer alle Reseda-soorten in de schaduw, dat ze zonder eenig voorbehoud de schoonste van allen mag genoemd worden. De bloemen blijven, wanneer ze afgesneden zijn, in water 8—10 dagen goed.			
1907. <i>odorata grandifl. witte Goliath</i>	30	1.25	0.30
Eene witte variëteit der voorgaande, welke voor enkele jaren werd ingevoerd. Beiden hebben geheel dezelfde gedrongen groeiwijze. De talrijke, rechtopstaande stengels zijn van uiterst sterke en lange trossen voorzien, die door haar witte kleur in verbinding met het glanzend-frisch groene loof een fraai effect vormen. De bloemtrossen van deze zijn belangrijk sterker dan die der „Witte Parel,” terwijl ook de kleur zuiverder is. In samenstelling met Roode Goliath levert zij een verrassenden aanblik. (Zie afb. blz. 101.)			
1908. <i>odorata grandifl. Victoria, donkerbruinrood</i>	30	0.45	0.15
1909. in soorten gemengd		0.30	0.10



Reseda odorata grandiflora witte Goliath.
(Zie beschrijving blz. 100.)

RICINUS.

Voor groote perken zijn deze reusachtige snelgroeiende bladplanten ten zeerste aan te bevelen. Ze hebben een eenigszins tropisch voorkomen; wil men ze goed tot ontwikkeling zien, zoo moet men den grond flink mesten. Men zaait de pitten half Mei op den kouden grond.


	Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.
1910. <i>borboniensis arboreus</i> , Wonderboom	120		0.25
1912. <i>Gibsoni</i>			0.25
Deze variëteit, die tot 2 Meter hoog kan groeien, heeft prachtige donkerroode bladeren met metaalachtigen glans.			
1914. <i>sanguineus</i>			0.20
Groeit tot 2 Meter hoog en heeft bloedroode vruchten.			
1916. <i>zanzibariensis</i> , gemengd . . .	150		0.30

† SALPIGLOSSIS.

Deze planten hebben zeer schoone, grillig gekleurde bloemen; zij laten zich niet gemakkelijk verplanten en worden begin Mei op een warm plekje uitgezaaid. Bloeitijd Juli-Sept.

1920. <i>variabilis grandiflora</i> , in vele kleuren gemengd	75		0.30
1922. <i>variabilis nana</i> , lage in vele kleuren gemengd	30		0.30
1924. <i>variabilis superbissima</i> . . .	75		0.30

Eene variëteit van de bekende *Salpiglossis variabilis*. De kleur dezer nieuwe Keizer *Salpiglossen* varieert van rose tot donker-scharlaken, terwijl ook helderblauw en goudgeel wordt aangetroffen.



Salpiglossis variabilis.

† SALVIA.

De *Salvia*'s kunnen in het voorjaar in kas of bak gezaaid worden, om in Mei buiten te worden uitgeplant. Ze bloeien het eerste jaar uit zaad van Juli tot het gaat vriezen; het zijn half vaste planten.

1926. <i>coccinea</i>	30		0.20
Met schoone vuurroode bloemen.			

SAPONARIA.

Kruipend plantje, dat zeer rijk bloeit. Men zaait op den kouden grond in Maart of April. Bloeitijd Juli-Oct.

1934. <i>multiflora</i> , rose	15	0.20	0.05
1936. „ <i>alba</i> , wit	15	0.20	0.05

† SCABIOSA.

De *Scabiosa*'s laten zich uiterst gemakkelijk kweken. Men zaait ze in April-Mei, hetzij direct op de perken of eerst op een bed om ze later uit te planten. Ze hebben dit voordeel, dat het verplanten zonder eenig nadeel kan geschieden, en men kan daarmede zelfs wachten tot dat de eerste bloemen verschijnen. Een paar malen flink begieten is voldoende om de planten te laten doorgroeien. Men geeft ze een tussenruimte van 40 cm. Bloeitijd Juli-Oct.

1942. <i>candidissima plena</i>	60		0.20
Dubbele witte bloemen, extra mooi voor bouquets.			
1946 <i>atropurpurea major grandiflora fl. pl.</i> , met groote en dubbele bloemen, in vele kleuren gem. . .	60	0.40	0.15
1948. <i>atropurpurea nana fl. pl.</i> , laag in vele kleuren gemengd	30	0.30	0.10

† SCHIZANTHUS.

Deze planten hebben zeer eigenaardig gevormde en fraai gekleurde bloemen, die eenigszins aan vlinders doen denken, waardoor ze zeer gezocht zijn voor bouquets. Men zaait in April-Mei op den kouden grond. Ook kan men ze met succes in potten kweken. Bloeitijd Juli-Oct.

1952. <i>hybridus grandiflorus</i>	30	0.75	0.20
--	----	------	------

Eene in de laatste jaren ingevoerde prachtige variëteit die zoowel voor potcultuur als voor perken geschikt is. De pl.m. 30 cm. hooge, pyramidaal gevormde planten zijn overdekt met een menigte in alle denkbare kleuren voorkomende op Orchideeën gelijkende bloemen.

Per
pakje.

*** SENEIO.**

Uitmunten plantje voor randen, dat bijna op elken grond groeit. Men zaait in April-Mei op den kouden grond en geve bij het verplanten minstens 40 à 50 cM. tusschenruimte, waardoor de planten zich beter zullen ontwikkelen dan wanneer ze te dicht staan. De afgesneden bloemen blijven in water zeer lang goed. De bloemen komen voor in de meest verschillende nuances van rose, lila, violet, rood tot wit. Bloeitijd Juli-Oct.

1964. elegans nanus plenissimus , in vele kleuren gem.	20	0.25
1966. elegans plenissimus , in kleuren gemengd	20	0.25
1968. elegans pomponicus fl. pl. , in gemengde kleuren	20	0.25

Allerliefste variëteit met dubbele kleine ronde bloemen.

SILENE.

Daar de *Silene's* tot de vroegstbloeiende planten behoren, worden ze veelvuldig gebruikt voor het beplanten van voorjaarsperken, waarvoor ze door den grooten rijkdom van bloemen uitnemend geschikt zijn. Als een perk hiervan in vollen bloei is, ziet men letterlijk niets dan bloemen. Ofschoon men ze ook wel in 't voorjaar kan zaaien, en ze dan natuurlijk later bloeien, voldoet najaarszaaiing het best. Men zaait einde Juli of Augustus, verspeent de plantjes op 15 cM. afstand en plant ze begin October op de perken met een tusschenruimte van 30 cM. Men moet ze met dennentakken of ander licht materiaal voor strenge vorst dekken. Bloeitijd Mei of Juli.

1972. pendula compacta , rood . . .	15	0.30	0.10
1974. „ „ alba , wit . . .	15	0.30	0.10
1976. „ „ fl. pl. , dubbel rose	15	0.40	0.15
1980. pendula compacta fl. pl. Perzikbloesem , zeer compact en extra dubbel	30	0.20	
1982. pendula Bonnetti , donker purperrood	30	0.30	0.10
1984. pendula ruberrima , donkerrood	30	0.30	0.10

† TAGETES.

De *Afrikanen* zijn zeer algemeen bekende zomerbloemen, doch daarom niet minder in waarde voor den bloemenliefhebber. Ze vereischen bijzonder weinig zorg en de afgesneden bloemen blijven lang frisch. De planten laten zich zelfs wanneer ze reeds volop in knop zijn nog met succes verplanten. Men zaait ze einde April op een warm bed en verspeent ze op tijd, om ze einde Mei of tegen den tijd dat ze beginnen te bloeien, met kluitjes op de perken te zetten. De hoge soorten geve men 50 cM., de lage 30 cM., tusschenruimte. Na het planten moet men flink aangieten. Bloeitijd Juli-Sept.

1996. erecta aurantiaca plena , <i>hooge Afrikaan</i> , met oranjebloem . . .	75	0.60	0.15
1998. erecta Eldorado , <i>hooge Afrikaan</i> , met enorm groote oranje bl. . .	100	0.60	0.15
2000. erecta fl. pl. , <i>hooge dubbele Afrikaan</i> , in gemengde kleuren . .	75	0.50	0.15
2001. halfhooge Fransche hybriden , in prachtige soorten gemengd . .	40	0.80	0.20
2002. patula nana fl. pl. Electrisch licht	45	0.80	0.20

Zwavelgeel met bruine streepen.

2003. patula nana Goudrand , enkele, purperbruin met goudgelen rand .	30	0.60	0.15
2004. patula nana Legioen d'Honneur , <i>lage enkelbloemige Afrikaan</i> , geel met bruine vlekken	30	0.60	0.15
2006. patula nana fl. pl. , <i>lage Afrikaan</i> , in gemengde kleuren	30	0.60	0.15
2008. signata pumila , zeer laag, rijkbloeiend met schoon geteekende, oranje en bruingekleurde bloemen .	20	0.80	0.20

TROPAEOLUM.**(Lage Oost-Ind. Kers).**

De laaggroeiende *Oost-Ind. Kers* kan begin Mei worden gezaaid op den kouden grond. Bloeitijd Juli-October.

2012. majus nanum , <i>lage Oost-Ind. Kers</i> , in kleuren gemengd	30	0.20	0.10
2014. majus nanum Aurora , donkergeel met bruine vlekken	30	0.20	0.10
2016. majus nanum Empress of India , met donkere bladeren en scharlakenroode bloemen	30	0.30	0.15
2018. majus nanum King Theodore , zwartrood	30	0.30	0.15
2020. majus nanum Pearl , geelachtig wit	30	0.20	0.10
2021. majus nanum King of Tom Thumbs , vurig scharlaken met donker blad	30	0.30	0.15
2022. majus nanum Spencer , in prachtige kleuren gemengd	30	0.30	0.15

† VERBENA.

De *Verbena's* met haar schitterend gekleurde bloemen, die den geheelen zomer doorbloeien, leenen zich bij uitstek voor bloeiende perken. Men zaait einde Maart in den bak, verspeent de jonge plantjes onder glas, hetzij eenvoudig in den bak of in potjes en plant ze half Mei op de perken met een tusschenruimte van 30 cM. De laaggroeiende verscheidenheden kan men iets dichter planten. Wanneer men begin Mei op den kouden grond zaait, zullen de planten in den nazomer bloeien. Bloeitijd Juni-September.

2024. hybrida , in vele kleuren gem. .	30	1.—	0.20
2026. „ coccinea , in roode variëteiten	30	0.30	
2028. hybrida grandiflora , in grootbloemige prachtsoorten gemengd .	30	1.20	0.25
2030. hybrida aurikelbloemige , schoone variëteiten, met wit oog .	30	0.30	
2032. hybrida candidissima zuiver wit	30	0.30	
2034. hybrida Defiance , scharlakenr. .	30	0.30	
2036. „ grandiflora Mammuth , in kleuren gemengd	30	0.40	
2037. hybrida Purpermantel , donkerpurper met wit	30	0.30	
2038. hybrida compacta , laaggr. in vele prachtsoorten gemengd	20	0.50	

VIOLA

TRICOLOR MAXIMA.

De beste tijd van zaaien voor de grootbloemige Violtjes is einde Juli in den vollen grond. Zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze in goeden grond op een afstand van 10 centimeter om ze later, b.v. in de laatste helft van October, met een kluitje op de perken te zetten, na deze eerst flink te hebben bemest. Men plant ze dan op 30 centim. afstand van elkaar. Bij strenge koude is het goed ze met eenige ruigte of dennentakken licht te bedekken. Op deze wijze behandeld, zullen de bloemen hare volkomen grootte bereiken. Men kan ze ook in 't voorjaar zaaien, maar de bloemen worden dan veel kleiner. Bloeitijd Maart-Juli.

	Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.
2044. <i>Grootbloemige Engelsche Pensées</i> of <i>Violtjes</i> in vele kleuren gemengd	15	0.75	0.15
2046. <i>alba pura</i> (Schneewittchen), zuiver wit	15	1.75	0.30
2048. <i>cardinal</i> , prachtige bruinroode kleur	15	1.75	0.30
2050. <i>Feuerkönig</i> , zeer schoon geel met purperkleurig en bruin oog	15	1.50	0.25
2051. <i>Kaiser Friedrich</i> , zeer donker met gelen rand	15	1.50	0.25
2052. <i>Kaiser Wilhelm</i> , donker blauw met purperviolet oog	15	1.50	0.25
2054. <i>Lord Beaconsfield</i> , purperviolet, bovenste bloembladeren wit	15	1.20	0.20
2055. <i>Météor</i> , prachtig donkerbruinrood	15	1.75	0.30
2056. <i>nigra Dr. Faust</i> , zwart	15	1.50	0.25
2058. <i>Bugnot's</i> prachtsoorten, in vele nuances met groote vlekken	15	2.50	0.40
2060. <i>Cassier's</i> grootbloemige drie- en vijfvekkige prachtsoorten gem.	15	2.—	0.35
2062. <i>Odier</i> , schoone vijfvekkige Fransche Pensées in vele nuances	15	2.25	0.40
2063. <i>Pauwenoo</i> , lichtblauw met oog en witten rand	15	1.75	0.30
2064. <i>Trimardeau</i> , <i>Reuzenpensées</i> , gemengd	15	1.—	0.20
Uit Frankrijk ingevoerde pensées, welke zich kenmerken door gedrongen groeiwijze en buitengewoon groote bloemen, die meestal met groote vlekken zijn geteekend en in verschillende kleuren voorkomen. De bloemen hebben een middellijn van 7 à 10 cm.			
2066. <i>Trimardeau Adonis</i> , helderblauw met wit hart	15	2.—	0.30
2068. <i>Trimardeau atro-purpurea</i> , donkerpurperrood	15	2.—	0.30
2070. <i>Trimardeau candidissima</i> , zuiver wit	15	2.—	0.30
2072. <i>Trimardeau Goldelse</i> , goudgeel	15	2.—	0.30

VISCARIA.

Dit laaggroeiende plantje kan buiten worden uitgezaaid. Bloeitijd Juni-Augustus.

2076. <i>cardinalis</i> , magentarood	30	0.30	0.10
2078. <i>oculata candida</i> , zuiverwit	30	0.30	0.10
2080. „ <i>hybrida</i> , gemengd	30	0.30	0.10

WHITLAVIA.


Men zaait deze plantjes begin Mei op de perken. De aardige heldergekleurde klokvormige bloempjes verschijnen reeds zeer vroeg en in grooten getale. Bloeitijd Juni-Aug.

2088. <i>grandiflora gloxinoides</i> , wit met blauwgevlekte klokjes	30	0.10
--	----	------

† ZINNIA.

De *Zinnia's* behooren tot de meest bekende zomerbloemen. Men zaait ze op een warm plekje in den tuin omstreeks half April en zoodra de planten eenige blaadjes hebben, verspeent men ze, hetzij direct op de perken of nog beter eerst op een bed om ze later met een kluitje te verplanten. Men geve de planten 40 à 50 centimeter tusschenruimte. Bloeitijd Juli-October.

2090. <i>elegans</i> , enkele en halfdubbele gemengd	60	0.60	0.20
2096. <i>elegans fl. pl.</i> , dubbele in vele kleuren gemengd	60	1.—	0.30
2098. <i>elegans fl. pl. „Roodkapje,”</i> vuurrood, prachtig gevormd	60		0.50
2100. <i>elegans grandiflora robusta fl. pl.</i> , reuzenbloemige gemengd	75	1.60	0.50
2102. <i>elegans fl. pl. Tom Thumb</i> , <i>Dwerg-Zinnia's</i> in prachtsoorten gemengd	30		0.50
2104. <i>Haageana fl. pl.</i> , dubbele gele variëteit	30		0.50
2106. <i>elegans striata fl. pl.</i> , gestreepte, gemengd	60		0.50



Zinnia elegans fl. pl.

Zaden van Klimplanten.

ARISTOLOCHIA.

Prachtige klimplant, die in den bak wordt uitgezaaid en sterk groeit. Meestal bloeit ze reeds het eerste jaar.

2112. *elegans* 7—10 0.35

Zeer rijkbloeiend met bruine en gele bloemen.

COBAEA.

Voor bedekking van muren wordt deze snelgroeiende plant met succes gebruikt. De groote klokvormige bloemen zijn eerst groen doch kleuren zich spoedig prachtig violet-blauw. Men zaait begin April in den bak.

2122. *scandens* 7—10 0.30

ECCREMOCARPUS (CALAMPELIS).

In Maart in den warmen bak uitgezaaid en daarna verspeend worden de plantjes begin Mei buiten geplant. Het is een der schoonste klimplanten met talloze oranje-kleurige bloemen en zeer geschikt voor bedekking van muren en schuttingen.

2126. *scaber* 7—10 0.20

HUMULUS.

Deze plant groeit snel en zeer hoog, is goed bestand tegen het weder en daardoor vooral geschikt tot het bedekken van priëltjes, welke op open plaatsen zijn gelegen. Men zaait in April op den kouden grond.

2130. *japonicus*, *Japansche Hop*, . . 7—10 0.20

2132. „ *fol. var.* 7—10 0.20

Met witbonte zilverachtige bladeren. Maakt een prachtig effect.

IPOMAEA.

Deze plant wordt ook wel klimmende Convolvulus genoemd en is bijzonder geschikt voor balkons. Zij is zeer gemakkelijk te kweken en wordt voor dat doeleinde in April in groote potten of zinken bakken met aarde gezaaid.

2140. *purpurea*, in gemengde kleuren 7—10 0.25

2142. „ *fl. pl.*, gemengd . . 7—10 0.35

Dubbele variëteit der voorgaande.

† LATHYRUS ODORATUS.

Deze welriekende erwten kunnen evenals de doperwten worden gekweekt en half April bij erwtenrijs of gaasdraad worden gezaaid. Ze hebben gaarne veel zon, doch vereischen verder niet de minste zorg. Zeer schoon voor bouquets.

Ook andere, niet in deze Catalogus genoemde soorten, zullen op verlangen gaarne geleverd worden.

ECKFORDS HYBRIDEN

grootbloemige.

2143. *Agnes Eckford*, rose 7—10 0.35 0.20

2145. *Aurora*, wit, oranje gestr. . . 7—10 0.35 0.20

2147. *Bolton's Pink*, schitterend zalmkleurig rose 7—10 0.40 0.20


2148. *Coccinea*, prachtig kersrood . 7—10 0.35 0.20

2149. *Dainty*, wit met rose; langstelig 7—10 0.40 0.20


2150. *Dorothy Eckford*, grootbloemig zuiver wit. 7—10 0.40 0.20

2151. *Duke of Westminster*, helder purper, violet getint; grootbloemig 7—10 0.40 0.20

2152. *Georgious*, helder rose, oranje getint 7—10 0.35 0.20



Calampelis scaber aurea.



Lathyrus Mont Blanc.


	Bloei- tijd.	Per lood.	Per pakje.		Bloei- tijd.	Per lood.	Per pakje.
LATHYRUS ODORATUS (vervolg).				MINA.			
2153. Henry Eckford , prachtig oranje rose	7—10	0.40	0.20	De bloemen dezer schoone klimplant zijn eerst hoog rood, welke kleur bij het ontluiken in oranjegeel en later in geelachtig wit overgaat. Deze moet eveneens onder glas worden gezaaid.			
2154. King Edward VII , helderrood, grootbloemig	7—10	0.40	0.20	2177. lobata	7—10		0.25
2155. Lady Grisel Hamilton , licht heliotroop met lavendelblauw	7—10	0.40	0.20	PASSIFLORA.			
2156. Loveley , prachtig rose scharlaken, grootbloemig	7—10	0.40	0.20	Deze algemeen bekende Passiebloem moet worden uitgezaaid in den bak. Ze vereischt niet heel veel zorg, wanneer men slechts niet te schralen grond neemt.			
2157. Mars , schitterend karmozijn	7—10	0.35	0.20	2178. coerulea	7—10		0.30
2158. Mont Blanc	7—10	0.35	0.20	Zeer rijkbloeiend met lichtblauwe bloemen.			
Prachtige, zeer vroeg bloeiende variëteit met groote zuiver witte bloemen.				THUNBERGIA.			
2159. Salopian , met goedgevormde groote bloemen van een schitterend karmozijn roode kleur	7—10	0.35	0.20	Deze plant wordt bijna uitsluitend als hangplant in potten gekweekt. De helder-gekleurde bloemen hebben van binnen een zwarten vlek. Zij wordt in den bak gezaaid.			
2162. Eckfords hybriden , in vele kleuren gemengd . per ons f 2.—	7—10	0.30	0.15	2182. alata , in gemengde kleuren	7—10	0.60	0.20
2163. PRÆCOX , in schoone kleuren gemengd	7—10		0.45	TROPAEOLUM.			
De <i>Lathyrus praecox</i> is zeer geschikt om te vervroegen. In het voorjaar op den kouden grond gezaaid, bloeien ze ook aanmerkelijk vroeger dan de andere variëteiten.				(Klimmende Oost-Ind. kers).			
† LATHYRUS ODORATUS, SPENCER TYPEN.				De <i>Oost-Ind. kers</i> wordt einde April buiten gezaaid. Nog beter is het om onder glas te zaaien en in Mei buiten te planten.			
Nieuwe <i>Lathyrus</i> -klasse, welke zich onderscheidt door bijzonder groote breede, gegolfde bloemen.				2190. majus , in vele kleuren gemengd per ons f 0.90	7—10	0.15	0.10
2164. Asta Ohn , lilarose	7—10	0.70	0.35	2192. majus Chamæleon	7—10	0.20	0.10
2165. Countess Spencer , brillant scharlaken rose; zeer langstelig	7—10	0.80	0.40	Deze brengt aan één tak bloemen van verschillende kleuren voort.			
2167. Flora Norton , helderblauw	7—10	0.75	0.40	2194. majus Prins Hendrik , zeer schoon	7—10	0.20	0.10
2168. Helen Lewis , zalmkl. oranje	7—10	0.80	0.40	2196. lobbianum , in vele kleuren gemengd	7—10	0.20	0.10
2170. King Edward , donker scharlaken	7—10	0.80	0.40	2198. lobbianum hederæfolium , (<i>klimopbladerig</i>)	7—10	0.30	0.15
2171. Marie Corelli , karmozijn rose, prachtig	7—10	0.75	0.40	Zeer schoone variëteit met bladeren van een donkere metaalkleur, die een eigenaardig contrast vormen met de scharlakenroode bloemen, die in groote menigte zich vertoonen. Ze komt goed op uit zaad. Zeer geschikt voor plantenhangers, potten enz.			
2172. Maud Holmes , karmozijn	7—10	0.75	0.40	2199. lobbianum Koningin hybriden , bontbladerige variëteiten in prachtmengsel	7—10	0.25	0.15
2173. Mrs. Cuthbertson , rose en wit	7—10	0.70	0.35	2200. lobbianum Margarite	7—10	0.25	0.15
2174. Nora Unwin , zuiverwit	7—10	0.90	0.45	Van binnen heldergeel, bloedrood gevlekt en gestreept. Het loof is donker met blauw-achtige tint.			
2175. Spencer Typen , prachtmengsel per ons f 3.75	7—10	0.50	0.25	2202. peregrinum (canariëense)	7—10	0.30	0.15
MAURANDIA.				Zeer fraaie, snelgroeende klimplant met kanariegele bloemen.			
Deze sierlijke klimplant verlangt buiten een warm plaatsje tegen een muur op het zuiden. Ook wordt zij veel in potten gekweekt aan een hekje of eenige stokjes te zamen gebonden. Met moet in Maart in den bak uitzaaien.				SIERKALABASSEN.			
2176. In schoone soorten gemengd			0.30	Wat de kweekwijze der Sierkalabassen betreft, verwijs ik naar hetgeen op bladz. 79 over de Pompoenen is gezegd.			
				2204. groote soorten, gemengd		0.35	0.15
				2206. kleine " "		0.35	0.15



✠ Zaden van Immortellen of Stroobloemen.

Deze worden hoe langer hoe meer gebruikt, daar ze ons een duurzaam genot kunnen verschaffen in een tijd des jaars, waarin frissche bloemen zeldzaam zijn. Onderstaand vindt men eene keus der beste soorten, die gemakkelijk kunnen worden gedroogd en geschikt zijn tot het maken van winterbouquetten. Men snijde de bloemen af op een zonnigen dag, zoodra ze in vollen bloei zijn en hange ze eenige weken onderstboven op een droge plaats. De hier aangebodene soorten kunnen alle begin Mei op den kouden grond worden uitgezaaid en behoorlijk uitgedund. Men geve ze een eenigszins warm en beschut plekje in den tuin en zoo mogelijk zandigen grond. *Ammobium* en *Gomphrena* geven de voorkeur aan een uitzaaiing onder glas, daar deze anders eerst laat in bloei komen. Bloeit. Juli-Sept.


	Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.		Hoog cm.	Per lood.	Per pakje.
ACROCLINEUM.				2228. bracteatum album , wit . . .	40	0.40	0.15
2208. album , wit	45	0.40	0.10	2230. „ roseum , rozerood	40	0.40	0.15
2210. „ fl. pl. , dubbel wit . .	45	0.50	0.15	2232. monstrosum fl. pl. , dubbele immortellen, gemengd	45	0.50	0.15
2212. roseum , rozerood	45	0.30	0.10	2234. monstrosum nanum plenissi- mum , gemengd	30	0.60	0.15
2214. „ fl. pl. , dubbel rozerood		0.50	0.15	Laaggroeiend met dubbele bloemen.			
2216. gemengd	45	0.35	0.10	RHODANTHE.			
AMMOBIUM.				Van alle stroobloemen zijn het de <i>Rhodanthes</i> en vooral de <i>R. Manglesi</i> , welke den liefhebber de meeste voldoening geven. Zij zijn zeer gemakkelijk te kweken en zoowel geschikt in bouquetten van levende als van gedroogde bloemen.			
Met hare witte bloemen uitmuntend geschikt tot het maken van winterbouquetten.				2244. maculata , rose met donkeren rand	20	0.60	0.15
2218. alatum grandiflorum	60	0.35	0.10	2246. maculata alba , wit	20	0.60	0.15
GOMPHRENA.				2248. Manglesi , roserood	20	0.60	0.15
Deze vormt gedrongen planten, die geschikt zijn voor potcultuur. Zooals boven aan deze rubriek is gezegd, moeten ze onder glas worden gezaaid en verspeend. In Juni plant men ze uit.				2250. „ fl. pl. , met schoone dubbele bloemen	20		0.30
2226. globosa , in diverse kleuren .	30		0.20	2252. gemengd	20	0.50	0.15
HELICHRYSUM.				XERANTHEMUM.			
Dit zijn de meest bekende van alle stroobloemen. De bloemen moeten afgesneden worden wanneer ze nog niet geheel open zijn en moeten dan als gewoon op een koele plaats onderstboven worden opgehangen.				Deze kunnen tot de meest bekende stroobloemen worden gerekend. Men zaait ze in April—Mei en ze bloeien dan Juli—October.			
				2258. annuum , in soorten gemengd.	45		0.35



†Zaden van Siergrassen.

Evenals de *Immortellen*, leveren ook de siergrassen een onschatbaar materiaal zoowel voor groene, als voor gedroogde bouquetten, daar zij zeer lang kunnen bewaard worden en de meeste met haar sierlijke pluimen of aren een zeer schoon effect maken. De afgesneden bloemaren worden evenals de *Immortellen* behandeld. De meeste siergrassen kunnen in Augustus worden gezaaid en zullen dan het volgend jaar beter groeien en bloeien dan bij voorjaarszaaiing. Wil men echter in het voorjaar zaaien, zoo moet men dit in Maart—April doen. Bloeitijd Juli—October.

AGROSTIS.				COIX.			
Dit is een der fijnste siergrassen, zóó fijn, dat, in bouquetten gebruikt, deze er uitzien alsof ze met een doorzichtig waas zijn bedekt.				De eigenaardige harde roode vruchtjes geven aan deze plant een aardig effect. Zij hangen aan dunne steeltjes en zijn daardoor steeds in beweging.			
2268. <i>nebulosa</i> , <i>Struisgras</i>	30		0.25	2294. <i>Lacrymae</i> , <i>Jobstranen</i>	60	0.30	0.15
2270. <i>pulchella</i> , zeer schoon	45		0.15				
AVENA.				ERAGROSTIS.			
Deze soort is zeer gezocht voor bouquetten, daar ze met haar losse elegante bloemaren een prachtig effect maakt.				Deze plant vormt prachtige groote bossen en groeit zeer weelderig; moet onder glas worden gezaaid.			
2276. <i>sterilis</i>	75		0.15	2298. <i>elegans</i>	90	0.25	0.10
BRIZA.				HORDEUM.			
Briza of <i>Trilgras</i> heeft de eigenaardigheid, dat de bloemaartjes bij de minste bewegingen trillen. Ze zijn daardoor zeer geschikt voor groene en gedroogde bouquetten.				De sierlijke aren, voorzien van zeer lange en fijne haren, zijn bijzonder geschikt voor bouquetten.			
2280. <i>maxima</i> , groot <i>Trilgras</i>	30	0.35	0.10	2314. <i>jubatum</i>	45		0.25
2282. <i>minima</i> , <i>fijn</i> „	30	0.30	0.10				
BROMUS.				LAGURUS.			
Schoon siergras met afhangende aren.				Zooals de naam dit aanduidt, doen de wol- lige pluimen veel aan den staart van een langoor denken.			
2286. <i>brizæformis</i>	60	0.20	0.10	2318. <i>ovatus</i> , <i>Hazestaart</i>	50		0.20
CHRYSURUS.				STIPA.			
Zeer lief grasplantje, dat lichte, bijna goud- kleurige bloemaren geeft.				Bekende soort met fijne aren, die van lange haren voorzien zijn.			
2290. <i>cynosuroides</i>	30	0.20	0.10	2338. <i>pennata</i> , <i>Vedergras</i>	45		0.40



Zaden van Potplanten.

Deze zaden moeten over 't algemeen met meer zorg worden behandeld dan de zomerbloemen. Vooral bij het zaaien moet men de vereischte regelmatige temperatuur geven, voor gelijkmatige vochtigheid zorgen, oppassen door doelmatige luchtverversing dat zich geen schimmel of zwamziekten vertoonen, enz. Men zaai vooral niet te dik, drukke daarna den grond voorzichtig met een plankje aan, en dekke de zaden met een weinig zeer fijn gezeefde bladaarde, vermengd met een even groote hoeveelheid scherpzand. De zeer fijne zaden, als *Begonia*, *Gloxinia*, enz., mogen niet, of althans niet noemenswaard, met aarde worden bedekt. In 't algemeen bedekke men de zaden met een laagje aarde, dat niet dikker mag zijn dan de dikte van 't zaad.

Hardbastige zaden, als *Canna*, *Acacia* enz., kunnen met een vijl een weinig worden aangevild, zorgdragende de kiem niet te beschadigen, om een spoedige ontkieming te bevorderen. Ook kan men tot dat doeleinde de zaden een paar dagen weken in één procents chlooroplossing in water.

De pot of zaaipan waarin gezaaid is, wordt met een glasruit bedekt om spoedig uitdrogen te voorkomen. Zoodra de jonge plantjes opkomen, verspene men ze en herhale dit nog eenige malen, waardoor ze een sterk wortelgestel zullen krijgen.

ABUTILON.

De Abutilons kunnen des zomers buiten worden geplaatst. Het zijn ongemeen schoone planten met fraaie bonte bladeren en klokvormige bloemen. Ze zijn overblijvend.

2346. **hybridum**, in de schoonste laaggroeiende rijkbloeiende soorten, gemengd

Hoog cm.	Bloei- tijd.	Per pakje.
30		0.50

ACACIA.

Schoone koude-kas-planten, die door sierlijk loof en schoone, somtijds zeer welriekende bloemen, alle aanbeveling verdienen. Zij bloeien meest in den winter en in 't voorjaar.

2352. **lophanta speciosa nana compacta**

Met prachtige fijne bladeren, die een allerschoonst effect maken; zeer geschikt voor waranda's en serres.

45		0.25
----	--	------

ASPARAGUS.

Deze bekende sierlijke planten worden gezaaid in de warme kas en daar ze zeer langzaam ontkiemen, moet er wel op gelet worden dat de aarde waarin men gezaaid heeft frisch blijft; ze kunnen zeer goed tegen de kamerlucht en leveren met hun fijn varenachtig groen een prachtig materiaal voor het versieren van tafels, enz.

2368. **plumosus nanus**
Met het prachtigste vederachtige groen.

2372. **Sprengeri**

		0.60
--	--	------

		0.25
--	--	------

BEGONIA.

De *Begonia's* moeten begin Maart in den warmen bak worden gezaaid. Daar de kiemplantjes licht door een schimmelziekte worden aangetast, moet men zorgen voor lichte bladaarde om in te zaaien en goed gedraineerde vlakke zaaipannen. De fijne zaden moeten een weinig worden aangedrukt, doch niet met aarde worden bedekt. Men bedekke de pannen met een glasruit. Zoodra mogelijk verspene men de kleine plantjes, dat zeer voorzichtig moet geschieden, en herhale dit nog een maal of drie. Langzamerhand gewent men ze tevens aan een koelere temperatuur. Op deze wijze zullen de plantjes hetzelfde jaar nog in Juli in bloei komen. Voor knollen zie bladz. 70.

2390. **hybrida gigantea**, enkele grootbloemige knolbegonia's gemengd

2394. **hybrida gigantea**, dubbele grootbloemige

2400. **Rex**, *Bladbegonia's* in de schoonste soorten, gemengd

2402. **semperflorens**, gemengd

2404. " **grand. atropurpurea** (*Vernon*)

Prachtige met helderoranje getinte karmijnroode bloemen en donkerbronsgekleurde bladeren.

30		0.35
----	--	------

30		0.75
----	--	------

30		0.60
----	--	------

30		0.20
----	--	------

30		0.25
----	--	------

2405. **semperflorens Erfordia**

30		0.40
----	--	------

2406. " **compacta alba**
Laaggroeiend; prachtig voor randen. Heldere witte bloemen.

20		0.25
----	--	------

2409. **semperflorens Luminosa**
Deze soort komt veel overeen met *Begonia Vernon*, maar de plant is losser gevormd.

30		0.50
----	--	------

2410. **Schmidtii**, dankbare winterbloei

30		0.40
----	--	------

CALCEOLARIA.

De *Calceolaria's* behooren tot de schoonste potplanten. De bloemen komen voor in de meest verschillende en grilligste kleuren. Men zaai van af Juni tot Augustus op dezelfde wijze als de Knolbegonia's en overwinter de plantjes in den kouden vorstvrijen bak. In 't voorjaar kan men ze een weinig warmte geven om ze in Maart reeds in bloei te hebben. Men bescherm de planten voor sterke zonnestralen en houde ze goed vochtig.

2420. **hybrida grandiflora**, getijgerde, eenkleurige en gevlekte grootbloemige prachtsoorten, gemengd

30		0.75
----	--	------

2422. **hybrida nana**, in de schoonste dwergachtige soorten gemengd

15		0.75
----	--	------

CANNA.

Men zaai de *Canna's* in den warmen bak; voor de behandeling der zaden leze men onder het hoofd der rubriek „Potplanten." Men zaai in Februari-April en houde de plantjes tot einde Mei onder glas.

2430. **indica**, bruinbladerige soorten gemengd

150	7—10	0.60
-----	------	------

2432. **indica Crozy**, grootbloemige prachtsoorten gemengd

90	7—10	0.50
----	------	------

CELOSIA.

De *Hanekammen* worden half Maart in den warmen bak gezaaid, een paar malen onder glas verspeend en langzamerhand afgehard, waarna men ze in Mei op de perken zet. Men kan ze ook in potten kweken en als ze bloeien in de kamer zetten.

2436. **cristata nana**, lage *Hanekammen* in schoone soorten gemengd

15	6—8	0.40
----	-----	------

2437. **cristata nana Empress**, zeer laag met donker blad en purperroode bloemen

15	6—8	0.60
----	-----	------

2438. **cristata nana coccinea**, lage met vuurroode bloemen

20	6—8	0.50
----	-----	------

2440. **plumosa pyramidalis**, vederachtige *Hanekam* in kleuren gem.

45	6—8	0.20
----	-----	------

CHRYSANTHEMUM.

De *Chrysanthen* kan men tegenwoordig tot de modebloemen rekenen en daar zij niet alleen bloeien in een jaargetijde dat de bloemen schaarsch zijn, maar ook zulke prachtige bloemen in de meest verschillende kleuren en vormen opleveren, verdienen zij deze aandacht ook ten volle. Ze worden begin Maart in den warmen bak uitgezaaid, op tijd verspeend, in potten geplant en in den zomer op een beschut plekje buiten gezet met de potten in den grond. Om schoone goed gevulde planten te krijgen, moet men ze op tijd innipen en aan elke stengel behoude men slechts één bloemknop, terwijl men de zijknoppen zorgvuldig verwijdt. In den herfst plaatse men ze in den kouden bak of in de kamer, waar de bloemen spoedig zullen ontluiken.

2448. <i>frutescens</i> , witte Margariet. . .	30	4—11	0.20
2450. <i>indicum fl. pl.</i>	90	10—12	0.50

Grootbloemige dubbele *Chrysanthemums* in prachtsoorten gemengd.

CINERARIA.

Deze worden in Juni gezaaid in den kouden bak, eenige malen verspeend en in den kouden bak vorstvrij overwinterd. Ze moeten voor scherpe zonnestralen worden beschermd en tamelijk vochtig worden gehouden.


2456. <i>hybrida grandiflora</i> , grootbloemige prachtsoorten, gemengd	30	2—5	0.60
2457. <i>hybrida hemelsblauw</i>	30	2—5	0.80
2458. „ <i>grandiflora nana</i> , grootbloemige dwergsoorten, gem.	20	2—5	0.75
2459. <i>hybrida grandiflora Matador</i> , helder scharlakenrood	30	2—5	0.90
2462. <i>maritima candidissima</i>	25	2—5	0.20

Met zilverwit blad, prachtige variëteit.

COLEUS.

De Coleussoorten bezitten prachtig gekleurd loof en maken daardoor een zeldzaam mooi effect; ze zijn zeer gemakkelijk uit zaad te kweken.

2474. <i>hybridus</i> , prachtige soorten gemengd	60	0.60
---	----	------



Cineraria hybrida.



Cyclamen persicum giganteum marginatum
„Victoria.”

CYCLAMEN.

De *Cyclamen* worden zoo vroegtijdig mogelijk in den warmen bak gezaaid, verspeend en na eenigen tijd de jonge plantjes in potten gezet. In den kouden bak groeien ze het best; men zette ze zoo dicht mogelijk bij het glas, want de planten hebben veel behoefte aan licht en lucht.

	Hoog cM.	Bloei- tijd.	
2480. „Papilio” <i>hybridum</i> , gemengd	20	12—4	0.60
2482. <i>persicum giganteum</i> , reuzenbloemige prachtsoorten, gemengd	20	12—4	0.50
2483. <i>Mont-blanc</i> , zuiverwit	20	12—4	0.60
2486. <i>persicum giganteum marginatum Victoria</i>	20	12—4	0.75

Van de *Cyclamen*, die ontegenzeggelijk tot de schoonste winterbloemen kunnen gerekend worden, werden in de laatste jaren verscheidene nieuwe variëteiten aangeboden. Toch geloof ik, dat deze nieuwigheid alle andere invoeringen overtreft in vorm en kleur der bloemen. Zij is van een krachtigen groei, terwijl de fraai gekleurde bloemen, die in grooten getale verschijnen, sierlijk gefranjed zijn. De kleur van het bloemenhart is steeds gelijk aan die van den schoon gekartelden rand der bloembladen.

FUCHSIA.

Deze algemeen bekende plant wordt gewoonlijk door stek gekweekt, maar met eenigen zorg kan men haar ook zaaien. Wil men de planten hetzelfde jaar nog in bloei hebben, zoo dient zoo vroegtijdig mogelijk te worden gezaaid onder glas in ondiepe pannen met lichten grond. De plantjes worden in potjes

FUCHSIA (vervolg).

verspeend; later geve men ze langzamerhand grootere potten. Vóór dat de planten voor den winter worden opgeborgen, moeten ze flink worden ingesnoeid. Men kan ze ook buiten in den vollen grond uitplanten en ze 's winters met eikenblad en riet bedekken. De planten sterven dan meestal tot aan den grond af, maar loopen in 't voorjaar weer uit. Ze bloeien dan later in den zomer.


2513. **hybrida**, enkele prachtsoorten, gemengd

2514. **hybrida**, dubbele prachtsoorten, gemengd

GLOXINIA.

Men zaai de Gloxinia's begin Februari evenals de Begonia's enz., verspen op tijd en houde ze in een matig warmen bak of serre. Voor sterken zonneschijn moet men ze beschutten.

2526. **hybrida crassifolia erecta**, met rechtopstaande bloemen in prachtsoorten gemengd



Gloxinia hybrida crassifolia „Prinz Adalbert.”

2527. **hybrida crassifolia** „Prinz Adalbert”

De violet-purpere bloemen dezer Gloxinia hebben een sterk afstekenden zuiver witten rand. De planten zijn bijzonder mooi gevormd en uit het stevige, naar beneden omgebogen bladerenrozet staan de bloemen als in een bouquet saamgevoegd, omhoog.

2528. **robusta grandiflora**, Fransche en Belgische prachtsoorten, gem.

HELIOTROPIMUM.

De *Heliotropen* zijn overbekend wegens de heerlijk riekende bloemen. De kweekwijze is zeer eenvoudig; men zaai in Maart in den warmen bak.

2548. **grootbloemige prachtsoorten** gemengd

Hoog
cM.

Bloei-
tijd.

Per
pakje.

60

6—10

—

60

6—10

—

30

6—8

0.60

IMPATIENS.

Deze schoone plant met heldergekleurde bloemen wordt in Maart in den warmen bak gezaaid, verspeend en later in den kouden bak overgebracht of in de kamer geplaatst.

2555. **Holstii, nieuwe hybriden**

De bloemen dezer prachtige nieuwe Impatiens of *Oost-Afrikaansche Balsaminen* zijn $3\frac{1}{2}$ à 4 cM. in doorsnede, alzoo grooter dan die der bekende variëteit *Sultani*, terwijl ook de bloembladen breeder, soms rond zijn. Gewoonlijk bevinden zich 6—8 bloemen gelijktijdig aan den top der bloemtakjes.

De kleur der bloemen is wit met schitterend rood oog, donker violet, schitterend karmijnrood, zacht rose etc. Zeer aanbevelenswaardige plant voor potcultuur en voor beplanting van perken. Zij laat zich gemakkelijk kweken.

2557. **Sultani hybrida**, in vele kleuren gemengd

LAVATERA.

Deze plant heeft sierlijk gevlekte bladeren en wordt veel gebruikt voor groote perken met Canna's, enz. Zij wordt begin Maart in den bak gezaaid, verspeend en einde Mei op de perken geplant.

2560. **arborea fol. var.**

2562. **trimestris**, rood

2564. „ **fl. albo**, wit

MEDEOLA.

2568. **asparagoides**

MIMOSA.

Van dit eigenaardige plantje is algemeen bekend, dat de bladeren zich sluiten en slap neerhangen bij de minste aanraking. Het kan ook niet tegen tocht. In April in den warmen bak gezaaid, moet men de plantjes zoo spoedig mogelijk in potten verspenen; later zette men ze in de kamer, den kouden bak of serre.

2572. **pudica**, *Kruidje-roer-mij-niet*

PELARGONIUM.

De *Pelargoniums*, ook ten onrechte *Geraniums* genoemd, worden in Februari in den warmen bak gezaaid en zoodra mogelijk verspeend, hetgeen later nog weer wordt herhaald. Men plant ze nu in potten, en zoodra ze daarin aangeslagen zijn, kan men ze buiten met de potten uitplanten. Ze zullen dan denzelfden zomer nog bloeien. De planten moeten in den kouden bak, serre of kamer worden overwinterd. Men moet ze zooveel mogelijk lucht geven.

2604. **zonale**, in de nieuwste prachtsoorten gemengd

PRIMULA CHINENSIS.

De Chineesche Primula's worden in Juni-Juli uitgezaaid in zaaipannen of goed gedraineerde potten gevuld met een mengsel van oude bladaarde en tuingrond met verteerde koemest en in den kouden bak geplaatst. Zoodra de plantjes eenige blaadjes hebben, zet men ze in potjes en later in grootere potten, die men zoodra het herfst wordt in een half warme serre zoo dicht mogelijk bij 't glas plaatst. Bij 't begieten moet men oppassen de bladeren niet nat te maken.

2620. **fimbriata gemengd**, in enkelbloemige prachtsoorten

Hoog
cM.

Bloei-
tijd.

Per
pakje.

30

0.30

30

0.30

0.25

0.25

0.25

30

0.30

45


5—11

0.35

20

12—4

0.40

*Primula obconica grandiflora alba.***PRIMULA OBCONICA.**

Deze Primula's met prachtige groote bloemen, kunnen op dezelfde wijze worden behandeld als de vorige.

	Hoog cm.	Bloei- tijd.	Per pakje.
2636. <i>grandiflora</i> , Ronsdorfer hybriden, gemengd	30	12—4	0.75
2638. <i>grandiflora alba</i>	30	12—4	0.75
Schoone witte variëteit, welke voor snijbloemen zeer is aan te bevelen.			
2640. <i>grandiflora fimbriata</i> , gemengd	30	12—4	0.75

SAINTPAULIA.

Prachtige rijkbloeiende *Gesneriaceae* met helderblauwe bloemen. Deze wordt op dezelfde wijze behandeld als de *Gloxinia's*.

2648. <i>ionantha</i>	15	7—10	1.—
---------------------------------	----	------	-----

SALVIA.

Prachtige plant met scharlakenroode bloemen, die in Maart-April in den bak wordt gezaaid en in potten gekweekt. Men kan

dezelve in Mei ook buiten zetten en zoodra er vorst te vreezen is, in potten plaatsen in kamer of serre; zij zullen dan nog zeer lang doorbloeien.

2652. <i>splendens</i> , helder scharlakenrood	60	6—11	0.40
--	----	------	------

SCHIZANTHUS.

2654. <i>Wisetonensis</i>	40		0.35
-------------------------------------	----	--	------

Deze Schizanthus heeft een gedrongen pyramidalen vorm. De plant groeit zeer regelmatig en brengt een menigte bloemen voort, die een fraai effect maken in vereeniging met het fijn ingesneden blad. De hoofdkleur der bloemen is wit met rose vlekken, terwijl de bovenlip karmijnrood, geel of bruin is.

STREPTOCARPUS.

De groote fraaie bladeren dezer plant liggen meestal vlak op den grond. De bloemstengels, die meestal 8 à 12 bloemen dragen, komen dus flink boven de bladeren uit. De bloemen zijn zeer

schoon en gelijken eenigszins op die van *Gloxinia's*; zij komen in de meest verschillende kleurnuances voor. Zij worden op dezelfde wijze gekweekt als de *Gloxinia's*.

2668. <i>hybridus</i> , nieuwe hybriden	20	6—11	0.50
---	----	------	------

TORENIA.

De *Torenia's* laten zich zeer gemakkelijk kweken. Zij vormen prachtige potplanten, maar men kan ze, mits vroeg in den bak uitgezaaid en einde Mei uitgeplant, ook op een warm plekje in den tuin kweken.

2676. <i>Fournieri Bailloni</i>	40	7—9	0.35
2677. „ <i>compacta grandiflora „Nymphae”</i>	30	7—9	0.40

Schoone nieuwe variëteit van een lagen, gedrongen groei; zij bloeit zeer lang met lichtblauwe bloempjes, waarvan de drie onderste bloembladjes eene donker violette vlek hebben. Zij vereischt echter eene gunstige standplaats.

2678. <i>Fournieri</i> , blauw	40	7—9	0.35
--	----	-----	------

VINCA.

De *Vinca* zaait men begin Maart-April in den bak en verspeent ze in potten onder glas. Om mooie gedrongen planten te krijgen, moet men ze een paar malen pinceeren of innipen.

2688. <i>rosea</i> , gemengd	30	6—10	0.40
--	----	------	------



Zaden van twee-jarige en overblijvende planten.

Van de meer dan 2-jarige of vaste planten zijn er velen die wel uit zaad *kunnen* worden gekweekt, maar eene groote menigte die slechts met de uiterste zorg en moeite, waarbij tevens eenige vakkennis een vereischte is, eenig resultaat opleveren. Vele soorten zijn er ook waarvan het zaad zeer langzaam ontkiemt, ja zelfs eerst het tweede jaar opkomt.

Juist om dus teleurstellingen te voorkomen heb ik in de onderstaande rubriek alleen die zaden opgenomen, die niet al te moeilijk te kweken zijn en die dus kans van slagen hebben. Waar ik geen nadere beschrijving heb gegeven, kan men die vinden onder Vaste Planten. De meeste worden in Mei of Juni gezaaid, en bloeien dan een volgenden zomer. Sommigen bloeien nog het eerste jaar, indien ze vroeg en onder glas worden gezaaid.

De met een † gemerkte soorten zijn geschikt voor snijbloemen; de soorten gemerkt met een * zijn geschikt voor randen; de soorten gemerkt met *t* zijn tweejarig.

2690. *t* ALTHÆA rosea fl. pl. . . .

Per
lood.

Per
pakje.
0.40

Dubbele Chaters prachtsoorten in kleuren gemengd.

De Stokrozen leenen zich uitmuntend tot het aanplanten langs groote heesterperken. In Engeland ziet men ze zeer veel; in ons land worden ze echter lang niet genoeg gewaardeerd. Men zaait ze half Juni en plant ze uit einde September.

2692. ALYSSUM saxatile compactum

0.20



Aquilegia.

2694. †AQUILEGIA chrysantha, goudgeel


0.50

2698. †AQUILEGIA chrysantha hybrida, in soorten gemengd . . .

0.40

2700. †AQUILEGIA Skinneri, oranje-rood

0.20



Bellis perennis fl. pl.

Per
pakje.

2704. *BELLIS perennis fl. pl., gemengd

Per
lood.

0.25

2706. *BELLIS perennis fl. pl. alba

0.30

2708. ††CAMPANULA Medium, enkele in kleuren gemengd . . .

0.30

0.10

2710. ††CAMPANULA Medium rosea, enkele rozeroode

0.50

0.15

2712. ††CAMPANULA Medium fl. pl., dubbele in kleuren gemengd . .

0.20

2714. ††CAMPANULA Medium calycanthema, gemengd

0.20

Deze Campanula's worden in Engeland veel gekweekt en daar Canterbury Bells genoemd. Ze worden in Juni gezaaid, gedund en voor den winter met eenige ruigte bedekt. In 't voorjaar plant men op ze de perken.

2716. †CAMPANULA persicifolia grandiflora alba (Backhousei) .

0.25

2718. †CAMPANULA persicifolia grandiflora coerulea

0.25

2724. ††CAMPANULA pyramidalis .

0.20

Ongeveer 1.50 M. à 2 M. hooggroeiende variëteit met dichte hartvormige bladeren. De schoongevormde klokvormige bloemen zijn van een bleekblauwe kleur. Men zaait in het voorjaar en overwintert ze in potten in koude kas of bak.

2726. ††CAMPANULA pyramidalis alba, witte variëteit

0.20

	Per lood.	Per pakje.		Per lood.	Per pakje.
2730. †CHRYSANthemum LEUCANTHEMUM HYBRIDUM, „Frühlingsmarguerite” De bloemen hebben een doorsnede van 8 cm. en staan op lange dunne, doch stevige stengels. Bij uitstek geschikt voor de moderne binderij.			2774. †LOBELIA cardinalis Queen Victoria, met donkerrood blad . .		0.50
2732. †CHRYSANthemum maximum		0.25	2776. †LUNARIA biennis. Judaspenning	0.25	0.10
2738. †DIANTHUS barbatus, Duizendschoonen, enkele in de schoonste kleuren gemengd	0.30	0.10	2778. †MYOSOTIS alpestris, Vergeet-me-niet, blauw	0.70	0.15
2740. †DIANTHUS barbatus fl. pl., Duizendschoonen, extra dubbele grootbloemige in de schoonste soorten gemengd	0.75	0.20	2780. †MYOSOTIS alpestris alba	0.70	0.15
2741. †DIANTHUS Caryophyllus fl. pl., Dubbele Anjelier, in extra schoone soorten gemengd, zaden van onder glas gekweekte prachtplanten . .		0.40	2782. † ” ” rosea, rose	0.75	0.15
2742. †DIANTHUS Caryophyllus fl. pl., gewone dubbele, in vele kleuren gemengd		0.25	2784. †MYOSOTIS alpestris Victoria, blauw, grootbloemig	1.10	0.25
2743. †DIANTHUS Caryophyllus fl. pl., Remontant of doorbloeiende Anjelier, gemengd		0.30	2786. †MYOSOTIS alpestris Victoria alba, grootbloemig	1.10	0.25
2745. †DIANTHUS Caryophyllus Marguerite, zuiver wit		0.30	2788. †MYOSOTIS alpestris Victoria rosea, grootbloemig	1.10	0.25
2746. †DIANTHUS Caryophyllus Marguerite, scharlaken		0.30	2792. †PAPAVER alpinum, gem.		0.30
2747. †DIANTHUS Caryophyllus Grenadin Rozakoningin		0.25	2794. † ” nudicaule, oranje, geel en wit gemengd	0.60	0.15
2748. †DIANTHUS plumarius fl. pl., dubbele Gras-Anjelier, in schoone kleuren gemengd		0.20	Buitengewoon dankbaar bloeiende plant, die zich zeer gemakkelijk uit zaad laat kweken.		
2752. †DIGITALIS gloxiniaeflora, gemengd		0.15	2796. †PAPAVER nudicaule, nieuwe hybriden		0.25
2754. GNAPHALIUM Leontopodium		0.30	Variëteit met geheel nieuwe kleurschakeringen.		
2760. †GYPSOPHILA paniculata		0.15	2804. †PRIMULA malacoides alba		0.40
2764. †LATHYRUS latifolius albus		0.30	Zaailingen dezer dankbare nieuwigheid komen reeds na 4 maanden in bloei; bij uitzaaien in Januari-Februari bloeien ze van Mei tot Juli. Zaaït men ze in Augustus, zoo verkrijgt men een maandenlang voortdurenden winterbloei. De elegante bloeiwijze dezer Primula, die ook zeer geschikt is voor kamerplant, zal haar spoedig zeer populair maken. De hierbij aangeboden variëteit is zuiver wit; ze komt bijna echt uit zaad op.		
2770. LINUM perenne		0.15			
2772. ” ” album		0.15			



Papaver nudicaule hybriden.



Primula malacoides alba,

	Per lood.	Per pakje.		Per lood.	Per pakje.
2806. PRIMULA veris elatior , gem.		0.20	2820. † THALICTRUM <i>adianthifolium</i>		0.20
2810. *† PYRETHRUM parthenifoli- um aureum		0.15	2822. VIOLA CORNUTA , gemengd .		0.25
2812. *† PYRETHRUM parthenifoli- um aureum selaginoides		0.20	2824. „ „ alba		0.30
De <i>Pyrethrum parthenifolium</i> wordt zeer veel gebruikt voor randen om bloemperken of voor mozaïekvakken.			2826. „ „ Zwarte Prins		0.30
De eerste heeft fraai goudgeel blad, de andere is eene variëteit met varenachtig in- gesneden blaadjes. Bijtijds gezaaid kan men de plantjes nog hetzelfde jaar gebruiken. Wanneer men de vrij onaanzienlijke bloemen geregeld afknijpt, komt dit aan den groei der plant ten goede.			2828. „ „ Thüringen , donkerblauw met wit oog		0.45
2818. SALVIA argentea , met wit blad		0.15	2830. VIOLA ODORATA semperflo- rens , Boschviooltje		0.30
			Dit welriekend viooltje, ook wel Maartsch viooltje genoemd, is in het voorjaar een voor- bode van de lente, terwijl laat in het najaar de bloemen zich ook vertoonen. Het bemint een half beschaduwde standplaats. Het zaad moet een jaar in den grond liggen alvorens het kiemt.		

Collectie eigengewonnen Zaden van Vaste en Overblijvende Planten.

De beschrijving dezer soorten vindt men onder **Vaste Planten**.

	Per lood.	Per pakje.		Per lood.	Per pakje.
2832. † ACONITUM <i>Napellus</i>	0.50	0.15	2918. † HELIANTHELLA <i>quinque- nervis</i>		0.20
2836. † ANEMONE Pulsatilla rubra , (<i>pratense</i> Kew)	0.30	0.10	2920. HERACLEUM <i>Mantegazzia- num</i>	0.20	0.10
2837. † ANEMONE Sylvestris	0.75	0.15	2922. HESPERIS <i>matronalis</i>		0.25
2839. † AQUILEGIA Helenae		0.20	2930. INCARVILLEA Delavayi	0.40	0.10
2840. † „ nivea grandiflora	0.25	0.10	2932. „ grandiflora	0.60	0.15
2850. † ASTILBE Davidii		0.15	2934. „ „ brevipes	0.70	0.20
2854. † CAMPANULA lactiflora		0.15	2940. † LIATRIS scariosa		0.20
2856. † „ macrantha	0.25	0.10	2946. † LUPINUS polyphyllus , blauw <i>Per ons . . . f 0.60.</i>	0.10	
2858. † „ „ alba	0.25	0.10	2948. † „ „ albus , per kilo f 4.50, per ons f 0.60	0.10	
2860. „ (<i>Platycodon</i>) alba	0.25	0.10	2950. † LUPINUS polyphyllus <i>Moer- heimi</i>		0.15
2861. „ („) macrantha	0.25	0.10	2960. † MALVA moschata rosea	0.30	0.10
2870. CODONOPSIS ovata		0.25	2962. † „ „ alba	0.30	0.10
2872. † DELPHINIUM hybridum , <i>prachtmengsel</i> , van de beste en <i>nieuwste</i> enkele en dubbele soorten	0.40	0.10	2963. MECONOPSIS cambrica fl. pl.		0.25
2873. † DELPHINIUM sinense	0.35	0.10	2964. OROBUS lathyroides		0.15
2874. † „ „ Cine- raria coeruleum		0.25	2966. „ Smithi		0.15
2875. † DELPHINIUM sinense fl. albo	0.35	0.10	2972. † PHLOX decussata , <i>pracht- soorten gemengd</i>	0.80	0.25
2876. † DICTAMNUS caucasicus	0.30	0.15	2975. POLYGONUM polymorphum		0.15
2877. † „ Fraxinella		0.15	2976. †* POTENTILLA hybr. formosa	0.75	0.15
2878. † „ „ albus	0.25	0.10	2977. † „ „ nepalensis <i>Miss Willmott</i>	0.75	0.15
2883. † ECHINACEA (Rudbeckia) purpurea	0.60	0.15	2986. † PRIMULA pulverulenta		0.30
2884. EREMURUS himalaicus		0.20	2996. † SCABIOSA caucasica		0.25
2886. „ robustus		0.20	2998. † „ „ alba	1.—	0.30
2888. „ „ superbus , „ <i>Himrob</i> ”		0.20	3000. † „ „ pensylvanica	0.40	0.15
2890. † ERYNGIUM alpinum	0.40	0.10	3004. SENECIO Veitchianus		0.25
2891. † „ „ giganteum	0.50	0.15	3008. „ „ Wilsonianus		0.25
2900. † FUNKIA minor alba	0.60	0.15	3010. † SIDALCEA candida	0.85	0.20
2902. † GEUM atro-sanguineum fl. pl.	0.60	0.15	3012. † „ „ Rosy Gem.	0.45	0.10
2904. † GEUM coccineum , <i>Mrs. J. Bradshaw</i>	1.—	0.25	3022. † THALICTRUM Delavayi	0.80	0.20
2912. † GILLENIA trifoliata	0.90	0.15	3026. † „ „ dipterocarpum	0.80	0.20
2916. † HELENIMUM Hoopesi		0.20	3042. † TROLLIUS Ledebouri		0.30
			3050. VERBASCUM <i>Miss Willmott</i>		0.15

Diversen.

BLOEMENMEST.

Van deze geconcentreerde *Kunst- of Bloemenmest* zijn in de laatste jaren de prachtigste resultaten verkregen; op de meest verschillende gewassen, als: Potplanten, Begonia's, Rozen, Palmen, Azalea's en Gazons, is zij met succes aangewend.

Voor *Potplanten* strooie men om de 4 à 5 weken een eierlepeltje op elken pot.

Voor *Bloemen* in den vollen grond neme men 1 ons op den vierkanten meter.

Ook verdient het aanbeveling voor *Grasperken*; men strooie dan in Maart 1 ons op den vierkanten meter.

Men kan deze mest ook met succes gebruiken om bij het oppotten van planten den grond te vermengen en neme dan 1 kilo op 1 hectoliter grond.

Deze mest kan, mits droog bewaard, zeer lang goed blijven.

Prijzen: Per kilo f 1.50; bij minstens 5 kilo (bruto) tegelijk f 1.40 per kilo.

RAFFIA-BINDBAST.

(Tengevolge van de abnormale omstandigheden voorloopig niet te leveren.)

ENTWAS

zeer goede entwas; in bussen van $\frac{1}{2}$ Kilo per bus f 2.—.

TONKING TUINSTOKKEN,

van Bamboe, om bij Dahlia's, Rozen enz. te plaatsen; lengte pl.m. 1.80 meter.

(Tengevolge van de abnormale omstandigheden voorloopig niet te leveren.)

STEEK-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd.

No. 1.	Lengte 35 cM.,	breedte 3.5 cM.,	p. 100 st. f 2.20
" 2.	" 25 "	" 3.0 "	" 100 " - 1.10
" 3.	" 20 "	" 3.0 "	" 100 " - 1.—
" 4.	" 16 "	" 2.0 "	" 100 " - 0.60
" 5.	" 10 "	" 1.5 "	" 100 " - 0.40


HANG-ETIQUETTEN, met olieverf geel geschilderd en voorzien van gegalvaniseerd draad.

No. 1.	Lengte 10 cM.,	breedte 3.0 cM.,	p. 100 st. f 1.40
" 2.	" 8 "	" 3.0 "	" 100 " - 1.20
" 3.	" 10 "	" 2.0 "	" 100 " - 1.10

X. L. ALL.

Het eenige, voor planten onschadelijke besproeiingsmiddel ter **verdelging van Insecten** (in zeepvorm, ter oplossing in water); per doos van $\frac{1}{2}$ Kilo f 3.—, $1\frac{1}{2}$ Kilo f 8.—, 3 Kilo f 15.— met gebruiksaanwijzing.

NESTKLOSSEN.



BROEDNESTEN,

SLAAPHOKJES voor VOGELS.


SYSTEEM „VAN TONGEREN.”

Voor VOLIÈRE, TUIN, BOSCH en WANDELPERKEN, ter bevordering der nestgelegenheid voor insectenetende vogels.

Nooit mag een nest **achter-over** hangen, daar dan water in het vlieggat dringt en de vogels daardoor het **nest niet betrekken**. Alle nesten moeten steeds **goed vast** en **zoo veel mogelijk** met de **opening** naar het **Zuid-Oosten** worden aangebracht.

De hieronder aangeboden zijn geschikt voor Koolmees, Pimpelmees, Zwartkopmees, Zwarte Mees, Kuifmees, Boomklever, Draaihals, Zwartgrijze Vliegenvanger, het gekraagde Roodstaartje en de kleine bonte Specht.

No. 1a.	Natuurhout	p. st. f 1.—
" 1b.	" eekhoornvrij door gaas " "	- 1.25



VOEDERBLOKKEN.

Zeer aardig en praktisch, met veel succes in groote en kleine tuinen in de nabijheid der broednesten of aan raamkozijnen op te hangen.

Door asphalt wordt het zaad tegen water bewaard en kan gemakkelijk van boven worden gevuld.

Werkt automatisch, waardoor er geen zaad verloren gaat.

No. 8a. Natuurhout, p. stuk f 1.20

NESTKLOSSEN.

SYSTEEM MARIUS LEYDS.

Voor Spreeuwen, Spechten, enz., per stuk f 0.85.

VOGELVOEDER.

Kool- en Slazaad, gemengd, per Kilo *f* 3.50, per ons *f* 0.40.

ROTSSTEEN

Prima harde natuursteen, bij uitstek geschikt voor het aanleggen van rotspartijen. Deze steen wordt geleverd direct uit de groeve en onbekapt, zoodat de rotstuin een natuurlijk karakter verkrijgt. Ze is uitstekend bestand tegen weersinvloeden en in alle opzichten aan te bevelen.

Prijs, behalve de vracht,
per 10.000 K.G. franco op wagon *f* 100.—.

„DECORATIEVE TUINBEPLANTING”


DOOR

A. J. VAN LAREN

Hortulanus aan den Hortus Botanicus te Amsterdam.

Prijs *f* 12.—.

Dit boek kan ik aan elken liefhebber van den tuin en vooral ook aan hen, die een betrouwbaren gids wenschen voor het gebruik van vaste planten in den tuin, ten zeerste aanbevelen. Uit elke bladzijde van het boek spreekt de groote liefde van den heer van Laren voor de natuur en voor den rijkdom van vaste planten, heesters enz. die tegenwoordig den bloemenliefhebber wordt aangeboden. Vooral aan hen, die in hun tuin zoogenaamde Borders of Boordbedden willen aanleggen, geeft dit boek talrijke wenken en ook afbeeldingen, die getuigen dat de heer Van Laren van zijn onderwerp een grondige studie heeft gemaakt.



ALPHABETISCH REGISTER

van HEESTERS, PLANTEN, ZADEN, enz.

	Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.
Aalbessen	6	Aquilegia	21, 112, 114	Blechnum	69	Cassia	30
Abies	15	Arabis	21, 23	Bleekselderij	82	Castanea	8
Abutilon	108	Aralia	8	Bloemenmest	115	Catananche	30
Acacia	108	Arenaria	23	Bloemkool	76, 77	Ceanothus	8
Acaena	19	Arctotis	87	Bloemzaden	86—114	Cedrus	15
Acanthus	19	Aristolochia	7, 104	Bocconia	28	Celosia	108
Acer	8	Armeria	23	Boerenjasmijn	10	Centaurea	30, 90
Achillea	19	Arnebia	23	Boerenkool	78	Centranthus	90
Aconitum	19, 114	Arnica	23	Bolbegonia's	70, 108	Cerastrum	30
Acorus	20	Arrhenaterum	23	Boltonia	36	Cercis	8
Acroclineum	106	Artemisia	8, 23, 71, 87	Boonen	73—74	Cercydiphyllum	8
Actaea zie Cimicifuga.		Artisjokken	72	Boonenkruid	71, 84	Chamaecyparis	15
Actinidia	7	Asarum	23	Boschbeemdgras	85	Cheiranthus	90, 91
Adiantum	69	Asclepias	23	Boschviooltje	114	Chelone	30
Adonis	20, 86	Asparagus	108	Boterkool	84	Chenopodium	85
Aesculus	8	Aspersie	71, 73	Brachycome	89	Chionanthus	8
Aetheopappus	20	Asperula	23, 71, 88	Brem	10	Chrysanthemum	
Afrikanen	102	Asphodelus	23	Briza	107	30, 31, 91, 109, 113	
Agapanthus	20	Aspidium	69	Brocoli	76	Chrysurus	107
Ageratum	86	Asplenium	69	Broednesten	115	Cichorei	75
Agrostemma	20, 86	Aster	23—25, 88, 89	Bromus	107	Cimicifuga	31, 32
Agrostis	85, 107	Astilbe	25—27, 114	Browallia	89	Cineraria	109
Ajuga	20	Astrantia	27	Bruckenthalia	8	Citroenkruid	8
Alchemilla	20	Athyrium	69	Brusselsch Witloof	75	Citroenmelisse	71, 84
Alisma	20	Aubriëtia	27, 28	Buddleia	8	Claytonia	79
Alonsoa	86	Aucuba	8	Buphthalmum	28	Clarkia	91
Alopecurus	85	Augurken	73	Butomus	28	Clematis	7, 32
Alpenplanten	17	Avena	85, 107	Buxus	8	Clethra	8
Alpenroos	13	Azalea	13	Bijvoet	71	Cobaea	104
Alstroemeria	20					Cochlearia	71
Althaea	112	Balsaminen	95	Cacalia	89	Codonopsis	32, 114
Alyssum	20, 87, 112	Bambusa	28	Cactus Dahlia's	71, 93	Coix	107
Amaranthus	87	Baptisia	28	Calamintha	28, 89	Coleus	109
Amberboom	10	Barbarea	28	Calampelis	104	Collinsia	92
Amelanchier	8	Bartonia	89	Calandrinia	89	Collerette Dahlia's	71
Ammobium	106	Basilicum	84	Calceolaria	108	Colutea	8
Amorpha	8	Bastaard klaver	85	Calendula	89	Coniferen	14—16
Ampelopsis	7	Beemdlangbloem	85	Calimeris	28	Convallaria	32
Amsonia	20	Begonia	70, 108	Calycanthus	8	Convolvulus	92
Amygdalus	8	Bekervaren	69	Calla	28	Coreopsis	32
Anagallis	87	Bellis	112	Calliopsis	89	Coriander	84
Anaphalis	20	Berberis	8	Calluna	9	Coriaria	32
Anchusa	20, 87	Bessen	6	Caltha	28	Cornus	8
Andromeda	8	Betonica	28	Calystegia	28	Corydalis	32
Andijvie	72	Beuk (bruine)	10	Campanula	28, 30, 89, 112, 114	Corylus	8, 9
Anemonen	20, 21, 114	Beverboom	10			Cosmea	92
Anemonopsis	21	Bidens	28, 89	Cannabis	90	Cosmidium	92
Anjelieren	36, 93, 113	Bies	64	Canna's	108	Cotoneaster	9
Antennaria	21	Bieten	73	Cantaloupen	78	Cotula	32
Anthemis	21, 71	Bignonia	7	Capucijners	75	Cowgras	85
Anthericum	21	Bindsalade	82	Cardamine	30	Crambe	78
Antholyza	21	Bitterkers	83	Cardonzen	84	Crataegus	9
Anthoxanthum	85	Blaasboom	8	Carduus	90	Crinum	32
Antirrhinum	87	Blaasjeskruid	67	Carex	30	Cryptomeria	15
Anijs	84	Blauwe regen	7	Carpinus	8	Cuphea	92

	Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.
<i>Cupressus</i>	13	<i>Fuchsia</i>	40, 109, 110	<i>Humulus</i>	45, 104	Koolrabi	78
<i>Cyclamen</i>	33, 109	<i>Funkia</i>	40, 114	<i>Hutchinsia</i>	45	Koolrapen	78, 85
<i>Cydonia</i>	9			<i>Hydrangea</i>	10	Koeltje vuur	86
<i>Cynoglossum</i>	33, 93	<i>Gaillardia</i>	41, 94	<i>Hydrocharis</i>	45	Korenbloem	30, 90
<i>Cynosurus</i>	85	<i>Galega</i>	41	<i>Hypericum</i>	45	Kornoelje	8
<i>Cypres</i>	15	<i>Gaultheria</i>	10			Kraag-Dahlia's	71
<i>Cypripedium</i>	33	<i>Gaura</i>	94	<i>Iberis</i>	45, 95	Krentenboompje	8
<i>Cystopteris</i>	69	<i>Gazongras</i>	85	<i>Ilex</i>	10	Kropaar	85
<i>Cytisus</i>	9	<i>Gazonplanten</i>	18	<i>Immortellen</i>	106	Kropdunsel	81
		<i>Gebroken-hart</i>	36	<i>Impatiens</i>	95, 110	Kropsalade	81
<i>Dactylus</i>	85	<i>Genista</i>	10, 41	<i>Imperata</i>	45	Krooten	73
<i>Dahlia's</i>	71, 89, 93	<i>Gentiana</i>	41	<i>Incarnaat</i>	85	Kruidje-roer-mij-niet	110
<i>Daphne</i>	9	<i>Geranium</i>	41	<i>Incarvillea</i>	45, 114	Kruizemunt	71
<i>Datura</i>	93	<i>Gerbera</i>	41	<i>Insecten-middel</i>	115		
<i>Delphinium</i> 33—36, 93, 114		<i>Geum</i>	41, 42, 114	<i>Inula</i>	45	<i>Laburnum</i>	9
<i>Desmodium</i>	9	<i>Gillenia</i>	42, 114	<i>Ipomaea</i>	104	<i>Lagurus</i>	107
<i>Dessertblad</i>	84	<i>Gipskruid</i>	42, 43, 95	<i>Iris</i>	45—47	Lampionplant	56
<i>Deutzia</i>	9	<i>Gladiolus</i>	71	<i>Italiaansch Raygras</i>	85	Landbouwzaden	85
<i>Diadeem anjers</i>	93	<i>Glaskoolrapen</i>	78	<i>Itea</i>	10	<i>Lastrea</i>	69
<i>Dianthus</i>	36, 93, 113	<i>Glechoma</i>	42	<i>Ivoordistel</i>	39	<i>Lathyrus</i> 47, 48, 96, 104, 105, 113	
<i>Dicksonia</i>	69	<i>Globularia</i>	42			Laurierkers	11
<i>Diclytra</i>	36	<i>Gloxinia</i>	71, 110	<i>Jaapjespeen</i>	85	<i>Laurocerasus</i>	11
<i>Dictamnus</i>	36, 114	<i>Glyceria</i>	42	<i>Japansche Azalea's</i>	13	<i>Lavatera</i>	48, 110
<i>Digitalis</i>	113	<i>Glycine</i>	7	<i>Japansche Berberis</i>	8	<i>Lavandula</i>	48, 71, 84
<i>Dille</i>	84	<i>Gnaphalium</i>	42, 113	<i>Japansche Eschdoorn</i>	8	<i>Lavendel</i>	48, 71, 84
<i>Dimorphotheca</i>	94	<i>Godetia</i>	94, 95	<i>Japansche hop</i>	104	<i>Ledum</i>	10
<i>Diplostephium</i>	36	<i>Gomphrena</i>	106	<i>Japansche Rozen</i>	5	<i>Leeuwenbekjes</i>	87
<i>Diversen</i>	115	<i>Gouden regen</i>	9	<i>Japansche Wijnbes</i>	6	<i>Lelietje van dalen</i>	32
<i>Diverse Zaden</i>	84, 85	<i>Goudsbloem</i>	89	<i>Jasminum</i>	7	<i>Lepelblad</i>	84
<i>Doperwten</i>	75	<i>Gras-Anjelier</i>	113	<i>Jasmijn</i>	10	<i>Leptosiphon</i>	96
<i>Doronicum</i>	38	<i>Graszaden</i>	85	<i>Jobstranen</i>	107	<i>Leverbloem</i>	44
<i>Dotterbloem</i>	28	<i>Groentezaden</i>	72—85	<i>Judasboom</i>	8	<i>Liatris</i>	48, 114
<i>Dragon</i>	71, 84	<i>Gunnera</i>	42	<i>Judaspenning</i>	113	<i>Lievevrouwe bedstr.</i> 71, 84	
<i>Duindoorn</i>	10	<i>Gynerium</i>	42	<i>Juffertje in 't groen</i>	98	<i>Ligularia</i>	48
<i>Duizendschoonen</i>	113	<i>Gypsophila</i> 42, 43, 95, 113		<i>Juniperus</i>	15	<i>Ligustrum</i>	10
<i>Dwerg-Asters</i>	88, 89					<i>Linaria</i>	96
<i>Eccremocarpus</i>	104	<i>Haagbeuk</i>	8	<i>Kaasjesbloem</i>	49	<i>Linum</i>	96, 113
<i>Echinacea</i>	38, 114	<i>Hanekammen</i>	108	<i>Kalabassen</i>	79, 105	<i>Liquidambar</i>	10
<i>Echinops</i>	38	<i>Hangetiquetten</i>	115	<i>Kalmia</i>	10	<i>Lithospermum</i>	48
<i>Edeldistel</i>	39	<i>Harpalium</i> (zie <i>Helianthus</i>)		<i>Kalmuswortel</i>	20	<i>Lobelia</i>	96, 113
<i>Edelweiss</i>	42, 113	<i>Hazelaar</i>	8, 9	<i>Kamgras</i>	85	<i>Loganbes</i>	6
<i>Elaeagnus</i>	9, 13	<i>Hazestaart</i>	107	<i>Kamille (Roomsche)</i>	71	<i>Lolium</i>	85
<i>Elymus</i>	38	<i>Hedera</i>	7	<i>Kamperfoelie</i>	7	<i>Lonicera</i>	7, 10
<i>Engelsch Raygras</i>	85	<i>Hedysarum</i>	10	<i>Kapperkool</i>	77	<i>Lunaria</i>	113
<i>Entwas</i>	115	<i>Heerenboonen</i>	74	<i>Kardinaalsmuts</i>	10	<i>Lupinen</i>	48, 85, 97, 114
<i>Epimedium</i>	38	<i>Heesters</i>	8—14	<i>Kastanje (tamme)</i>	8	<i>Lupinus</i>	48, 85, 97, 114
<i>Eragrostis</i>	107	<i>Heide</i>	9, 10	<i>Kattestaart</i>	87	<i>Luzerne</i>	85
<i>Eremurus</i>	38, 39, 114	<i>Helenium</i>	43, 114	<i>Keizeranjers</i>	93	<i>Lychnis</i>	48, 49
<i>Erica</i>	9, 10	<i>Helianthella</i>	43, 114	<i>Kelkvaren</i>	69	<i>Lysimachia</i>	49
<i>Erigeron</i>	39	<i>Helianthemum</i>	43	<i>Kerria</i>	10	<i>Lythrum</i>	49
<i>Eriophorum</i>	39	<i>Helianthus</i>	43, 44, 95	<i>Kerstroos</i>	44		
<i>Erodium</i>	39, 94	<i>Helichrysum</i>	106	<i>Kervel</i>	84	<i>Maagdepalm</i>	68
<i>Erwteboonen</i>	74	<i>Heliopsis</i>	44	<i>Keukenkruiden</i>	84, 85	<i>Magnolia</i>	10
<i>Erwten</i>	75	<i>Heliotropium</i>	110	<i>Klaverzaden</i>	85	<i>Mahonia</i>	10
<i>Eryngium</i>	39, 114	<i>Helleborus</i>	44	<i>Klimkomkommers</i>	76	<i>Maianthemum</i>	49
<i>Erythrochaete</i>	39	<i>Hemelroosje</i>	86	<i>Klimop</i>	7	<i>Maidenhair</i>	69
<i>Escallonia</i>	10	<i>Hemerocallis</i>	44	<i>Klimop (Schotsche)</i>	7	<i>Mais</i>	85
<i>Eschdoorn</i>	8	<i>Hepatica</i>	44	<i>Klimplanten</i>	7, 104	<i>Majoraan</i>	84
<i>Eschscholtzia</i>	94	<i>Heracleum</i>	44, 114	<i>Klimrozen</i>	5	<i>Malope</i>	97
<i>Esschenkruid</i>	36	<i>Herfst-Anemonen</i>	20, 21	<i>Klokbloemen</i> 28—30, 89, 112, 114		<i>Malus</i>	10
<i>Etiquetten</i>	115	<i>Herfst-Asters</i>	23—25	<i>Knolbegonia's</i>	70	<i>Malva</i>	49, 84, 114
<i>Eulalia</i>	39	<i>Herfst-Seringen</i>	54—56	<i>Knollen</i>	80, 85	<i>Mangelwortelen</i>	85
<i>Eupatorium</i>	39	<i>Herfst-Violieren</i>	90	<i>Knolrapen</i>	78, 85	<i>Margriet</i> 30, 31, 109, 113	
<i>Euphorbia</i>	39	<i>Hesperis</i>	114	<i>Knolselderij</i>	82	<i>Mariadistel</i>	90
<i>Evonymus</i>	10, 39	<i>Heuchera</i>	45	<i>Kochia</i>	96	<i>Matricaria</i>	97
		<i>Hibiscus</i>	10	<i>Koepeen</i>	85	<i>Maurandia</i>	105
<i>Fagus</i>	10	<i>Hieracium</i>	45	<i>Kogeldistel</i>	38	<i>Meconopsis</i>	49, 114
<i>Festuca</i>	85	<i>Hippophae</i>	10	<i>Komkommers</i>	76	<i>Medeola</i>	110
<i>Fioringras</i>	85	<i>Holcus</i>	85	<i>Komijn</i>	84	<i>Megasia</i>	49
<i>Fluweelboom</i>	13	<i>Hoppeklaver</i>	85	<i>Koningsanjelier</i>	93	<i>Meidoorn</i>	9
<i>Forsythia</i>	10	<i>Hordeum</i>	107	<i>Koningsvaren</i>	69	<i>Melde</i>	84
<i>Frambozen</i>	6	<i>Hottonia</i>	45	<i>Konstantinopel</i>	48	<i>Melissa</i>	71
<i>Fransch Raygras</i>	85	<i>Houstonia</i>	45	<i>Kool</i>	76—78	<i>Melittis</i>	49
		<i>Hulst</i>	10				

	Bladz.		Bladz.		Bladz.		Bladz.
Meloenboompje	8	<i>Petunia</i>	99	<i>Rhododendron</i>	11—13	Sluitkool	77
Meloenen	78	Peulen	76	<i>Rhodotypus</i>	13	Sneeuwbal	14
<i>Mentha</i>	49, 71	<i>Phacelia</i>	99	<i>Rhus</i>	13	Sneeuwvlokboom	8
<i>Menyanthes</i>	49	<i>Phalaris</i>	53	<i>Ribes</i>	13	Snijbiet	73
<i>Menziesia</i>	49	<i>Philadelphus</i>	10	<i>Ricinus</i>	101	Snijboonen	74
<i>Mertensia</i>	49	<i>Phleum pratense</i>	85	Riddersporen 33-36, 93, 114		Snijmoes	85
<i>Mesembrianthemum</i>	97	<i>Phlox amoena</i>	53	<i>Robinia</i>	13	Snijsalade	81
<i>Meum</i>	49	„ <i>Arendsi</i>	53, 54	<i>Rodgersia</i>	61, 63	Snijselderij	82
Mierikswortel	71	„ <i>decussata</i> 54—56, 114		<i>Romneya</i>	63	<i>Soldanella</i>	65
<i>Mimosa</i>	110	„ <i>divaricata</i>	56	Roode bessen	6	<i>Solidago</i>	65
<i>Mimulus</i>	97	„ <i>drummondii</i> 99, 100		Roode Klaver	85	Spaansche Aak	8
<i>Mina lobata</i>	105	„ <i>glaberrima</i>	56	Roode Kool	77	Sparren	15
<i>Mirabilis</i>	97	„ <i>ovata</i>	56	Rood Vlas	96	<i>Spergula</i>	85
<i>Miscanthus</i> zie <i>Imperata</i>		„ <i>setacea</i>	56	<i>Rosa Polyantha</i>	5	Spersieboonen	74
Molsalade	82	„ <i>suffruticosa</i>	56	„ <i>Moyesii</i>	5	Spinazie	81
<i>Monarda</i>	49	<i>Physalis</i>	56	„ <i>rubiginosa</i>	5	<i>Spiraea</i>	13, 65
Monnikskap	19	<i>Physostegia</i>	56	„ <i>rugosa</i>	5	Spruitkool	77, 78
<i>Montbretia</i>	49, 50	<i>Picea</i>	15	Rotsplanten	18	Spurrie	85
Mosterd	85	Pimpernel	85	Rotssteen	116	<i>Stachys</i>	65
<i>Muehlenbeckia</i>	10	Pinksternakels	85	Rozemarijn	85	Stamboonen	74
<i>Mulgedium</i>	50	Pioen-Dahlia's	71	Rozemarijnwilg	13	Stamrozen	5
Muskusplant	97	Pioenrozen	51, 52	Rozen	3—5	Stamslaboonen	74
Muurbloemen	91	<i>Pittyrospermum</i>	56	<i>Rubus</i>	63	Stamsnijboonen	74
<i>Myosotis</i>	113	Planten v/d. Moestuין 71		<i>Rudbeckia</i>	38, 63, 114	<i>Staphylea</i>	13
<i>Myrica</i>	10	<i>Platycodon</i> , zie <i>Campanula</i>		<i>Rumex acetosa</i>	71	<i>Stalice</i>	65
		<i>grandifl.</i>	81	<i>Rumex patientia</i>	83	Steeketiquetten	115
Nachtschoonen	97	Pluksalade	81	Ruw beemdgras	85	<i>Stenanthium</i>	65
<i>Nemesia</i>	97	<i>Plumbago</i>	56	Rijstmelde	85	<i>Stephanandra</i>	14
<i>Nemophila</i>	97	<i>Poa</i>	85			Sterkers	83
<i>Nepeta</i>	50	<i>Podophyllum</i>	56	<i>Sagittaria</i>	63	<i>Stipa</i>	65, 107
<i>Nesaea</i>	50	<i>Polemonium</i>	56, 57	<i>Saintpaulia</i>	111	<i>Stockesia</i>	65
Nestklossen	115	Polyantharozen	5	Salade	81, 82	Stokboonen	74
<i>Nicotiana</i>	98	<i>Polygala</i>	11	Salie	85	Stokrozen	112
<i>Nierembergia</i>	50	<i>Polygonatum</i>	57	<i>Salix</i>	13	Stokslaboonen	74
Nieuw Zeel. Spinazie	83	<i>Polygonum</i>	7, 57, 114	Salomonszegel	57	Stoksnijsboonen	74
<i>Nigella</i>	98	<i>Polypodium</i>	69	<i>Salpiglossis</i>	101	<i>Stratiotes</i>	65
Nordman Spar	15	<i>Polystichum</i>	69	<i>Salvia</i>	63, 101, 111, 114	<i>Streptocarpus</i>	111
<i>Nuphar</i>	50	Pompoenen	79	<i>Sambucus</i>	13	Stroobloemen	106
<i>Nycterinia</i>	98	<i>Portulaca</i>	100	<i>Sanguinaria</i>	63	Struikrozen	3—5
<i>Nymphaea</i>	50	Postelein	79	<i>Santolina</i>	63	Struisgras	107
		<i>Potentilla</i>	11, 57, 114	<i>Saponaria</i>	63, 101	<i>Struthiopteris</i>	69
<i>Oenothera</i>	50, 98	<i>Poterium</i>	57	<i>Satureia</i>	71	<i>Stylophorum</i>	66
<i>Omphalodes</i>	50	Potplanten	108—111	Savoye Kool	77	Suikerboonen	74
<i>Onoclea</i>	69	Prei	79	<i>Saxifraga</i>	63, 64	Suikerwortelen	85
Oost-Ind. Kers	102, 105	<i>Primula</i> 57—60, 110, 111, 113, 114		<i>Scabiosa</i>	64, 101, 114	<i>Symphoricarpus</i>	14
<i>Ornithopus</i>	85	Princesseboonen	74	Schapengras	85	<i>Synthyris</i>	66
<i>Orobus</i>	50, 51, 114	<i>Prinos</i>	11	<i>Schizanthus</i>	101, 111	<i>Syringa</i>	14
<i>Osmunda</i>	69	Pronkboonen	74	Schorseneeren	82		
Overbl. Klaver	85	Pruikenboom	13	<i>Sciadopitys</i>	16	Tabak	98
Overbl. Planten	17—69	<i>Prunella</i>	60	<i>Scirpus</i>	64	<i>Tagetes</i>	102
Overblijvende Planten		<i>Prunus</i>	11	<i>Scolopendrium</i>	69	<i>Taxodium</i>	16
(zaad)	112—114	<i>Pseudotsuga</i>	15	<i>Scrophularia</i>	64	<i>Taxus</i>	16
Overbl. Spinazie	83	<i>Pulmonaria</i>	60	<i>Sedum</i>	64	<i>Telekia</i>	66
<i>Oxalis</i>	51, 98	Pijlkruid	63	Selderij	82	<i>Tetragonia</i>	83
		Pijpenboom (Duitsche) 7		<i>Sempervivum</i>	64	<i>Thalictrum</i>	66, 114
Paardepeen	85	<i>Pyrethrum</i>	61, 114	<i>Senecio</i>	64, 102, 114	<i>Thermopsis</i>	66
<i>Paeonia</i>	51, 52			Sering	14	<i>Thunbergia</i>	105
Pampasgras	42	Raapstelen	80	Serradella	85	<i>Thuya</i>	16
<i>Papaver</i> 52, 53, 98, 99, 113		Rabarber	71, 79, 80	<i>Shepherdia</i>	13	<i>Thuyopsis</i>	16
Parasolden	16	Radijs	80	<i>Sidalcea</i>	65, 114	Thym	66, 71, 85
<i>Parnassia</i>	53	Radijsboompje	14	Siepels	83, 84	<i>Thymus</i>	66, 71, 85
<i>Passiflora</i>	105	Raffia	115	Siergrassen	107	<i>Tiarella</i>	66
<i>Pavia</i>	8	Ramenas	80	Sierheesters	8—14	Timotheegras	85
Pek-Anjer	49	Randpalm	8	Sierkalabassen	105	Tomaten	83
<i>Pelargonium</i>	110	<i>Ranunculus</i>	61	Sierpruim	11	Tonkingstokken	115
<i>Pentstemon</i>	53	Rapen	80, 85	Siertabak	98	<i>Torenia</i>	111
Peper (Spaansche)	85	Raygras	85	<i>Silene</i>	65, 102	Touwboom	7
Peperboompje	9	Reseda	100	<i>Silphium</i>	65	<i>Tradescantia</i>	66
Pepermunt	71	<i>Retinospora</i>	15, 16	Sjalotten	82	<i>Tricyrtis</i>	66
<i>Perilla</i>	99	Reukgras	85	<i>Skimmia</i>	13	Trilgras	107
<i>Periploca</i>	7	Reuzenhennep	90	Slaaphokjes v. vogels 115		<i>Trillium</i>	66
<i>Pernettya</i>	10	<i>Rhexia</i>	61	Slaboonen	74	<i>Tritoma</i>	66
<i>Petasites</i>	53	<i>Rhodanthe</i>	106	Slangenwortel	28	<i>Trollius</i>	66, 67, 114
Peterselie	79			Sleutelbloem	60	<i>Tropaeolum</i>	67, 102, 105

European Nursery Catalogues


A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



Steeds ben ik bereid be'angstellenden op mijne kweekerijen, die een bezichtiging ten volle waard zijn, rond te leiden.

DEDEMSVAART heeft Stoomtramverbinding met de stations DEDEMSVAART S. S., ZWOLLE, MEPPEL, HOOGVEEN, HARDENBERG en COEVORDEN.

Voor hen, die een rijwiel meebrengen is DEDEMSVAART langs goede fietswegen te bereiken vanaf een der volgende stations: ZWOLLE (30 K.M.), OMMEN (15 K.M.), HARDENBERG (12 K.M.), HOOGVEEN (17 K.M.), MEPPEL (22 K.M.) of DEDEMSVAART S. S. (16 K.M.)